

תשאול ילדים אינו שונה ממבוגרים, חוץ מהעובדה שאת רוב המידע מקבלים מההורה. אולם, ישנן שאלות ייחודיות לבעיות של ילדים.

- הריון: טראומות נפשיות יכולות להשפיע על קונסטרויות התינוק. כמו כן, לקיחת תרופות, צריכת אלכוהול, עישון סיגריות ושימוש בסמים משפיעים לרעה על בריאות התינוק.
- לידה: ניתוח קיסרי, נטילת משככי כאב, לידה מכשירנית או לידה ארוכה מאוד ישפיעו על התינוק, במיוחד על ריאותיו.
- הנקה: גמילה מוקדמת מדי מהנקה יכולה לגרום לתקיעות מזון ולבעיות עוריות.
- חיסונים: פעמים רבות, חיסונים גורמים לבעיות שונות.
- מחלות ילדות: יכולות לגרום לבעיות, כמו שעלת (מחלישה את הריאות). כאבי גרון חוזרים ו/או ריניטיס יכולים להעיד על גמילה מוקדמת מדי מהנקה או צריכת מזון שומני מוקדם מדי.

תשאול ילדים על פי ג'וליאן סקוט:

1. **חום/קור** – בדומה למבוגרים.
2. **הזעה** – בדומה למבוגרים.
3. **אזור הראש:** הזעה בראש רק לאחר האכלה – חום בקיבה או חולשת לב; הזעה בראש בלילה – לא פתולוגי; כאב; סחרחורת; הכרה; יכולות למידה – במידה והילד גדל מהר מדי, יכולות הלמידה שלו באופן זמני עלולות להתעכב (אך להסתדר בהמשך). במידה והוא גדל באיטיות, יכולות הלמידה שלו יכולות להיות מפותחות.
4. **מזון ושתייה:** תאבון ירוד – חוסר צ'י הטחול; בורן באוכל – חוסר צ'י הטחול; תאבון לא סדיר – LPF; נפיחות בבטן לאחר האכלה – חוסר צ'י הטחול, תקיעות מזון; תאבון תקין אך היציאות לא סדירות – קיבה חזקה אך טחול חלש; הקאות מועטות לאחר יניקה – נוזלים בקיבה, חוסר יאנג הקיבה או חלב אם מימי מדי; הקאות (עם תכולה רבה) של מזון המעוכל בחלקו – תקיעות מזון או קור מחוסר בטחול; הקאות של מים – הצטברות ליחה; הקאה מסריחה – הצטברות חום בטחול ובקיבה; הקאות יבשות – חוסר יין עם פגיעה בנוזלים.
5. **חזה ובטן:** תחושת מחנק, כאב ונפיחות – בדומה למבוגרים.
6. **שמימה:** שמימה ירודה לרוב מעידה על ליחה.
7. **מחלות במשפחה.**
8. **שינה:** מיעוט בשינה – מוביל לחוסר צ'י ובהמשך לחולשת כליות; שינה מרובה – חוסר יאנג הטחול או לחות; אינסומניה – בדומה למבוגרים; חלומות המכילים אלימות – הצטברויות, קור מחוסר בטחול או התבוננות בתוכניות טלוויזיה, משחקי מחשב או סרטים אלימים; חלומות "חיים" – חום בלב, חוסר יין.
9. **הריון, לידה ולאחר לידה:** הריון – בריאות האם, שוק, פריחות, מחלות מדבקות, אנמיה וכדומה; לידה – כל דבר שלא היה תקין בלידה, טראומה, משככי כאב, קיסרי, לידה ארוכה וכדומה; לאחר לידה – צהבת ילודים, תאבון, הנקה, נשימה, חיסונים, מחלות ילדים.
10. **מצב משפחתי:** תנאי מחייה, אחים ואחיות, סטרס בבית, מצב משפחתי של ההורים.