


足陽明胃經

THE STOMACH CHANNEL  
OF FOOT YANGMING



zang fu – אצחנה נצז א


דפוסִי אברים Leg Yang Ming

קיבה – STOMACH

תרגום ועריכה: קרן סצ'י

# הקִיבָה:

הקִיבָה ממוקמת מתחת לסרעפת. הפתח העליון שלה, הנקרא קרדיה, מחובר לזושט. הפתח התחתון שלה, נקרא פילורוס.



- הקיבה והטחול מהווים את שורש ה post natal qi - הקיבה היא ים המזון.
- המקור לצ'י ודם הנוצרים לאחר הלידה
- שולט על הרקבה והבשלה של המזון - קליטת המזון הראשונית וטחינתו לעיסה
- שולט על טרנפורטצית תמציות המזון
- שולט על ירידת הצ'י - "ירידה הרמונית" אל עבר המעיים על מנת שניתן יהיה להמשיך בתהליך מיצויו וספיגה
- מקור הנוזלים/ השער לנוזלים
- פעולת הורדה כוללת למעשה גם את המשך ירידת המזון אל המעי הדק והגס.

# אתיוולא'ה:

תזונה:

אחד הגורמים העיקריים להפרעות בקיבה.

- באופן כללי הקיבה אוהבת אוכל לח ולא יבש מידי (ההיפף מהטחול)
- צריכה מוגזמת של מזון קר או חם/ יגרם חום עודף/ קור בקיבה
- ארוחות לא מסודרת, בשעות לא קבועות, נשנושים בין הארוחות
- אכילה בשעת לילה מאוחרת
- אכילה לא מספקת/ תת תזונה
- אכילה מהירה
- מצב רגשי לא טוב בזמן אכילה, כמו דאגה וצער
- אכילה "על הדרך", בזמן קריאה, טלוויזיה וכו'

רגשות:

הקיבה מושפעת לרוב מדאגה וחשיבת יתר. דאגה תגרום לתקיעות של צ'י בקיבה ותגרום ל גיהוקים, בחילות, צרבות עבודה מנטלית מאומצת לאורך שנים תוביל לחולשת הצ'י של הקיבה כעס, תסכול וטינה ישפיעו על הקיבה דרך הכבד ויגרמו לתקיעות בצ'י הקיבה – בחילות, הקאות, כאב

אקלים:

הקיבה מושפעת בעיקר מאקלים קור, קור יכול לחדור לקיבה וליצור הצטברות ועודף קור באיבר עם סימפטומים של כאב אקוטי והקאות

# הק"ח:

לקיבה שתי פונקציות פיזיולוגיות עיקריות:

## 1. אחראית על קליטה, הכלה והבשלת המזון הנכנס.

### קליטת ופירוק מזון ומשקאות

מזון ומשקאות נכנסים דרך הפה, עוברים דרך הוושט ומגיעים לקיבה. לכן הקיבה מכונה "ים המזון והמשקאות". המזון והמשקאות הופכים לעיסה באמצעות פעולת הפירוק והטחינה של הקיבה. לאחר מכן, העיסה מועברת למעי הדק, שם היא עוברת עיכול נוסף. למרות שהקיבה אחראית על קבלת ופירוק המזון והמשקאות, רק בשיתוף פעולה עם תפקודי ההמרה וההובלה של הטחול ניתן להשלים את תהליך העיכול בצורה חלקה, ולחלץ את החומרים החיוניים, מהם נגזרים הצ"י, הדם והנוזלים. לפיכך, הטחול והקיבה יחד משמשים כ"בסיס של post natal qi תפקוד העיכול של הקיבה מתבצע במאמץ משותף של יין הקיבה ויאנג הקיבה. הפרעה בתפקוד זה עלולה לגרום לחוסר תיאבון, נפיחות וכאבים באזור הבטן העליונה, והקאות חומציות.

- תהליך ראשוני של עיכול וספיגה של מזון ושתייה והפיכתם לעיסה.
- הקיבה מכונה ים המזון
- הצ"י והדם. יצור דם, צ"י ונוזלי הגוף תלוי בהזנה המגיעה מהמזון.
- לאחר קליטת המזון ע"י הקיבה, המיצוי נשלח להזנת הגוף בעזרת הטחול והעכור נשלח אל המעי הדק.



# הקצ'ה:

## 2. אחראית על ירידה ללא הפרעה. "ירידה הרמונית".

**הובלה כלפי מטה :**

העיסה שנוצרה בקיבה חייבת להמשיך לרדת למעי הדק, שם היא עוברת עיכול וספיגה נוספים. כלומר, הקיבה מתואמת על ידי ירידה. רק כאשר צ'י הקיבה יכול לזרום מטה בחופשיות, הקיבה והמעי הדק יכולים להחליף בין ריקנות למלאות, ותפקוד העיכול נשאר תקין.

אם צ'י הקיבה אינו יכול לזרום מטה בחופשיות, עלול להיווצר עומס של מזון בקיבה, מה שיגרום לנפיחות, מלאות וכאבים בבטן, ריח רע מהפה ועצירות.

אם צ'י הקיבה עולה באופן שלילי, עלולים להופיע גיהוקים רבים, בחילות, הקאות ושיהוקים.

ברפואה הסינית המסורתית, תפקודי הקיבה מכונים לעתים קרובות בקיצור "צ'י הקיבה". אך ל"צ'י הקיבה" יש משמעות מצומצמת יותר ומשמעות רחבה יותר. במשמעות המצומצמת יותר, זהו התפקוד הפיזיולוגי של הקיבה. במשמעות הרחבה יותר, זהו כל מערכת העיכול הכוללת את הטחול -והסנג'ואו בנוסף לקיבה.


הרפואה הסינית המסורתית מייחסת חשיבות רבה ל Qi של הקיבה ומאמינה שה צ'י של הקיבה הוא הבסיס של גוף האדם שפע של צ'י הקיבה מבטיח שכל חמשת האיברים הפנימיים יהיו מלאי מרץ בעוד שמחסור בו עלול להוביל לחולשה של כל חמשת האיברים הפנימיים.

"היכן שיש צ'י של הקיבה יש חיים, היכן שאין צ'י של הקיבה, אין חיים"

## 2. אחראית על ירידה ללא הפרעה. "ירידה הרמונית".

הורדה זו הפוכה לגמרי לתנועת העלייה של הטחול. הטחול מעלה את הטהור והמזין מעלה והקיבה מורידה את העכור והפסולת למטה. אי יכולת להוריד מפריעה לריקון הקיבה ומונעת כניסת מזון נוסף. הפרעה זו מקבלת ביטוי חיצוני כ:

1. חוסר תאבון (אין מקום אכסון למזון נוסף)
2. ריח רע מהפה (צ'י עכור עולה במקום לרדת)
3. מלאות ואף כאב בטן (תקיעות מזון וצ'י)
4. עצירות (פסולת לא יורדת, תקיעות צ'י)
5. בשלב הבא תופיע עליה של צ'י סורר (בחילות, הקאות)






## תפקידי הטחול

1. הובלה והתמרה.
2. העלאת הטהור.
3. החזקה ושליטה על הדם והנוזלים.

## תפקידי הקיבה

1. אחראית על קליטה, הכלה והבשלת המזון הנכנס.
2. אחראית על ירידה ללא הפרעה. "ירידה הרמונית".





# קִיבָּה סִידוּר:

- שליטה על הרקבה והבשלת המזון: הקיבה מתמירה מזון ונוזלים, תהליך הבשלה והרקבה זה הוא שלב מקדים לפעילות הטחול בהפרדת המיצוי לעכור וטהור ומיצוי התמצית המזוקקת של המזון.
- לאחר שהמזון עובר טרנספורמציה בקיבה, הוא ממשיך מטה אל המעי הדק להפרדה וספיגה נוספת.
- ביחד עם הטחול אחראי על טרנספורמציה של תמציות מזון לכל הגוף ובעיקר לגפיים – תפקודים אינם נפרדים
- שליטה על ירידת הצ'י של הקיבה לכיוון המעי הדק – תנועה כלפי מטה במצב תקין
- חולשת st qi – תקיעות מזון, תחושת מלאות ונפיחות, שיהוקים, עליית מיצי מרה
- תקיעות של צ'י הכבד במ. אמצעי יכולה לגרום לפגיעה בתפקוד ההורדה של צ'י הקיבה.
- מקור הנוזלים: לתפקוד הרקבה והבשלה למזון יש צורך בשפע של נוזלים- הקיבה מייצרת תמציות מהמזון וגם נוזלי גוף. לכן הקיבה אוהבת רטיבות ושונאת יובש
- כאשר נוזלי הקיבה שופעים, יהיה עיכול טוב, חוש טעם נורמלי, בחסר בנוזלים יהיה צמא, לשון יבשה וסדוקה ובעיות עיכול.
- גורם עיקרי לחוסר בנוזלי קיבה- אכילת ארוחות גדולות בלילה מאוחר
- חוסר ממושך בנוזלי הקיבה יכול להוביל ל - kid yin def , ז"א שמצבים כרוניים של חולשת יין הקיבה לרוב יהיו מעורבים במצבים של חולשת יין הכליות
- במצבי חולי- אם ה st qi חזק, תהיה פרוגנוזה טובה
- חיפוי לשון קשור גם ל ST – החיפוי נוצר על ידי לחות עכורה שהיא תוצר ההבשלה וההרקבה ונוצר חיפוי
- אספקט מנטלי: קיבה רגישה למצבי עודף אש/ אש וליחה –אש תשפיע על הנפש. התנהגות מאנית, הסתגרות, אלימות, בלבול נפשי, חרדה ועוד

# דפוסים / פתולוגיות / סינדרום:

החריגות העיקריות במחלות קיבה הן פגיעה בקליטת מזון ומשקאות ועלייה חריגה של צ'י הקיבה חלק מן הדפוסים מתייחסים גם למעי הגס בנוסף לקיבה (אותה שכבה ומושפעים האחד מהשני)

## דפוסי חוסר:

### פתולוגיות נוספות שעלולות להיווצר בנוסף/ במקביל:

1. נוזלים נשארים בקיבה.
2. סטגנצית צ'י הקיבה והמעי.

1. חולשת צ'י הקיבה
2. חולשת יאנג /הקיבה בחוסר ובקור
3. חוסר יין הקיבה

## דפוסי עודף:

4. אש בקיבה או ליחת אש/ חום משגשג בקיבה
5. קור פולש לקיבה/ (ולמעי) ותוקע את הקיבה והמעי
6. צ'י הקיבה מתמרד כלפי מעלה (גם ע"ר חוסר)
7. תקיעות מזון בקיבה (ובמעי)
8. סטגנציית דם בקיבה

# 1. חולשת צ'י הקיבה / ST QI DEFICIENCY

תזונה לא מאוזנת

מחלה ממושכת וחוסר תזונה

זמני ארוחה לא סדירים (רעב ושובע)  
תשישות פיזית מזיקה למחמם מרכזי

נזק לצ'י  
הקיבה

**כאשר צ'י הקיבה חלש**

1. יכולת **קליטת** המזון ו**הבשלתו** נחלשת.

2. יכולת **הורדה** הרמונית נפגעת.

קליטה, הבשלה והורדה חלשים – **כאב עמום בקיבה, נפיחות ומלאות, חוסר תאבון, נפיחות מחמירה לאחר הארוחה. כאב מוקל תחת לחץ.**

צ'י הקיבה עולה במקום לרדת – **גיהוק.**

חולשת צ'י הקיבה משפיעה על הטחול. הטחול אינו מניע או ממצה – **פנים חסרות ברק ואף צהובות.**

חולשת צ'י – **קוצר נשימה, תשישות נפשית, עצלות, חוסר חשק לדבר.**

## חולשת צ'י הקיבה

סימפטומים:

הרגשה לא נוחה באפיגסטריום, חוסר תיאבון, היעדר תחושת טעם, צואה רכה, עייפות/לאות במיוחד בבוקר, חולשת גפיים

לשון: חיוורת

דופק: חלש, בעיקר בעמדה ימנית אמצעית -עמדת הקיבה

סימפטומים עיקריים: עייפות/לאות בעיקר בבוקר, גפיים חלשות, הרגשת אי נוחות -באזור האפיגסטריום

עקרון טיפול: חיזוק צ'י הקיבה

נקודות דיקור:

CV6

BL21

CV12

ST36

## 2. חולשת הקיבה (יאנג) וקור / ST DEFICIENT AND COLD

החלשות יאנג הקיבה

תזונה לא מאוזנת

נטיה לצרוך מזון קר וחי

שימוש מוגזם בתרופות קרות

קונסטיטוציה של חולשה

מחלה ממושכת וחוסר תזונה

**כאשר יאנג הקיבה חלש:**

1. נוצר בקיבה **קור מחוסר**.

2. יכולת **הורדה** הרמונית נפגעת.

יאנג הקיבה חלש, נוצר קור מחוסר, קור מאט זרימת צ'י, צ'י הקיבה אינו זורם חלק – **כאב**

**עמום וקר באזור הקיבה, תאבון חלש, תחושת מלאות בקיבה.**

1. כאב מוקל תחת **לחץ**.

2. כאב מוקל בזמן **חימום**.

3. כאב מוקל לאחר **ארוחה**.

יכולת קליטה ובישול פגומה, מזון לא מתעכל ומתלווה לצ'י סורר – **בחילות והקאות של**

**נוזל שקוף מיימי או מזון לא מעוכל.**

יאנג צ'י חלש, אין חימום – **חשש מקור, גפיים קרות, עיפות.**

נוזלים לא נפגעו – **חוסר טעם בפה, אין צמא.**

**לשון שמנה וחיוורת. דופק איטי חסר כח.**



## חולשת הקיבה (יאנג) וקור

### סימפטומים:

אי נוחות באפיגסטריום המוחמר אחרי יציאות, מוקלת אחרי אכילה, לחץ מגע ועיסוי, חוסר תיאבון, העדפת משקאות ומאכלים חמים, הקאת -נוזל צלול, צואה רכה, חוסר צמא, גפיים קרות, עייפות/לאות

### הסבר הסימפטומים:

יש פה מצב מקדים של חוסר יאנג הטחול.

במצב זה הטחול לא יכול לפעול באופן מאוזן ולהתמיר נוזלים, הוא מעביר יותר מידי נוזלים ל LI מעי גס, והתוצאה היא צואה רכה עד כדי שלשול. -

מכיוון שיש חוסר יאנג, הקיבה לא יכולה לבצע תפקידה כראוי. הקיבה היא מקור הנוזלים, במצב זה הנוזלים הנכנסים לקיבה ממזון ושתיה עולים מעלה במקום להישאר בקיבה ולעבור תהליך של R \$ R - ripening and rotting הרקבה והבשלה

### לשון: חיוורת, תפוחה

דופק: עמוק, חלש בעיקר בעמדה ימנית אמצעית (עמדת - st

סימפטומים עיקריים: אי נוחות באזור האפיגסטריום המוחמר אחרי יציאות, מוקל אחרי ארוחה, גפיים קרות, עייפות/לאות

עקרון הטיפול: חיזוק וחימום צ'י הקיבה והטחול חיזוק צ'י הקיבה, חיזוק יאנג הטחול

נקודות דיקור:

CV6

BL21

BL20

ST25

CV12

ST36

## קור בקיבה

פתולוגיה זה קורה בשני מצבים. במקרה אחד, כאשר הרוע הקר תוקף את הקיבה או עם התמכרות מוגזמת למזון ומשקאות קרים, הקור מתגבש בקיבה וגורם לחסימה. במקרה השני, בחולה הסובל מעייפות כרונית או ממחלה, יאנג הקיבה עלול להפוך לחסר כרוני. אם הקיבה מותקפת כעת על ידי קור אקסוגני, יאנג הקיבה נפגע עוד יותר והקיבה מאבדת את חומה.

ככל שהיין-קור מצטבר, הוא מתגבש והצ'י נעצר, כך שהמזון נשאר בקיבה והצ'י הופך לחסר. ביטוי קליני כאשר הקור מתגבש בקיבה, מופיע כאב קר באזור הבטן העליונה. במקרים קלים, הכאב נמשך. במקרים חמורים, הוא הופך לעוויתי, והקור מחמיר אותו בעוד החום מקל עליו. דפוס נוסף כולל עייפות וחולשה, רתיעה מקור עם גפיים קרות, כאב ברום הבטן עם העדפה ללחץ. הכאב מוקל על ידי מזון. דפוס נוסף כולל גרגור בקיבה והקאת נוזלים צלולים. בכל הדפוסים הללו, הלשון חיוורת, עם ציפוי לבן וחלק. הדופק איטי או מתוח.



## נוזלים נשארים בקיבה.

נוזלים

נעצרים

בקיבה

- תזונה לא מאוזנת: שתיה מרובה

- התשת הגוף, החלשת המרכז,

יאנג הטחול נחלש ואין הנעת נוזלים בגוף

נוזלים בקיבה מפריעים לזרימת צ'י - תחושת מלאות ונפיחות של הקיבה.

נוזלים ומים בקיבה – רעש של מים בקיבה.

נוזלים זורמים במעיים - רעש של מים במעיים.

נוזלים מפריעים לירידה הרמונית של צ'י הקיבה – הקאה של מים.

נוזלים חוסמים את המרכז, יאנג צ'י אינו עולה – סחרחורת וטשטוש ראייה.

אין צמא, חיפוי לשון לבן ורטוב, דופק עמוק ומתגלגל.

### 3.חסר יין הקיבה / ST YIN DEFICIENCY

יין הקיבה  
נחלש

בעקבות "מחלות חום" המזיקות ליין  
רגשות מדוכאים, צ'י נתקע ויצר אש המזיקה ל-יין  
הקאה ושלשול ממושכים מזיקים לנוזלי הגוף  
מזון חריף, ארומטי ויבש מזיק ל-יין  
שימוש מוגזם בתרופות חמות ויבשות

#### כאשר יין הקיבה חלש

1. נפגמת **לחות** הקיבה (קיבה מחבבת לחות). **יובש** בקיבה ונזק לנוזלים. (במקרה זה חום מחוסר אינו משמעותי).
2. **זרימת צ'י** הקיבה אינה חלקה.

- יין הקיבה מועט, נוצר חום מחוסר, החום כלוא בקיבה, צ'י הקיבה אינו הרמוני – **כאב עמום ושורף באיזור הקיבה. תחושת מלאות בקיבה או תחושה לא נעימה ולא נוחה.**
- קיבה לא מקבלת לחות, יכולת קליטה נפגעת – **רעב אך חוסר רצון לאכול.**
- ירידה הרמונית נפגעת, צ'י הקיבה סורר – **בחילה (הקאה ריקה ללא תוכן), שיהוק.**
- אין לחלוח לגרון – **יובש הפה והגרון.**
- אין לחלוח למעי – **צואה יבשה מגובשת.**
- **שתן מועט, לשון אדומה ויבשה, דופק דק ומהיר.**

## חסר יין הקיבה

### סימפטומים:

חוסר תיאבון, חום או תחושת חום אחר הצהריים, עצירות (צואה יבשה), כאב ברום הבטן חלש/אי נוחות, יובש בפה בגרון במיוחד אחר הצהריים, צמא ללא רצון לשתות או רצון לשתות בלגימות קטנות, הרגשת מלאות לאחר ארוחה

לשון: אדומה ומקולפת באמצע או עם חיפוי ללא שורש במרכז

לשון אדומה עם חריץ באזור הקיבה

דופק: צף ריק בעמדה אמצעית ימנית

סימפטומים עיקריים: כאב ברום הבטן, יובש בפה ובגרון במיוחד אחר הצהריים,

לשון אדומה ומקולפת באמצע /חריץ באזור הקיבה )או עם חיפוי ללא שורש

עקרון טיפול: הזנת יין הקיבה, הזנת נוזלי גוף

נקודות דיקור:

SP3

### **חוסר Yin בקיבה**

CV12

פתולוגיה מחסור ביין הקיבה נובע בדרך כלל מאחת משתי סיבות. האחת, חום כרוני בקיבה גורם לקיפאון (תקיעות) של צ'י הכבד, מה שעלול להוביל להתפרצות אש אנדוגנית. השנייה, צריכה לא מאוזנת של

ST36

מזונות חמים ויבשים פוגעת ביין הקיבה. עם אובדן התזונה מיין הקיבה, צ'י הקיבה הופך להיות לא מאוזן או עולה באופן חריג.

SP6

ביטוי קליני התסמונת האופיינית לחוסר יין בקיבה כוללת כאב בטן עמום עם הקאות, בעיות עיכול עם נפיחות או הקאות יבשות, שיהוקים, אנורקסיה למרות רעב, יובש בפה ובגרון, עצירות יבשה, לשון אדומה עם מעט ציפוי ודופק מהיר ודק.

## 4. אש קיבה או ליחת אש / ST FIRE/ PHLEGM FIRE

חום משגשג בקיבה

מזון חריף, חם ויבש נוצרים חום ואש  
בעיות רגשיות, צ'י נתקע ויוצר חום  
פתוגן חום החודר אל הקיבה

**כאשר אש חזקה משגשגת בקיבה**

1. הורדה הרמונית נפגעת.

2. סממני חום עודף.

• אש וחום בקיבה תקועים. תנועת צ'י נפגע – כאב שורף באזור הקיבה. רתיעה ממגע באזור.

ערוץ מהקיבה מגיע לחניכיים:

1. אש עולה מהקיבה, צ'י ודם מצטברים – חניכיים אדומים, נפוחים וכואבים. הופעת כיבים, מוגלה.

2. ערוצי דם נפגעים, דם זורם ללא שליטה – דימום מהחניכיים.

3. צ'י עכור עולה מהקיבה – ריח רע בפה.

- אש משגשגת בקיבה, תפקוד עודף – עיכול מהיר ורעב.
- חום מזיק לנוזלים – צמא, העדפה למשקה קר.
- חוסר לחות במעי – עצירות וצואה יבשה.
- פגיעה בנוזלי הגוף – שתן מועט וכהה.
- לשון אדומה, חיפוי צהוב, דופק מהיר ומתגלגל.

## **חום בקיבה**

פתולוגיה חום בקיבה עלול לנבוע מהתקפה ישירה של חום אקסוגני. הוא עלול להופיע כאשר הרגשות קיצוניים, כך שהצ'י הסטגנטי הופך לאש ותוקף את הקיבה. הוא עלול לנבוע מאכילת יתר של מזון חריף, מתובל, חם או יבש. כאשר אש או יבש. כאשר אש או חום מצטברים בקיבה, הם צורבים את נוזלי הגוף הנותר ולסטזיס דם, מה שמביא Qi- של הקיבה לברוח. זה בתורו מוביל לקיפאון של ה Qi- וגורמים ל לתסמינים של אש בעוצמה בוערת.

ביטוי קליני התסמונת האופיינית כוללת אכילת יתר עם רעב תכוף, צמא עם העדפה למשקאות קרים, כאבי קיבה בוערים, ריח רע מהפה, עצירות, כאבים ונפיחות או דימום בחניכיים, כיבים בפה ובשפתיים, לשון אדומה עם ציפוי צהוב ודופק מהיר וחלקלק.



## אש קיבה

### סימפטומים:

תחושת צריבה או כאב ברום הבטן, העוצמה תהיה חזקה, צמא עם -רצון לשתות משקאות קרים, רעב מתמיד, נפיחות וכאב בחניכיים, דימום מהחניכיים, פצעים בחלל הפה, עליית גירה חמוצה, עצירות, בחילות, הקאה מייד לאחר הארוחה ריח לא טוב מהפה.

במצב של אש וליחה: כבדות ברום הבטן, פחות צמא, ריר בצואה, ריר יהיה בצבע - צהוב, בעיות מנטליות, אינסומניה (אש וליחה משפיעים על הלב) לשון:

אדומה, חיפוי עבה צהוב ויבש, במקרה של אש וליחה חיפוי עבה צהוב ודביק או פירורים בתוך חריץ אמצעי דופק: מלא ומהיר ( במקרה של אש ליחה מתגלגל, מלא ומהיר)

סימפטומים עיקריים: צמא עם רצון לשתות משקאות קרים, חיפוי צהוב – עבה, לשון אדומה, תחושת צריבה באפיגסטרום

עקרון טיפול: טיהור החום /אש בקיבה, חיזוק תפקוד ההורדה של הקיבה  
אם המצב הוא אש וליחה עקרון הטיפול יהיה: סילוק/טיהור אש וליחה מהקיבה,  
החזקת תפקוד ההורדה של הקיבה.

נקודות דיקור:

PC6

CV12

SP6

ST45

ST44

CV13

ST21

## 5. קור פולש לקיבה / COLD INVADING THE STOMACH

קור תוקע את הקיבה

נטיה לצרוך מזון קר וחי  
פלישת קור מן החוץ

1. קור עודף
2. תקיעות צ'י הקיבה

כאשר קור תוקע את הקיבה והמע.

- קור פולש לקיבה ותוקע זרימת צ'י, צ'י הקיבה אינו הרמוני – כאב קר בקיבה.  
אופי הכאב: פתאומי, חזק.  
חימום מקל את הכאב.  
קירור מחמיר את הכאב.
- צ'י הקיבה סורר – בחילות והקאות. כאב מוקל לאחר הקאה (צ'י זורם).

## 5.קור פולש לקיבה/ COLD INVADING THE STOMACH

### קור תוקע את הקיבה והמע.

- אם קור מזיק ליאנג הקיבה, מזון לא מתבשל – הקאת מזון לא מעוכל ומיים שקופים.
- אם קור פולש למעי, יכולת העברת פסולת נפגעת – שילשולים, נוזלים שקופים.
- קור מפריע לזרימת צ'י חלקה – תחושת נפיחות של בטן תחתונה ועצירות.
- קור כולא את יאנג צ'י, חום לא מגיע לגפיים – גפיים קרות, פנים לבנות או כחולות.

פתולוגיה זה קורת בשני מצבים.

במקרה אחד, כאשר הרוע הקר (מהחיצון) תוקף את הקיבה או עם התמכרות מוגזמת למזון ומשקאות קרים, הקור מתגבש בקיבה וגורם לחסימה.

במקרה השני, בחולה הסובל מעייפות כרונית או ממחלה, יאנג הקיבה עלול להפוך לחסר כרוני. אם הקיבה מותקפת כעת על ידי קור אקסוגני, יאנג הקיבה נפגע עוד יותר והקיבה מאבדת את חומה. ככל שהיין-קור מצטבר, הוא מתגבש והצ'י נעצר, כך שהמזון נשאר בקיבה והצ'י הופך לחסר.

ביטוי קליני כאשר הקור מתגבש בקיבה, מופיע כאב קר באזור הבטן העליונה. במקרים קלים, הכאב נמשך. במקרים חמורים, הוא הופך לעוויתי, והקור מחמיר אותו בעוד החום מקל עליו. דפוס נוסף כולל עייפות וחולשה, רתיעה מקור עם גפיים קרות, כאב ברום הבטן עם העדפה ללחץ. הכאב מוקל על ידי מזון. דפוס נוסף כולל גרגור בקיבה והקאת נוזלים צלולים. בכל הדפוסים הללו, הלשון חיוורת, עם ציפוי לבן וחלק. הדופק איטי או מתוח.



## **5.קור פולש לקיבה/ COLD INVADING THE STOMACH**

קור חיצוני יכול לתקוף את הקיבה ישירות, תוך עקיפת הרבדים החיצוניים של הגוף הקור משבש את פעילות הקיבה.  
הוא מפריע לתפקיד הירידה של צ'י הקיבה.

סימפטומים: כאב פתאומי ברום הבטן, חזק, מכווץ, ממוקד, הרגשת קור, העדפת - חום, הקאת נוזל צלול, החמרה לאחר שתיית משקה קר, הקאת משקאות קרים מיד בסיום השתיה, העדפת משקאות חמים

לשון:חיפוי לבן עבה  
דופק: איטי מתוח(איטי=קור מתוח=עודף קור)  
סימפטומים עיקריים:כאב פתאומי ברום הבטן, הרגשת קור, הקאת נוזל צלול,דופק איטי מתוח

עקרון טיפול: סילוק הקור, חימום הקיבה, חיזוק פעולת הורדה של צ'י הקיבה  
נקודות דיקור:  
ST34 – הצטברות ולכן טובה למצאים אקוטיים עם כאב, מסלקת תקיעויות מהקיבה וכאב  
CV13 – תפקוד הורדה  
SP4 – מסלקת קור בקיבה, מעודדת תפקוד הורדה של קיבה, מסלקת חסימות מהקיבה  
ST21 – מסלקת קור בשימוש במוקסה

## סטגנציאת צ'י הקיבה והמעי.

תקיעות צ'י הקיבה והמעי – תחושת נפיחות וגוש כואב בבטן, מקום לא קבוע.  
בלאגן בזרימת הצ'י, עליה וירידה אינם תקינים, צ'י הקיבה עולה - גיהוקים  
ובחילות. ירידה חזקה מטה – שלשול (תחושה לא נעימה אחרי). לאחר  
שיחרור אויר (גיהוק, נפיחה) הקלה בכאב ונפיחות.  
אם הצ'י תקוע, צ'י הטחול אינו יורד – עצירות.

## **6. צ'י קיבה מורד / STOMACH QI REBELLING UPWARDS**


בכל דפוס הקיבה, בתוכם, יכול להופיע הדפוס הזה.  
מכיוון שכל פתוגן גם אם -הוא חיצוני וגם אם הוא פנימי יכול לגרום לצ'י מורד של הקיבה.  
במצבים של עודף הסימפטומים יהיו חזקים יחסית, במצבים של חוסר הסימפטומים  
יהיו יותר חלשים /רגועים.

סימפטומים: בחילות, גיהוקים, שיהוקים, הקאות  
לשון: ללא שינוי (לפי סימפטומים נוספים כך תשתנה תמונת הלשון)

דופק: משתנה לפי מה שגרם לשיבוש בקיבה.  
יתכן מיתרי בעמדה ימנית אמצעית

עקרון טיפול: הכנעת צ'י מורד של הקיבה, חיזוק תפקיד הורדה של צ'י הקיבה  
נקודות דיקור: טכניקת פיזור  
CV13- טובה למצבי צ'י מורד של הקיבה  
CV10- מעודדת תפקוד הורדה  
SP4- מעודדת תפקוד הורדה  
PC6- כנל

## 7 תקיעות מזון בקיבה / RETENTION OF FOOD IN THE STOMACH



### כאשר מזון תקוע בקיבה והמע.

תפקיד הקיבה לקלוט ולהוריד בצורה הרמונית. מזון נתקע בקיבה, הורדה נפגעת וזרימת הצ'י אינה חלקה – מלאות, נפיחות וכאב בקיבה ורתיעה ממגע.

מזון הצטבר בקיבה, אין מקום לקליטת מזון חדש – תיעוב מזון.  
צ'י הקיבה סורר ועולה מעלה – הקאות.  
לאחר הקאה, הצ'י זורם חלק (זמנית) – הקלה בכאב ונפיחות.

מזון נרקב בקיבה, מזון וצ'י עכור עולים – גיהוק מסריח לעלית חומציות או הקאת מזון חומצי ומסריח.  
מזון תוקע את המעי, זרימת הצ'י מופרעת – כאבי בטן ושיחרור תדיר של נפיחות. שלשול מסריח כמו ביצה סרוחה או עצירות.  
צ'י עכור עולה מהקיבה – חיפוי לשון עבה ושמוני. דופק מתגלגל או עמוק וחזק.

# **7 תקיעות מזון בקיבה / RETENTION OF FOOD IN THE STOMACH**

לשון: חיפוי עבה יכול להיות לבן או צהוב

דופק: מלא ומתגלגל

סימפטומים עיקריים: מלאות ונפיחות ברום הבטן המוקלת ע"י הקאה

עקרון טיפול: הנעת המזון התקוע, חיזוק תפקוד ההורדה של צ'י הקיבה

נקודות דיקור:

PC6

SP4

ST45 – פותרת תקיעות מזון ומרגיעה נפש

ST44 – פותרת סטג מזון ומנקה חום

ST21

CV10

CV13



## 8 סטגנצית דם בקיבה / STASIS OF BLOOD IN THE STOMACH

תמיד ע"ר מצב כרוני, מסיבות מגוונות. או החמרה של דפוסי אש בקיבה, תקיעות מזון, כבד פולש לקיבה, כל הנל יכולים לגרום לסטאזיס דם בקיבה.  
בנוסף לרוב סגנציית דם נגרמת עקב סטגנצית צ'י, בעיקר של הכבד לאורך זמן ולרוב ע"ר בעיות רגשיות כגון כעס, תסכול טינה ודיכאון לאורך זמן

סימפטומים: כאב דוקר ברום הבטן המוחמר בלחץ ובחום, כאב לאחר אכילה, הקאת דם כהה, דם בצואה לשון: סגולה עם פפילות סגולות או סגולה רק במרכז

דופק: מיתרי/ מחוספס

סימפטומים עיקריים: כאב דוקר ברום הבטן המוחמר בלחץ או חימום, הקאת דם כהה עקרון טיפול:

סילוק התקיעות, החייאת הדם, חיזוק תפקוד ההורדה של צ'י הקיבה.

נקודות דיקור:

CV10 תפקוד הורדה

ST21 מסלקת חסימות

ST34 הצטברות, מניע צ'י ודם בערוץ

SP 10 מחייה דם, מניעה צ'י

BL 17 מחייה דם, פותרת תקיעות

BL 18 מניעה ופותרת תקיעות דם של כבד

ק"ד"ס:

מטופל בן 40, סובל מכאבי בטן והקאות, נפיחות ברום הבטן, המוקלת לאחר הקאה. ברקע חוסר תיאבון, ריח רע מהפה, שיהוקים ואינסומניה. היא מגיעה כל ערב מאוחר מהעבודה ואוכלת ארוחות גדולות רק בלילה.  
לשון: חיפוי עבה, דופק מלא ומתגלגל

מטופל בן 65 מתלונן על מלאות בבטן עליונה וחוסר תיאבון, כ- 3 שנים.  
בחדש האחרון נוספה תחושת כובד לתחושת המלאות, בנוסף למועקה בחזה ובבטן עליונה. מספר בנוסף על כאב צורב בבטן עליונה, חוסר שקט וטעם מר בפה.  
הלשון אדומה, חיפוי צהוב מלא במרכז  
דופק: דק, מיתרי, מהיר, מתגלגל.