

Seri bahan kuliah Algeo #13 – Update 2023

Vektor di Ruang Euclidean **(bagian 3)**

Bahan kuliah IF2123 Aljabar Linier dan Geometri

Oleh: Rinaldi Munir

Program Studi Teknik Informatika
STEI-ITB

Perkalian Silang (*cross product*)

- Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ adalah dua vektor di \mathbb{R}^3 maka perkalian silang (*cross product*) antara \mathbf{u} dan \mathbf{v} adalah

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

Tips: $\begin{bmatrix} u_1 & \boxed{u_2} & \boxed{u_3} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \boxed{u_1} & u_2 & \boxed{u_3} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \boxed{v_1} & \boxed{v_2} & v_3 \end{bmatrix}$

- Perkalian silang menghasilkan vektor, perkalian titik menghasilkan skalar

Contoh 1: Misalkan $\mathbf{u} = (0, 1, 7)$ dan $\mathbf{v} = (1, 4, 5)$, maka


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (5 - 28, -(0 - 7), 0 - 1)$$

$$= (-23, 7, -1)$$

- Jika $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{w}$ maka $\mathbf{w} \perp \mathbf{u}$ dan $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}$





- Pada Contoh 1 sebelumnya, $\mathbf{u} = (0, 1, 7)$ dan $\mathbf{v} = (1, 4, 5)$, dan sudah dihitung:

$$\begin{array}{ccccc} (0, 1, 7) \times (1, 4, 5) = (-23, 7, -1) \\ \mathbf{u} \qquad \qquad \mathbf{v} \qquad \qquad \mathbf{w} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w} \cdot \mathbf{u} &= (-23, 7, -1) \cdot (0, 1, 7) = (-23)(0) + (7)(1) + (-1)(7) \\ &= 0 + 7 - 7 = 0 \rightarrow \mathbf{w} \perp \mathbf{u} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} &= (-23, 7, -1) \cdot (1, 4, 5) = (-23)(1) + (7)(4) + (-1)(5) \\ &= -23 + 28 - 5 = 0 \rightarrow \mathbf{w} \perp \mathbf{v} \end{aligned}$$



Sifat-sifat Perkalian Silang

THEOREM 3.5.2 Properties of Cross Product

If \mathbf{u} , \mathbf{v} , and \mathbf{w} are any vectors in 3-space and k is any scalar, then:

(a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$

(b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$

(c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

(d) $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$

(e) $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

(f) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Perkalian Silang dan Perkalian Titik

THEOREM 3.5.1 Relationships Involving Cross Product and Dot Product

If \mathbf{u} , \mathbf{v} , and \mathbf{w} are vectors in 3-space, then

- (a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ *($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ is orthogonal to \mathbf{u})*
- (b) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ *($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ is orthogonal to \mathbf{v})*
- (c) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ *(Lagrange's identity)*
- (d) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ *(relationship between cross and dot products)*
- (e) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$ *(relationship between cross and dot products)*

- Menurut kesamaan Lagrange (Teorema 3.5.1(c)):


$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta)^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

θ adalah sudut antara \mathbf{u} dan \mathbf{v}

Perkalian Silang Vektor Satuan Standard

- Vektor satuan standard di \mathbb{R}^2 adalah \mathbf{i} dan \mathbf{j} :
 $\mathbf{i} = (1, 0)$ dan $\mathbf{j} = (0, 1)$
- Setiap vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ di \mathbb{R}^2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier
 $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j}$
- Vektor satuan standard di \mathbb{R}^3 adalah \mathbf{i} , \mathbf{j} , dan \mathbf{k} :
 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, dan $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$,
- Setiap vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ di \mathbb{R}^3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$




- Perkalian silang **i** dan **j**: **i** = (1, 0, 0) dan **j** = (0, 1, 0), maka

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \left(\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (0, 0, 1) = \mathbf{k}$$

- $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$ $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$
 $\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$ $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$ $\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$



- Misalkan $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$
dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$

maka, dengan menggunakan ekspansi kofaktor:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Contoh 2: Lihat kembali Contoh 1,

$$\mathbf{u} = (0, 1, 7) = \mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = (1, 4, 5) = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

maka

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 7 \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$


$$= (5 - 28)\mathbf{i} - (0 - 7)\mathbf{j} + (0 - 1)\mathbf{k}$$

$$= -23\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

Aplikasi Geometri Perkalian Silang

1. Menghitung luas area *parallelogram*

Parallelogram: area paralel yang dibentuk oleh dua buah vektor



Luas parallelogram = A


$A = \text{alas} \times \text{tinggi}$

$$= \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

$$= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \quad \longrightarrow \text{dari kesamaan Lagrange}$$

Jadi, $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ menyatakan luas area paralelogram yang ditentukan oleh vektor \mathbf{u} dan \mathbf{v}

Contoh 3: Tentukan luas segitiga yang ditentukan oleh titik $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$, dan $P_3(0, 4, 3)$.



Penyelesaian: luas segitiga = $\frac{1}{2}$ luas parallelogram

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = (-1, 0, 2) - (2, 2, 0) \\ = (-3, -2, 2)$$

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1P_3} = \overrightarrow{OP_3} - \overrightarrow{OP_1} = (0, 4, 3) - (2, 2, 0) \\ = (-2, 2, 3)$$


$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ = (-10, 5, -10)$$


Luas parallelogram: $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{(-10)^2 + (5)^2 + (-10)^2} = \sqrt{225} = 15$

Luas segitiga $P_1P_2P_3 = \frac{1}{2} (15) = 7.5$

2. Menghitung volume *parallelepide*

Parallelepide: bangun tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga buah vektor di \mathbb{R}^3 .





Tinjau tiga vektor:

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$$

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \mathbf{u} \cdot \left(\begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right) \\ &= \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} u_1 - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} u_2 + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} u_3 \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \rightarrow \text{determinan} \end{aligned}$$

Nilai mutlak dari determinan, atau $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$, menyatakan volume *parallelepiped*

Contoh 4: Tentukan volume *parallelepiped* yang dibentuk oleh tiga buah vektor $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, dan $\mathbf{w} = 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3 \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (-5) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 60 + 4 - 15 \\ &= 49\end{aligned}$$

Volume parallelepiped adalah $|49| = 49$


Tafsiran Geometri Determinan

- Kembali ke determinan
- Misalkan $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ adalah vektor-vektor di \mathbb{R}^2 . Nilai mutlak dari **determinan**

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

kalo 2 dimensi, determinan = luas

menyatakan **luas parallelogram** yang dibentuk oleh \mathbf{u} dan \mathbf{v} .




- Misalkan $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, dan $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$, adalah vektor-vektor di \mathbb{R}^3 . Nilai mutlak dari **determinan**

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

kalo 3 dimensi, determinan = volume

menyatakan **volume paralelepiped** yang dibentuk oleh \mathbf{u} , \mathbf{v} dan \mathbf{w} .



Contoh 5: Tentukan luas *parallelogram* yang dibentuk oleh dua buah vektor $\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ dan $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

Penyelesaian:

$$\det\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = -16 - 9 = -25$$

Luas parellogram yang dibentuk oleh \mathbf{u} dan \mathbf{v} adalah $|-25| = 25$

Contoh 6: Misalkan tiga buah vektor di \mathbb{R}^3 berikut memiliki titik asal yang sama
 $\mathbf{u} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 5)$, dan $\mathbf{w} = (3, 3, 1)$

Perlihatkan bahwa ketiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang yang sama.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} &= (1) \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} & \text{det 0 = di bidang sama} \\ &= (1)(-14) - (1)(-14) + (2)(0) = -14 + 14 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Karena determinan = 0, berarti volume *parallelepiped* = 0, dengan kata lain ketiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang yang sama.

Latihan (Kuis 2022)

Diketahui vektor $\mathbf{u} = (5, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (4, -1, 1)$, dan $\mathbf{w} = (1, -1, 0)$ memiliki titik asal yang sama

- Tunjukkan bahwa ketiga vektor tersebut terletak pada bidang yang sama.
- Dengan menggunakan normal bidang, tentukan persamaan bidang pada soal a)
- Tentukan jarak dari titik $P(3, -2, 0)$ ke bidang pada soal a) di atas

Jawaban:

- Ada banyak cara untuk menunjukkan tiga buah vektor terletak dalam satu bidang yang sama, salah satunya adalah dengan menunjukkan bahwa volume parallelepide yang dibentuk oleh ketiga vektor tersebut sama dengan nol.

$$V = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Karena volume parallelepide sama dengan 0, maka tiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang

kalo 2 vektor terletak pada 1 bidang, normalnya $u \times v$

b) Persamaan bidang:

Tentukan normal terlebih dahulu

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (5, -2, 1) \times (4, -1, 1) = (-1, -1, 3)$$

Persamaan bidang dengan $\mathbf{n} = (a, b, c) = (-1, -1, 3)$ dan melalui $(x_0, y_0, z_0) = (5, -2, 1)$ sebagai acuan adalah:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-(x - 5) - 1(y + 2) + 3(z - 1) = 0$$

$$-x + 5 - y - 2 + 3z - 3 = 0$$

$$x + y - 3z = 0$$

Jika menggunakan titik $(4, -1, 1)$ sebagai acuan, maka

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-(x - 4) - 1(y + 1) + 3(z - 1) = 0$$

$$-x + 4 - y - 1 + 3z - 3 = 0$$

$$x + y - 3z = 0$$

Jika menggunakan titik (1,-1,0) sebagai acuan, maka

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-(x - 1) - 1(y + 1) + 3(z - 0) = 0$$

$$-x + 1 - y - 1 + 3z - 0 = 0$$

$$x + y - 3z = 0$$

Hasilnya sama

c) Tentukan jarak dari titik P(3, -2, 0) ke bidang $x + y - 3z = 0$ adalah

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|(1)(3) + (1)(-2) + (-3)(0) + 0|}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (-3)^2}} = \frac{|1|}{\sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{11}} \times \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{11}} = \frac{1}{11} \sqrt{11}$$

Latihan (Kuis 2021)

Diketahui tiga buah titik $P(2, 6, 1)$, $Q(4, 2, 8)$, dan $R(-8, 4, 10)$.

- Dengan menggunakan normal bidang, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P , Q , dan R
- Jika $S(-2, 0, 1)$ adalah sebuah titik yang tidak terletak pada bidang dari jawaban a di atas, tentukan panjang proyeksi vektor PS pada vektor PQ tersebut dan sudut yang dibentuk vektor PS dengan PQ .

Jawaban:

a) Normal bidang: $\mathbf{n} = \mathbf{PQ} \times \mathbf{PR}$

$$\mathbf{PQ} = (4, 2, 8) - (2, 6, 1) = (2, -4, 7)$$

$$\mathbf{PR} = (-8, 4, 10) - (2, 6, 1) = (-10, -2, 9)$$

$$\mathbf{n} = \mathbf{PQ} \times \mathbf{PR} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -4 & 7 \\ -10 & -2 & 9 \end{vmatrix} = -22\mathbf{i} - 88\mathbf{j} - 44\mathbf{k}$$

Jadi, $\mathbf{n} = (-22, -88, -44)$

Persamaan bidang yang melalui titik P sebagai acuan adalah:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-22(x - 2) - 88(y - 6) - 44(z - 1) = 0$$

$$-22x + 44 - 88y + 528 - 44z + 44 = 0$$

$$-22x - 88y - 44z + 616 = 0$$

$$x + 4y + 2z - 28 = 0$$

b) $\mathbf{PS} = (-2, 0, 1) - (2, 6, 1) = (-4, -6, 0)$

Proyeksi vektor \mathbf{PS} pada vektor \mathbf{PQ} misalkan adalah \mathbf{x} :

$$= \frac{\mathbf{PS} \cdot \mathbf{PQ}}{\|\mathbf{PQ}\|^2} \mathbf{PQ} = \frac{(-4)(2) + (-6)(-4) + (0)(7)}{2^2 + (-4)^2 + (7)^2} (2, -4, 7) = \frac{16}{69} (2, -4, 7) = \left(\frac{32}{69}, -\frac{64}{69}, \frac{112}{69} \right)$$

$$\text{Panjang } \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\left(\frac{32}{69}\right)^2 + \left(-\frac{64}{69}\right)^2 + \left(\frac{112}{69}\right)^2} = \frac{16}{69} \sqrt{69}$$

Sudut yang dibentuk oleh vektor PS dan vektor PQ adalah:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{PS} \cdot \mathbf{PQ}}{\|\mathbf{PS}\| \|\mathbf{PQ}\|} = \frac{(-4)(2) + (-6)(-4) + (0)(7)}{\sqrt{(-4)^2 + (-6)^2 + 0^2} \sqrt{2^2 + (-4)^2 + (7)^2}} = \frac{16}{\sqrt{52} \sqrt{69}} = \frac{16}{\sqrt{3588}} = 0.267$$

$$\theta = 74.51^\circ$$

Latihan (Kuis 2022)

Diketahui empat buah titik $A(0,1,0)$; $B(2,1,2)$, $C(3,2,1)$; $D(3,1,2)$.

- a) Hitunglah luas segitiga yang dibentuk oleh A,C, dan D
- b) Jika tiga titik A,C,D merupakan alas dari paralelepiped A,B,C,D, hitunglah volumenya.

Jawaban: (halaman sebelah)

Jawaban a)

$$\overline{AC} = \{C_x - A_x; C_y - A_y; C_z - A_z\} = \{3 - 0; 2 - 1; 1 - 0\} = \{3; 1; 1\}$$

$$\overline{AD} = \{D_x - A_x; D_y - A_y; D_z - A_z\} = \{3 - 0; 1 - 1; 2 - 0\} = \{3; 0; 2\}$$

$$A = \frac{1}{2} |\overline{AC} \times \overline{AD}|$$

Calculate [cross product of vectors](#):

$$\overline{c} = \overline{AC} \times \overline{AD}$$

$$\overline{AC} \times \overline{AD} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ AC_x & AC_y & AC_z \\ AD_x & AD_y & AD_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) - \mathbf{j}(3 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + \mathbf{k}(3 \cdot 0 - 1 \cdot 3) = \mathbf{i}(2 - 0) - \mathbf{j}(6 - 3) + \mathbf{k}(0 - 3) =$$

$$= \{2; -3; -3\}$$

Calculate [magnitude of a vector](#):

$$|\overline{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9 + 9} = \sqrt{22}$$

Calculate triangle area:

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{22} = \frac{\sqrt{22}}{2} \approx 2.345207879911715$$

Jawaban b)

Calculate [vector by initial and terminal points](#):

$$\overline{AB} = \{B_x - A_x; B_y - A_y; B_z - A_z\} = \{2 - 0; 1 - 1; 2 - 0\} = \{2; 0; 2\}$$

$$\overline{AC} = \{C_x - A_x; C_y - A_y; C_z - A_z\} = \{3 - 0; 2 - 1; 1 - 0\} = \{3; 1; 1\}$$

$$\overline{AD} = \{D_x - A_x; D_y - A_y; D_z - A_z\} = \{3 - 0; 1 - 1; 2 - 0\} = \{3; 0; 2\}$$

$$\overline{AB} \cdot (\overline{AC} \times \overline{AD}) = \begin{vmatrix} \overline{AB}_x & \overline{AB}_y & \overline{AB}_z \\ \overline{AC}_x & \overline{AC}_y & \overline{AC}_z \\ \overline{AD}_x & \overline{AD}_y & \overline{AD}_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 3 - 0 \cdot 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 0 = 4 + 0 + 0 - 6 - 0 - 0 =$$
$$= -2$$

Volumenya $|-2| = 2$

TAMAT