



Listado 11: Números Complejos

Este listado de problemas se ha dividido en tres secciones: problemas básicos, problemas intermedios y problemas avanzados.

Los problemas marcados con **(A)** serán resueltos en la ayudantía, propuestas de solución de los mismos serán publicadas cuando publiquemos el siguiente listado.

Te exhortamos a revisar frecuentemente la página Canvas del curso, revisar el material publicado en ella contribuirá a mejorar tu aprendizaje de los temas del curso.

1. Problemas básicos

1. Expresé en forma polar los siguientes números complejos:

(a) $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$,

(b) $z_2 = -2 + 2\sqrt{3}i$,

(c) $z_3 = 1 - i$,

(d) $z_4 = (\sqrt{3} - i)(1 + i)$,

(e) $z_5 = \frac{(1 - i)^2}{4 + i}$.

(f) $-3\text{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

(g) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

2. Represente en el plano de Argand los siguientes números complejos.

(a) $2\text{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

(b) $5\text{cis}(560^\circ)$.

(c) $3\text{cis}(-210^\circ)$.

(d) $4\text{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

(e) $\text{cis}(90^\circ)$.

De cada uno de ellos determine argumento principal y, sin cambiarlos a forma binomial, escriba sus inversos aditivo y multiplicativo y conjugado, también en forma polar.

Escríbalos en forma binomial.

2. Problemas intermedios

1. Considere el siguiente número complejo $z = (1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})^{-1}$.

(a) Expresé z en forma binomial.

(b) Pruebe que $z^4 = z$.

(c) Determine las raíces cuartas de z .

2. Resuelva las ecuaciones en \mathbb{C} .

(a) $z^2 - 1 + 2i = 0$.

(b) $3iz^2 + 2\sqrt{6}iz - 2 = 0$.

(c) $(1 + z)^5 = z^5$.

(d) $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$.

(e) $5z^2 + 2z + 10 = 0$.

(f) $z^8 - \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} = 0$.

(g) $(1 + i^{-8})z^4 = -2 + 2i$.

3. Resuelva las siguientes ecuaciones en \mathbb{C} :

(a) $z = \bar{z}$,

(c) $z^2 = 3 - 4i$,

(b) $z + i = 2 + i + \overline{2i}$,

(d) $z^2 = 2z - 1$.

4. **(A)** Sea \mathcal{C} el subconjunto de los números complejos cuyo argumento principal es $\frac{\pi}{6}$, es decir:

$$\mathcal{C} = \left\{ w \in \mathbb{C} : \text{Arg}(w) = \frac{\pi}{6} \right\}$$

(a) Represente el conjunto \mathcal{C} en plano de Argand.

(b) Sea z un número complejo en \mathcal{C} , determine $\text{Arg}(-z)$ y $\text{Arg}(\bar{z})$.

(c) Escriba $\frac{(1-i)^{17}}{1+i^{17}}$ en forma polar.

(d) Sea

$$\mathcal{D} = \left\{ z \in \mathcal{C} : \left| z \frac{(1-i)^{17}}{1+i^{17}} \right| < 2^{10} \right\}.$$

Represente \mathcal{D} en plano de Argand.

5. **(A)** Sea $a = \text{cis}(\frac{\pi}{6})$.

(a) Calcule el número complejo $z = (1 + \sqrt{3}i)^5 a^{17}$.

(b) Pruebe que $\text{Re}(z) = 0$.

(c) Resuelva en \mathbb{C} la ecuación $w^5 = 32$.

6. Encuentre todos los valores posibles de $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^6(1+i) = 1-i$.

7. Dado $z = 2(1 - i\sqrt{3})$, calcule las raíces cuartas de z^3 .

8. Encuentre $z \in \mathbb{C}$ tal que:

$$\text{Re}(z + 1 - i) \leq 2 \quad \text{y} \quad z^4 - 81 = 0.$$

9. Calcule $\overline{\left(\frac{7+i}{3+4i} \right)^{43}}$.

10. Calcule:

(a) raíces sextas de 8.

(d) raíces sextas de $16\text{cis}(90^\circ)$.

(b) raíces sextas de $8\text{cis}(60^\circ)$.

(c) raíces quintas de i .

(e) **(A)** raíces novenas de $1 + \sqrt{3}i$.

11. **(A)** Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$, $(1 + i\sqrt{3})^n + (1 - i\sqrt{3})^n = 2^{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$.

12. Represente los siguientes conjuntos de números complejos en plano de Argand.

(a) $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) \geq 2\}$.

(b) $\{z \in \mathbb{C} : -\frac{3\pi}{4} \leq \text{Arg}(z) \leq -\frac{\pi}{4}\}$.

(c) $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$.

(d) $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2 \wedge \text{Arg}(z) \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]\}$.

13. Sea $\alpha \in \mathbb{R}^+$. Escriba los siguientes números en forma polar.

$$\begin{array}{lll}
\text{(a)} \quad z_1 = \frac{1 + \alpha i}{1 - \alpha i} & \text{(c)} \quad z_3 = \frac{-1 + \alpha i}{-1 - \alpha i} & \text{(e)} \quad z_5 = \overline{\left(\frac{\alpha + i}{\alpha - i} \right)} \\
\text{(b)} \quad z_2 = \frac{\alpha + i}{\alpha - i} & \text{(d)} \quad z_4 = \overline{\left(\frac{-1 + \alpha i}{-1 - \alpha i} \right)} &
\end{array}$$

3. Problemas avanzados

1. Determine

$$\frac{1}{(1+i)^n} + \frac{1}{(1-i)^n}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \text{ par}.$$

2. Sea $n \in \mathbb{N}$, determine la forma polar de $(1+i)^n + (1-i)^n$.

3. Considere el número complejo $w = 1 + i \tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

- (a) Escriba w y \bar{w} en forma polar.
(b) Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$w^n + \bar{w}^n = 2 \left(\sec\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)^n \cos\left(\frac{n\pi}{12}\right).$$

Observación: Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\}$ se cumple que $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$.

4. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}, \theta \in \mathbb{R} - \{x : \cos(x) = 0\}$, se cumple la siguiente identidad:

$$\left(\frac{1 + i \tan(\theta)}{1 - i \tan(\theta)} \right)^n = \frac{1 + i \tan(n\theta)}{1 - i \tan(n\theta)}$$

Indicación: Puede utilizar que para todo número natural n y todo $\theta \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

5. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.

- (a) Si z es un complejo real mayor que cero, entonces cada raíz cuarta de z es un complejo real o un imaginario puro.
(b) Si $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ y w es una raíz n -ésima, entonces $-w$ es raíz n -ésima de $-z$.
(c) Si $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ y w es una raíz n -ésima, entonces \bar{w} es raíz n -ésima de \bar{z} .
(d) Si $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ es imaginario puro, entonces una de las raíces cúbicas de z también es un número imaginario puro. Si $|z| = r$, la raíz cúbica de z que es imaginario puro tiene mismo argumento principal que z y su módulo es $\sqrt[3]{r}$.