

¿Cómo se soluciona una EDO lineal homogénea con coeficientes constantes?

Caso: Polinomio característico con raíces reales múltiples

Carlos M. Mora

Solución general de una EDO lineal de orden n homogénea

Considere la EDO

$$Y^{(n)}(x) + a_1(x) Y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_{n-1}(x) Y'(x) + a_n(x) Y(x) = 0 \quad \forall x \in]\alpha, \beta[\quad (1)$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n, g :]\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas con $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$.

Un conjunto de n soluciones f_1, f_2, \dots, f_n linealmente independientes de (1) es llamado sistema fundamental de soluciones de (1).

Asumamos que f_1, f_2, \dots, f_n es un sistema fundamental de soluciones de (1). Entonces, para toda solución de (1) existen constantes $C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$Y(x) = C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) + \cdots + C_n f_n(x).$$

Escritura con operador Derivada

Fijemos $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Considere la EDO lineal de coeficientes constantes

$$Y^{(n)}(x) + a_1 Y^{(n-1)}(x) + \dots + a_{n-1} Y'(x) + a_n Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$D = \frac{d}{dx}$$

$$D^n Y(x) + a_1 D^{n-1} Y(x) + \dots + a_{n-1} D Y(x) + a_n Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$(D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n) Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Polinomio característico

Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

Factorización

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_q)^{m_q}$$

con $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ números diferentes

$$D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n = (D - \lambda_1)^{m_1} (D - \lambda_2)^{m_2} \dots (D - \lambda_q)^{m_q}$$

Problema

Asuma que $p, q \in \mathbb{R}$ son tales que $\frac{p^2}{4} - q = 0$. Encuentre la solución general de:

$$Y''(x) + p Y'(x) + q Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Ya que $\frac{p^2}{4} - q = 0$, el polinomio característico $\lambda^2 + p\lambda + q$ tiene una única raíz que es $\lambda = -\frac{p}{2}$. Entonces $Y(x) = \exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$, satisface (2).

Definamos $D = \frac{d}{dx}$. Entonces (2) se reescribe como

$$(D^2 + pD + q) Y(x) = 0 \Leftrightarrow \left(D^2 + pD + \frac{p^2}{4}\right) Y(x) = 0 \Leftrightarrow \left(D + \frac{p}{2}\right)^2 Y(x) = 0.$$

$$\begin{aligned} \left(D + \frac{p}{2}\right)^2 \left(xe^{-\frac{p}{2}x}\right) &= \left(D + \frac{p}{2}\right) \left(D + \frac{p}{2}\right) \left(xe^{-\frac{p}{2}x}\right) = \left(D + \frac{p}{2}\right) \left(D \left(xe^{-\frac{p}{2}x}\right) + \frac{p}{2}xe^{-\frac{p}{2}x}\right) \\ &= \left(D + \frac{p}{2}\right) \left(e^{-\frac{p}{2}x} + x \left(-\frac{p}{2}\right) e^{-\frac{p}{2}x} + \frac{p}{2}xe^{-\frac{p}{2}x}\right) = \left(D + \frac{p}{2}\right) \left(e^{-\frac{p}{2}x}\right) = 0. \end{aligned}$$

Luego $xe^{-\frac{p}{2}x}$ satisface (2).

Problema

Asuma que $p, q \in \mathbb{R}$ son tales que $\frac{p^2}{4} - q = 0$. Encuentre la solución general de:

$$Y''(x) + p Y'(x) + q Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Tenemos que las funciones $\exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$ y $x \exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$ satisfacen (3).

Sean $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$c_1 \exp\left(-\frac{p}{2}x\right) + c_2 x \exp\left(-\frac{p}{2}x\right) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Luego $c_1 + c_2 x = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Lo que implica que $c_1 = c_2 = 0$, por ende $\exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$ y $x \exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$ son linealmente independientes. Por lo que la solución general de (3) es:

$$Y(x) = C_1 \exp\left(-\frac{p}{2}x\right) + C_2 x \exp\left(-\frac{p}{2}x\right)$$

Encuentre la solución general de

$$Y''(x) + 4 Y'(x) + 4 Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$


Polinomio característico: $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2$.

Solución general:

$$Y(x) = C_1 \exp(-2x) + C_2 x \exp(-2x).$$

con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Cuando x se acerca a $+\infty$ la solución decrece rápidamente a 0. No hay oscilaciones.



Núcleo del operador $(D - \lambda)^m$ con $m \in \mathbb{N}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

Las funciones $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$ son linealmente independientes y son aniquiladas por $(D - \lambda)^m$, o sea, para $k = 0, \dots, m - 1$,

$$(D - \lambda)^m (x^k e^{\lambda x}) = 0$$

Independencia lineal

$$k_1 e^{\lambda x} + k_2 x e^{\lambda x} + \dots + k_m x^{m-1} e^{\lambda x} = 0$$

$$k_1 + k_2 x + \dots + k_m x^{m-1} = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0.$$

Inicio: $m = 1$

$$(D - \lambda)(e^{\lambda x}) = D(e^{\lambda x}) - \lambda e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x} - \lambda e^{\lambda x} = 0.$$

Paso de inducción

Asumamos que $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$ son aniquiladas por $(D - \lambda)^m$.

Para $k = 0, \dots, m - 1$, $(D - \lambda)^{m+1}(x^k e^{\lambda x}) = (D - \lambda)(D - \lambda)^m(x^k e^{\lambda x}) = 0$.

$$(D - \lambda)^{m+1}(x^m e^{\lambda x}) = (D - \lambda)^m(D - \lambda)(x^m e^{\lambda x}) = (D - \lambda)^m(D(x^m e^{\lambda x}) - \lambda x^m e^{\lambda x})$$

$$(D - \lambda)^{m+1}(x^m e^{\lambda x}) = (D - \lambda)^m(m x^{m-1} e^{\lambda x} + x^m \lambda e^{\lambda x} - \lambda x^m e^{\lambda x}) = m(D - \lambda)^m(x^{m-1} e^{\lambda x}) = 0$$

Ejemplo (raíces reales múltiples)

Encuentre la solución general de

$$Y^{(4)}(x) - 8 Y'''(x) + 18 Y''(x) - 27 Y'(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Las funciones $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$ son linealmente independientes y son aniquiladas por $(D - \lambda)^m$,

$$(D^4 - 8 D^3 + 18 D^2 - 27 D) Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Polinomio característico: $p(\lambda) = \lambda^4 - 8\lambda^3 + 18\lambda^2 - 27\lambda = (\lambda + 1)(\lambda - 3)^3$.

$$D^4 - 8 D^3 + 18 D^2 - 27 D = (D + 1)(D - 3)^3$$

Ejemplo (raíces reales múltiples)

Encuentre la solución general de

$$Y^{(4)}(x) - 8 Y'''(x) + 18 Y''(x) - 27 Y'(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Polinomio característico: $p(\lambda) = \lambda^4 - 8\lambda^3 + 18\lambda^2 - 27\lambda = (\lambda + 1)(\lambda - 3)^3$.

La solución general es

$$Y(x) = C_1 \exp(-x) + C_2 \exp(3x) + C_3 x \exp(3x) + C_4 x^2 \exp(3x)$$

con $C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}$.

Conclusión

Fijemos $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Considere la EDO lineal de coeficientes constantes

$$Y^{(n)}(x) + a_1 Y^{(n-1)}(x) + \dots + a_{n-1} Y'(x) + a_n Y(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

El polinomio característico $p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$ tiene la factorización

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_q)^{m_q}$$

con $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ números reales diferentes y $m_1, m_2, \dots, m_q \in \mathbb{R}$.

Un sistema fundamental de soluciones está formado por:

$$\exp(\lambda_k x), x \exp(\lambda_k x), \dots, x^{m_k-1} \exp(\lambda_k x)$$