

**Pauta Evaluación 2**  
*Cálculo Numérico 521230*

1. Considere los **polinomios de Legendre** definidos por  $p_0(x) = 1$ ,  $p_1(x) = x$  y

$$p_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xp_n(x) - \frac{n}{n+1}p_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

- a) (6 pts) Obtenga el polinomio  $p_3(x)$  usando la recurrencia.  
b) (4 pts) Calcule las raíces de  $p_3$ :  $x_1 < x_2 < x_3$ .  
c) (6 pts) Usando  $x_1, x_2, x_3$  como nodos, escriba tres ecuaciones que permitan determinar los pesos  $A_1, A_2, A_3$  de la regla

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3),$$

exigiendo exactitud para  $f(x) = 1, x$  y  $x^2$ .

- d) (4 pts) Con los pesos anteriores, verifique que la regla también es exacta para  $f(x) = x^3, x^4$  y  $x^5$ .

**Solución:**

- a) Calculamos primero  $p_2$ , con  $n = 1$ :

$$p_2(x) = \frac{2 \cdot 1 + 1}{1 + 1}xp_1(x) - \frac{1}{1 + 1}p_0(x) = \frac{3}{2}x \cdot x - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2},$$

y enseguida  $p_3$ , con  $n = 2$ :

$$\begin{aligned} p_3(x) &= \frac{2 \cdot 2 + 1}{2 + 1}xp_2(x) - \frac{2}{2 + 1}p_1(x) \\ &= \frac{5}{3}x \cdot \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) - \frac{2}{3}x \\ &= \frac{5}{2}x^3 - \frac{5}{6}x - \frac{2}{3}x \\ &= \frac{5}{2}x^3 - \left(\frac{5}{6} + \frac{2}{3}\right)x \\ &= \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x. \end{aligned}$$

- b) Calculamos las raíces de  $p_3$ :

$$p_3(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x = 0 \Leftrightarrow 5x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow 5x \left(x^2 - \frac{3}{5}\right) = 0,$$

con lo cual las raíces de  $p_3$ , ordenadas de menor a mayor, son:

$$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_2 = 0 \quad \text{y} \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

- c) Si queremos que la regla de integración sea exacta para cualquier polinomio de grado menor o igual que 3, por linealidad basta con imponer que sea exacta sobre una base de ese espacio. Usando la base canónica, impondremos que

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3)$$

cuando  $f(x) = x^j$ , para  $j = 0, \dots, 5$ :

$j = 0$ : aquí  $f(x) = 1$  y entonces queda la ecuación  $A_1 + A_2 + A_3 = \int_{-1}^1 dx = 2$ .

$j = 1$ : en este caso, tenemos

$$A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 = \int_{-1}^1 x \, dx \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{3}{5}} A_1 + \sqrt{\frac{3}{5}} A_3 = 0 \Leftrightarrow A_1 - A_3 = 0.$$

$j = 2$ : nos queda

$$A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 + A_3 x_3^2 = \int_{-1}^1 x^2 \, dx \Leftrightarrow \frac{3}{5} A_1 + \frac{3}{5} A_3 = \frac{2}{3} \Leftrightarrow A_1 + A_3 = \frac{10}{9}.$$

- d) Probemos que la regla de integración es exacta para cualquier polinomio de grado menor o igual que 5,

$j = 3$ : aquí resulta

$$A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 + A_3 x_3^3 = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 \Leftrightarrow A_1 \left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^3 + A_3 \left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^3 = 0,$$

y debido al exponente impar, obtenemos la misma ecuación que en el caso  $j = 1$ .

$j = 4$ : nos queda

$$A_1 x_1^4 + A_2 x_2^4 + A_3 x_3^4 = \int_{-1}^1 x^4 \, dx \Leftrightarrow \frac{9}{25} A_1 + \frac{9}{25} A_3 = \frac{2}{5} \Leftrightarrow A_1 + A_3 = \frac{10}{9},$$

que es exactamente la misma ecuación que en el caso cuando  $j = 2$ .

$j = 5$ : por último, tenemos

$$A_1 x_1^5 + A_2 x_2^5 + A_3 x_3^5 = \int_{-1}^1 x^5 \, dx \Leftrightarrow A_1 \left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^5 + A_3 \left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^5 = 0,$$

e igualmente que en casos anteriores, por el exponente impar obtenemos la ecuación del caso  $j = 1$ .

Así, las tres ecuaciones que nos permiten encontrar el valor de los coeficientes  $A_1$ ,  $A_2$  y  $A_3$  de modo que (??) es exacta para polinomios de grado menor o igual que 5 son

$$A_1 + A_2 + A_3 = 2, \quad A_1 - A_3 = 0 \quad \text{y} \quad A_1 + A_3 = \frac{10}{9}.$$

2. Considere el PVI

$$y'' + y = x^2 + 2, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

La solución exacta es  $y(x) = x^2$ . Use paso  $h = 1$ .

- a) (6 pts) Reescriba el PVI como un sistema de primer orden  $u'_1 = F_1(x, u_1, u_2)$ ,  $u'_2 = F_2(x, u_1, u_2)$ , indicando claramente  $u_1, u_2$ .
- b) (8 pts) Aplique Euler explícito para obtener  $(u_1(1), u_2(1))$  y  $(u_1(2), u_2(2))$ .
- c) (6 pts) Aplique Euler implícito solo en el primer paso ( $0 \rightarrow 1$ ), plantee el sistema lineal resultante y determine  $(u_1(1), u_2(1))$ . Compare con  $y(1) = 1$  e indique cuál método aproxima mejor.

**Solución.**

**(a) Reescritura como sistema (6 puntos)**

Definimos

$$u_1 = y, \quad u_2 = y'.$$

Entonces

$$u'_1 = y' = u_2,$$

y como

$$y'' = -y + (x^2 + 2),$$

obtiene

$$u'_2 = -u_1 + (x^2 + 2).$$

**(b) Euler explícito con  $h = 1$  (8 puntos)**

Fórmulas:

$$u_1^{n+1} = u_1^n + h u_2^n, \quad u_2^{n+1} = u_2^n + h(-u_1^n + (x_n^2 + 2)).$$

Condiciones iniciales:

$$u_1(0) = 0, \quad u_2(0) = 0.$$

Primer paso:  $x_0 = 0 \rightarrow x_1 = 1$

Aquí  $f(0) = 0^2 + 2 = 2$ .

$$u_1(1) = 0 + 1 \cdot 0 = 0,$$

$$u_2(1) = 0 + 1 \cdot (-0 + 2) = 2.$$

Segundo paso:  $x_1 = 1 \rightarrow x_2 = 2$

Aquí  $f(1) = 1 + 2 = 3$ .

$$u_1(2) = u_1(1) + u_2(1) = 0 + 2 = 2,$$

$$u_2(2) = u_2(1) + (-u_1(1) + 3) = 2 + (0 + 3) = 5.$$

$$\boxed{(u_1(1), u_2(1)) = (0, 2)}, \quad \boxed{(u_1(2), u_2(2)) = (2, 5)}.$$

**(c) Euler implícito — primer paso (6 puntos)**

Fórmulas:

$$u_1^1 = u_1^0 + h u_2^1, \quad u_2^1 = u_2^0 + h(-u_1^1 + (x_1^2 + 2)).$$

Datos:  $u_1^0 = 0$ ,  $u_2^0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ , y  $f(1) = 3$ .

$$\begin{aligned} u_1^1 &= u_2^1, \\ u_2^1 &= -u_1^1 + 3. \end{aligned}$$

Sustituyendo  $u_1^1 = u_2^1$ :

$$u_2^1 = -u_2^1 + 3 \quad \Rightarrow \quad 2u_2^1 = 3 \quad \Rightarrow \quad u_2^1 = \frac{3}{2}.$$

Entonces

$$u_1^1 = u_2^1 = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{(u_1(1), u_2(1)) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}.$$

Comparación con el valor exacto

La solución exacta es  $y(x) = x^2$ , por lo que

$$y(1) = 1.$$

Aproximaciones:

Euler explícito:  $u_1(1) = 0$  (error = 1),

Euler implícito:  $u_1(1) = \frac{3}{2}$  (error = 0,5).

El método implícito da un valor más cercano al exacto en este primer paso.

3. Considere el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  dado por

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- a) (6 pts) Demuestre que se puede aplicar el método de Cholesky para resolver el sistema.
- b) (6 pts) Compruebe si los métodos de Jacobi y Gauss–Seidel convergen para este sistema, indicando claramente qué criterio de convergencia utiliza (por ejemplo, dominancia diagonal estricta o que  $A$  sea simétrica definida positiva).
- (c) Con  $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)^T$ , realice:
  - (4 pts) una iteración del método de Jacobi, y
  - (4 pts) una iteración del método de Gauss–Seidel,entregando los vectores  $\mathbf{x}^{(1)}$  obtenidos en ambos casos.

**Solución:**

**(a) Demuestre que se puede aplicar el método de Cholesky**

**Puntaje: 6 puntos**

Para aplicar Cholesky es suficiente que  $A$  sea simétrica definida positiva.

- $A$  es simétrica:  $A = A^T$ . (1 pt)
- Comprobación de menores principales:

$$\Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = 16 - 1 = 15 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(A) = 56 > 0.$$

(3 pt)

- Con los tres menores principales positivos concluimos que  $A$  es **SPD** y, por tanto, existe la factorización  $A = LL^T$ . (2 pt)
- (Opcional) Una factorización explícita es

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{15}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{15}} & \frac{2\sqrt{210}}{15} \end{pmatrix},$$

y se puede resolver  $Ly = \mathbf{b}$ ,  $L^T \mathbf{x} = y$ .

## (b) Convergencia de Jacobi y Gauss–Seidel

**Puntaje: 6 puntos**

- Verificar dominancia diagonal estricta por filas:

$$|4| > |-1| + |0| = 1,$$

$$|4| > |-1| + |-1| = 2,$$

$$|4| > |-1| + |0| = 1.$$

Por tanto,  $A$  es estrictamente diagonalmente dominante. (2.0 pt)

- Consecuencia: la dominancia diagonal estricta garantiza la convergencia de **Jacobi** y **Gauss–Seidel** para cualquier vector inicial. (2.0 pt)
- Alternativa válida: probar que  $A$  es SPD (ítem (a)) y citar la convergencia de Gauss–Seidel para matrices SPD; para Jacobi conviene usar la dominancia o calcular  $\rho(B_J) < 1$ . (2.0 pt)

## (c) Iteraciones (Puntaje: 8 puntos)

Partiendo de  $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)^T$ .

### Jacobi (4 pt)

Las fórmulas de Jacobi, para este sistema, son:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 + x_2^{(k)}}{4}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{4}, \quad x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 + x_2^{(k)}}{4}.$$

Sustituyendo  $\mathbf{b} = (3, 6, 3)^T$  y  $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)$ :

$$x_1^{(1)} = \frac{3+1}{4} = \frac{4}{4} = 1, \quad x_2^{(1)} = \frac{6+1+1}{4} = \frac{8}{4} = 2, \quad x_3^{(1)} = \frac{3+1}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}_{\text{Jacobi}}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(4 pt: 1 pt por planteamiento, 3 pt por cálculo/resultado correcto)

### Gauss–Seidel (4 pt)

Actualizando secuencialmente con los valores más recientes:

$$x_1^{(1)} = \frac{3 + x_2^{(0)}}{4} = \frac{3+1}{4} = 1.$$

$$x_2^{(1)} = \frac{6 + x_1^{(1)} + x_3^{(0)}}{4} = \frac{6+1+1}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

$$x_3^{(1)} = \frac{3 + x_2^{(1)}}{4} = \frac{3 + 2}{4} = \frac{5}{4}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}_{\text{GS}}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

(4 pt: 1 pt por esquema, 3 pt por cálculo/resultado correcto)

**Solución exacta:** resolviendo  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  con  $\mathbf{b} = (3, 6, 3)^T$  se obtiene la solución exacta

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{9}{7} \\ \frac{15}{7} \\ \frac{9}{7} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,28571 \\ 2,14286 \\ 1,28571 \end{pmatrix}.$$

Comparando:

- Tras la primera iteración, Jacobi da  $(1, 2, 1)^T$ .
- Tras la primera iteración, Gauss–Seidel da  $(1, 2, 5/4)^T$ , que aproxima mejor la componente 3.