

**Problema 1.** Sea la función  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x, y, z) = \begin{cases} xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y, z) \notin C \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \in C \end{cases}, \text{ donde } C := \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

- a) Demostrar que  $f$  es continua en  $C$ .
- b) Si  $(x, y, z) \in C$ , ¿es  $f$  diferenciable en  $(x, y, z)$ ?
- c) Si  $(x, y, z) \in C$ , calcular, si existen  $f_{yx}(x, y, z)$  y  $f_{xy}(x, y, z)$ .
- d) ¿Es  $f$  de clase  $C^2$  en vecindades de  $(0, 0, 1)$ ? ¿de  $(0, 0, 0)$ ?

**Solucion:**

a) Si  $(x, y, z) \notin C$  se tiene que  $f(x, y, z) = xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$  y además:

$$0 \leq \left| \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \right| \leq 1, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left| xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \right| \leq |xyz|, \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus C$$

$$\Rightarrow 0 \leq |f(x, y, z)| \leq |xyz|, \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus C$$

Sea  $(0, 0, a) \in C$ , usando lo anteriormente obtenido concluimos que:

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, a)} 0 = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, a)} |xyz| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, a)} f(x, y, z) = 0, \quad \forall (0, 0, a) \in C$$

Y dado que si  $(0, 0, a) \in C$  entonces  $f(0, 0, a) = 0$  se tiene que:

$$f(0, 0, a) = \lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, a)} f(x, y, z), \quad \forall (0, 0, a) \in C$$

Por tanto, concluimos que  $f$  es continua en cualquier punto de  $C$ .

b) Sea  $\varphi := (0, 0, a) \in C$ , para determinar la diferenciabilidad de  $f$  en algún  $\varphi \in C$  usando la **definición 2.7** buscamos calcular  $\nabla f(\varphi)$ , como sigue:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0, a) - f(0, 0, a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h, a) - f(0, 0, a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0, h + a) - f(0, 0, a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

Así de lo anterior concluimos que  $\nabla f(\varphi) = (0, 0, 0), \forall \varphi \in C$  y de la **definición 2.7** deducimos que:

$$f^0(x, y, z) = \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} = \frac{xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$$

Luego nos interesa calcular el valor de :

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,a)} \frac{xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$$

para ello notemos que:

$$0 \leq \left| \frac{xyz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} \right| \leq \frac{|xyz|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\|x, y\|_2 |yz|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq |yz|, \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus C$$

y como

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,a)} 0 = 0 \quad y \quad \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,a)} |yz| = 0$$

$$\implies \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,a)} f^0(x, y, z) = 0$$

y por tanto por la **definición 2.7** concluimos que  $f$  es diferenciable en cualquier punto  $\varphi \in C$ .

c) Si  $\vartheta = (x, y, z) \notin C$  se tiene que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vartheta) = yz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2x^2 yz}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\vartheta) = xz \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2y^2 xz}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

Sea  $(0, 0, a) \in C$ , con lo obtenido anteriormente se tiene que:

$$f_{xy}(0, 0, a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{\partial f}{\partial x}(0, h, a) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, a) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah \sin\left(\frac{1}{h^2}\right)}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{h^2}\right)$$

$$f_{yx}(0, 0, a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{\partial f}{\partial y}(h, 0, a) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, a) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( ha \sin\left(\frac{1}{h^2}\right) \right) = a \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{h^2}\right)$$

De lo anterior concluimos que  $f_{xy}(0, 0, a), f_{yx}(0, 0, a)$  existen solo si  $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ , es decir, existen solo en el punto  $(0, 0, 0)$ .

d) Para que  $f$  sea  $C^2$  en una vecindad de un punto se requiere que *todas* las derivadas parciales de orden 2 existan y sean continuas allí. De c) sabemos que  $f_{xy} = f_{yx}$  sólo existen en  $(0, 0, 0)$ . Luego, como las derivadas mixtas no existen en  $(0, 0, 1)$  en cualquier vecindad de este punto  $f$  no será de clase  $C^2$ . Luego, si consideramos la vecindad de radio  $\varepsilon > 0$  centrada en  $(0, 0, 0)$ , se tiene que el punto de la vecindad  $(0, 0, \varepsilon/2)$  está en  $C$ , y como  $\varepsilon/2 > 0$  las derivadas mixtas no existen en este punto por tanto  $f$  tampoco puede ser de clase  $C^2$  en vecindades de  $(0, 0, 0)$ .

**Problema 2.** ¿Para qué valores de  $p \in \mathbb{R}$  la siguiente función es diferenciable en  $(0, 0)$ ?

$$f_p(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(x+y)}{|x|^p + |y|^p} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

**Solucion:**

Para decidir la diferenciabilidad de la función en  $(0, 0)$  usaremos la **definición 2.7**, por tanto buscamos calcular  $\nabla f_p(0, 0)$  como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_p}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_p(h, 0) - f_p(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{|h|^p h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} |h|^{2-p} \end{aligned}$$

Así notamos que  $\frac{\partial f_p}{\partial x}(0, 0)$  existe solo si  $p \leq 2$ , además:

$$\frac{\partial f_p}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_p(0, h) - f_p(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{|h|^p h} = 0$$

Por tanto  $\frac{\partial f_p}{\partial y}(0, 0)$  existe para todo  $p$  real, analizaremos los casos **p=2** y **p<2** como sigue:

Si **p=2**:

Se tiene que  $\nabla f_2(0, 0) = (1, 0)$  y por la **definición 2.7** buscamos  $f_2^0(x)$  tal que:

$$\text{i) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2^0(x) = 0 \quad \text{ii) } f_2(x, y) = f_2(0, 0) + \nabla f_2(0, 0)(x, y) + \|x, y\|_2 f_2^0(x)$$

Así, utilizando lo obtenido y reemplazando en **ii)** obtenemos:

$$f_2(x, y) = 0 + (1, 0)(x, y) + \|x, y\|_2 f_2^0(x) = x + \|x, y\|_2 f_2^0(x, y)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_2^0(x, y) &= \frac{f_2(x, y) - x}{\|x, y\|_2} = \frac{1}{\|x, y\|_2} \left( \frac{x^2(x+y)}{x^2 + y^2} - x \right) \\ &= \frac{1}{\|x, y\|_2} \left( \frac{x^3 + x^2y - x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \right) = \frac{xy(x-y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Ahora buscamos calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x-y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Conjeturamos que este límite **no** existe, para mostrarlo consideremos las sucesiones  $(x_k, y_k) = (\frac{1}{k}, 0)$  donde  $(x_k, y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$  y  $(u_k, v_k) = (\frac{1}{k}, \frac{3}{k})$  donde  $(u_k, v_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$  y notemos que:

$$f^0\left(\frac{1}{k}, 0\right) = \frac{0}{(\frac{1}{k^2})^{3/2}} = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f^0\left(\frac{1}{k}, 0\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_2^0(x) \left( \frac{1}{k}, \frac{3}{k} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{k^2} \left( \frac{-2}{k} \right)}{\left( \frac{10}{k^2} \right)^{3/2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} -\frac{6}{10^{3/2}} = -\frac{6}{10^{3/2}} \neq 0$$

Por tanto, el límite buscado **no** existe y por la **definición 2.7** concluimos que si **p=2** entonces  $f_2$  no es diferenciable en  $(0, 0)$ .

Si  $\mathbf{p} < \mathbf{2}$ :

En este caso  $\nabla f_p(0, 0) = (0, 0)$ , así procederemos análogamente al caso anterior:

Sea  $J := \{p \in \mathbb{R} \mid p < 2\}$

$$f_p^0(x, y) = \frac{f_p(x, y)}{\|x, y\|_2} = \frac{x^2(x + y)}{(|x|^p + |y|^p)(\|x, y\|_2)}, \quad \forall p \in J$$

Así nuevamente nos interesa mostrar que:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_p^0(x, y) = 0$$

Para hacer esto acotaremos  $f_p^0(x, y)$  como sigue:

$$\begin{aligned} 0 \leq |f_p^0(x, y)| &= \left| \frac{x^2(x + y)}{(|x|^p + |y|^p)(\|x, y\|_2)} \right| \leq \left| \frac{x^2(x + y)}{(|x|^p)(\|x, y\|_2)} \right| = \frac{|x|^{2-p}|(x + y)|}{\|x, y\|_2} \\ &\leq \frac{|x|^{2-p}(|x| + |y|)}{\|x, y\|_2} = \frac{|x|^{3-p} + |x|^{2-p}|y|}{\|x, y\|_2} = \frac{|x|^{3-p}}{\|x, y\|_2} + \frac{|x|^{2-p}|y|}{\|x, y\|_2}, \quad \forall p \in J \end{aligned}$$

y sabemos que se cumple que:

$$\begin{aligned} |x| \leq \|x, y\|_2 &\Rightarrow |x|^{3-p} \leq \|x, y\|_2^{3-p}, \quad \forall p \in J \\ |y| \leq \|x, y\|_2 &\Rightarrow |x|^{2-p}|y| \leq \|x, y\|_2^{3-p}, \quad \forall p \in J \end{aligned}$$

Entonces

$$0 \leq |f_p^0(x, y)| \leq \frac{|x|^{3-p}}{\|x, y\|_2} + \frac{|x|^{2-p}|y|}{\|x, y\|_2} \leq \frac{2\|x, y\|_2^{3-p}}{\|x, y\|_2} = 2\|x, y\|_2^{2-p}, \quad \forall p \in J$$

Ademas

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0 = 0 \quad y \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 2\|x, y\|_2^{2-p} = 0, \quad \forall p \in J$$

$$\implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_p^0(x, y) = 0, \quad \forall p \in J$$

Por tanto por la **definicion 2.7** y lo obtenido en el caso anterior concluimos que  $f_p(x, y)$  es diferenciable en  $(0, 0)$  solo si  $\mathbf{p} < \mathbf{2}$ .

**Problema 3.** Sea la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Estudiar la continuidad de  $f_x$  y  $f_y$  en  $(0, 0)$ .
- b) ¿La función  $f$  es diferenciable en  $(0, 0)$ ? ¿Es de clase  $C^1$ ?
- c) ¿Se tiene  $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$ ?

**Solucion:**

a) Si  $(x, y) \neq (0, 0)$  se tiene que :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

Conjeturamos que  $f_x$  y  $f_y$  **no** son continuas, en efecto: Sean  $(x_k, y_k) = \left(\frac{1}{k}, 0\right)$  donde  $(x_k, y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$  y  $(u_k, v_k) = \left(0, \frac{1}{k}\right)$  donde  $(u_k, v_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) &= \frac{2}{k} \sin(k) - \cos(k) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(u_k, v_k) &= \frac{2}{k} \sin(k) - \cos(k) \end{aligned}$$

Por tanto, dado que  $\frac{2}{k} \sin(k) - \cos(k)$  **no** converge a ningún valor cuando  $k \rightarrow \infty$ . Concluimos que tanto  $f_x$  como  $f_y$  **no** son continuas en  $(0, 0)$ .

b) Usaremos la **definición 2.7** así buscamos calcular  $\nabla f(0, 0)$  como sigue:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{|h|}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{|h|}\right)$$

Y usando que  $-h \leq h \sin\left(\frac{1}{|h|}\right) \leq h$ ,  $\forall h \in \mathbb{R}$  concluimos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{|h|}\right) = 0$$

Luego calculamos:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{|h|}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{|h|}\right) = 0$$

Por tanto, concluimos que  $\nabla f(0,0) = (0,0)$  así usando la **definición 2.7** se obtiene que:

$$f^0(x,y) = \frac{f(x,y)}{\|x,y\|_2} = \frac{(x^2+y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

Para decidir la diferenciabilidad de  $f$  calculamos lo siguiente:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f^0(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

y dado que

$$\left| \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \right| \leq 1, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{x^2+y^2} \leq \sqrt{x^2+y^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \leq \sqrt{x^2+y^2}, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

y como

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -\sqrt{x^2+y^2} = 0 \quad y \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$$

Por acotamiento inferimos que **el límite buscado es 0** y por la **definición 2.7**  $f$  es diferenciable en  $(0,0)$ . Además de la parte **a)** sabemos que  $f_x, f_y$  **no** son continuas en  $(0,0)$  y por tanto  $f$  no puede ser de clase  $C^1$ .

**c)** Usaremos lo obtenido en **a)** para calcular  $f_{xy}(0,0), f_{yx}(0,0)$  como sigue:

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0-0)}{h} = 0$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0-0)}{h} = 0$$

y por tanto  $f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0)$ .

**Problema 4.**

a) Determinar el polinomio de Taylor  $T_2(\mathbf{x})$  para la función

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x_1, x_2) = -\ln(x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$$

con  $\mathbf{x}_0 = (0,1)$  y el término residual  $R_2(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$  correspondiente.

b) Determinar el polinomio de Taylor  $T_2(\mathbf{x})$  para la función

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = x^2y + 2xz^3 + (\sin x) \cdot e^{yz}$$

con  $\mathbf{x}_0 = (0,0,0)$  y el término residual  $R_2((x, y, z), \mathbf{x}_0)$  correspondiente.

c) Acotar  $R_2((x, y, z), \mathbf{x}_0)$  sobre la bola  $B_1 := \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{w}\|_\infty \leq 1\}$ .

**Solucion:**

a) Calcularemos los términos necesarios para desarrollar el **polinomio de Taylor** y el **término residual**, como sigue:

Sea  $\alpha = (s_1, s_2) = (0, 1)$  luego se tiene que:

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha) &= 0 \\ \varphi_{x_1}(\alpha) &= -\frac{s_1}{s_1^2 + s_2^2} = 0 \\ \varphi_{x_2}(\alpha) &= -\frac{s_2}{s_1^2 + s_2^2} = -1 \\ \varphi_{x_1x_1}(\alpha) &= \frac{s_1^2 - s_2^2}{(s_1^2 + s_2^2)^2} = -1 \\ \varphi_{x_2x_2}(\alpha) &= \frac{s_2^2 - s_1^2}{(s_1^2 + s_2^2)^2} = 1 \\ \varphi_{x_1x_2}(\alpha) &= \frac{2s_1s_2}{(s_1^2 + s_2^2)^2} = 0 \end{aligned}$$

Así de lo anterior podemos concluir que el **Polinomio de Taylor** es:

$$\begin{aligned} T_2(x_1, x_2, \alpha) &= \varphi(\alpha) + x_1\varphi_{x_1}(\alpha) + (x_2 - 1)\varphi_{x_2}(\alpha) + \\ &\quad \frac{1}{2} (x_1^2\varphi_{x_1x_1}(\alpha) + 2x_1(x_2 - 1)\varphi_{x_1x_2}(\alpha) + (x_2 - 1)^2\varphi_{x_2x_2}(\alpha)) \\ &= -(x_2 - 1) - \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

Luego para el **término residual** calcularemos las terceras derivadas:

$$\begin{aligned} \varphi_{x_1x_1x_1}(x_1, x_2) &= \frac{\partial \varphi_{x_1x_1}}{\partial x_1} = -\frac{2x_1(x_1^2 - 3x_2^2)}{(x_1^2 + x_2^2)^3} \\ \varphi_{x_2x_2x_2}(x_1, x_2) &= \frac{\partial \varphi_{x_2x_2}}{\partial x_2} = -\frac{2x_2(x_2^2 - 3x_1^2)}{(x_1^2 + x_2^2)^3} \end{aligned}$$

y dado que  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$  se tiene que:

$$\varphi_{x_1 x_2 x_2} = \varphi_{x_2 x_1 x_2} = \varphi_{x_2 x_2 x_1} = \frac{2x_1(x_1^2 - 3x_2^2)}{(x_1^2 + x_2^2)^3}$$

$$\varphi_{x_2 x_1 x_1} = \varphi_{x_1 x_2 x_1} = \varphi_{x_1 x_1 x_2} = \frac{2x_2(x_2^2 - 3x_1^2)}{(x_1^2 + x_2^2)^3}$$

Y con lo anterior podemos obtener el término residual

$$R_2(x_1, x_2, 0, 1) = \frac{1}{6}(x_1^3 \varphi_{x_1 x_1 x_1}(\varrho, \varpi) + 3x_1^2(x_2 - 1) \varphi_{x_1 x_1 x_2}(\varrho, \varpi) + 3x_1(x_2 - 1)^2 \varphi_{x_1 x_2 x_2}(\varrho, \varpi) + (x_2 - 1)^3 \varphi_{x_2 x_2 x_2}(\varrho, \varpi))$$

donde  $\varrho \in [0, x_1]$  y  $\varpi \in [1, x_2]$

**b)** Procederemos de manera análoga al ítem **a)**, como sigue:

Sea  $\beta = (a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$  luego:

$$\begin{aligned} f(\beta) &= 0 \\ f_x(\beta) &= 2a_1 a_2 + 2a_3^3 + (\cos a_1) e^{a_2 a_3} = 1 \\ f_y(\beta) &= a_1^2 + a_3(\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_z(\beta) &= 6a_1 a_3^2 + a_2(\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{xx}(\beta) &= 2a_2 - (\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{yy}(\beta) &= a_3^2(\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{zz}(\beta) &= 12a_1 a_3 + a_2^2(\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{xy}(\beta) &= 2a_1 + a_3(\cos a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{xz}(\beta) &= 6a_3^3 + a_2 \cos(a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \\ f_{yz}(\beta) &= (1 + a_2 a_3)(\sin a_1) e^{a_2 a_3} = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el **polinomio de Taylor** de grado 2 será:

$$\begin{aligned} T_2(x, y, z, \beta) &= f(\beta) + x f_x(\beta) + y f_y(\beta) + z f_z(\beta) + \\ &\quad \frac{1}{2}(x^2 f_{xx}(\beta) + y^2 f_{yy}(\beta) + z^2 f_{zz}(\beta) + \\ &\quad 2xy f_{xy}(\beta) + 2xz f_{xz}(\beta) + 2yz f_{yz}(\beta)) \\ &= x. \end{aligned}$$

Luego, calcularemos las terceras derivadas necesarias para obtener el **término residual**, como



sigue:

$$\begin{aligned}
 f_{xxx}(x, y, z) &= -(\cos(x))e^{yz} \\
 f_{yyy}(x, y, z) &= z^3(\sin(x))e^{yz} \\
 f_{zzz}(x, y, z) &= 12x + y^3(\sin(x))e^{yz} \\
 f_{xxy}(x, y, z) &= 2 - z(\sin(x))e^{yz} \\
 f_{xxz}(x, y, z) &= -y(\sin(x))e^{yz} \\
 f_{xyy}(x, y, z) &= z^2(\cos(x))e^{yz} \\
 f_{xzz}(x, y, z) &= 12z + y^2 \cos(x)e^{yz} \\
 f_{xyz}(x, y, z) &= (yz + 1)(\cos(x))e^{yz} \\
 f_{yyz}(x, y, z) &= z(2 + yz)(\sin(x))e^{yz} \\
 f_{yzz}(x, y, z) &= (2y + y^2 z)(\sin(x))e^{yz}
 \end{aligned}$$

Por tanto, usando lo obtenido, calculamos el término residual:

$$\begin{aligned}
 R_2(x, y, z, \beta) &= \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + y^3 f_{yyy} + z^3 f_{zzz} + 3x^2 y f_{xxy} + 3x^2 z f_{xxz} + 3xy^2 f_{xyy} + 3xz^2 f_{xzz} + \\
 &\quad + 3y^2 z f_{yyz} + 3yz^2 f_{yzz} + 6xyz f_{xyz})
 \end{aligned}$$

donde cada tercera derivada es evaluada en un punto  $(\vartheta, \varrho, \sigma) \in \mathbb{R}^3$

c) Sea  $\varphi := (x_0, y_0, z_0) \in B_1$  luego usando lo obtenido en **b)** y que para todo  $\varphi$  en  $B_1$ :

$$\|(x_0, y_0, z_0)\|_\infty = \sup(|x_0|, |y_0|, |z_0|) = \max(|x_0|, |y_0|, |z_0|) \leq 1, \forall \varphi \in B_1$$

$$\implies |x_0| \leq 1, |y_0| \leq 1, |z_0| \leq 1, \forall \varphi \in B_1$$

Luego usando lo obtenido podemos acotar las derivadas involucradas en  $R_2(x, y, z, \beta)$ , como sigue:

$$(1) |f_{xxz}(\varphi)| = |-y_0(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq |y_0 e^{y_0 z_0}| \leq |e^{y_0 z_0}| \leq e$$

$$(2) |f_{xxy}(\varphi)| = |2 - z_0(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq |2| + |-z_0(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq 2 + |e^{y_0 z_0}| \leq 2 + e$$

$$(3) |f_{zzz}(\varphi)| = |12x_0 + y_0^3(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq 12 + |y_0^3(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq 12 + |e^{y_0 z_0}| \leq 12 + e$$

$$(4) |f_{xzz}(\varphi)| = |12z_0 + y_0^2 \cos(x_0)e^{y_0 z_0}| \leq 12 + |y_0^2 \cos(x_0)e^{y_0 z_0}| \leq 12 + |e^{y_0 z_0}| \leq 12 + e$$

$$(5) |f_{yzz}(\varphi)| = |(2y_0 + y_0^2 z_0)(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq |2y_0 + y_0^2 z_0| |e^{y_0 z_0}| \leq (|2y_0| + |y_0^2 z_0|)e \leq (2 + 1)e = 3e$$

$$(6) |f_{yyz}(\varphi)| = |z_0(2 + y_0 z_0)(\sin(x_0))e^{y_0 z_0}| \leq |z_0| |(2 + y_0 z_0)| |e^{y_0 z_0}| \leq (|2y_0| + |y_0 z_0|)e \leq (2 + 1)e = 3e$$

$$(7) |f_{xyz}(\varphi)| = |(yz + 1)(\cos(x))e^{yz}| \leq |yz + 1|e \leq (|yz| + 1)e \leq 2e$$

Notar que el procedimiento para acotar a  $f_{xyy}, f_{xx}, f_{yyy}$  es analogo a (1). Usaremos lo obtenido para acotar  $R_2(x, y, z, 0, 0, 0)$  en la bola  $B_1$  como sigue:

$$\begin{aligned}
 |R_2(x, y, z, 0, 0, 0)| &= \frac{1}{6} \left| x^3 f_{xxx} + y^3 f_{yyy} + z^3 f_{zzz} + 3x^2 y f_{xxy} + 3x^2 z f_{xxz} + 3xy^2 f_{xyy} + 3xz^2 f_{xzz} + \right. \\
 &\quad \left. + 3y^2 z f_{yyz} + 3yz^2 f_{yzz} + 6xyz f_{xyz} \right| \\
 &\leq \frac{1}{6} \left( |x^3 f_{xxx}| + |y^3 f_{yyy}| + |z^3 f_{zzz}| + |3x^2 y f_{xxy}| + |3x^2 z f_{xxz}| + |3xy^2 f_{xyy}| + |3xz^2 f_{xzz}| + \right. \\
 &\quad \left. + |3y^2 z f_{yyz}| + |3yz^2 f_{yzz}| + |6xyz f_{xyz}| \right), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3
 \end{aligned}$$

Donde cada tercera derivada esta evaluada en un punto  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Sea  $(x', y', z') \in B_1$  usando las cotas encontradas y lo obtenido anteriormente concluimos que :

$$\begin{aligned}
 |R_2(x, y, z, 0, 0, 0)| &\leq \frac{1}{6} (e + e + 12 + e + 3(2 + e) + 3e \\
 &\quad + 3e + 3(12 + e) + 9e + 9e + 12e), \forall (x', y', z') \in B_1 \\
 &\leq \frac{1}{6} (54 + 45e) = 9 + \frac{45}{6} e, \forall (x', y', z') \in B_1
 \end{aligned}$$

**Problema 5.** Determinar constantes  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tales que la función

$$w : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad w(x, t) = t^\alpha \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right)$$

es una solución de la EDP

$$w_t - (w_{x_1 x_1} + w_{x_2 x_2} + \dots + w_{x_n x_n}) = 0 \text{ (ecuación del calor } n\text{-dimensional).}$$

**Solucion:** Para determinar las constantes, primero calcularemos lo siguiente:

i)

$$\frac{\partial w}{\partial t} = (\alpha t^{\alpha-1} - \beta t^{\alpha-2} \|x\|_2^2) \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right)$$

ii) Calcularemos  $\frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2}$  como sigue:

Sea  $I := \{1, \dots, n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Notemos que:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \|x\|_2^2 = 2x_i, \quad \forall i \in I$$

Luego usaremos lo anterior para calcular lo buscado:

$$\frac{\partial w}{\partial x_i} = t^\alpha \frac{2\beta x_i}{t} \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right), \quad \forall i \in I$$

$$= t^{\alpha-1} 2\beta x_i \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right), \quad \forall i \in I$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} = 2\beta t^{\alpha-1} \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right) \left(1 + \frac{2\beta x_i^2}{t}\right), \quad \forall i \in I$$

$$= (2\beta t^{\alpha-1} + 4\beta^2 t^{\alpha-2} x_i^2) \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right), \quad \forall i \in I$$

iii) Así tenemos que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} &= \sum_{i=1}^n (2\beta t^{\alpha-1} + 4\beta^2 t^{\alpha-2} x_i^2) \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^n 2\beta t^{\alpha-1} \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right) + \sum_{i=1}^n 4\beta^2 t^{\alpha-2} x_i^2 \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right) \end{aligned}$$

Sea  $\varphi := 4\beta^2 t^{\alpha-2} \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right)$  además  $\varphi$  **no** depende de  $\mathbf{i}$  y análogamente la expresión  $2\beta t^{\alpha-1} \exp\left(\frac{\beta}{t} \|x\|_2^2\right)$  tampoco depende de  $\mathbf{i}$  por tanto :

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} &= n \left( 2\beta t^{\alpha-1} \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) \right) + \sum_{i=1}^n x_i^2 \varphi \\
&= 2\beta n t^{\alpha-1} \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) + \varphi \|x\|_2^2 \\
&= 2\beta n t^{\alpha-1} \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) + 4\beta^2 t^{\alpha-2} \|x\|_2^2 \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) \\
&= \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (2\beta n t^{\alpha-1} + 4\beta^2 \|x\|_2^2 t^{\alpha-2})
\end{aligned}$$

Por tanto, usando lo obtenido en **i),ii)** y **iii)** calculamos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial t} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} &= \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (\alpha t^{\alpha-1} - \beta t^{\alpha-2} \|x\|_2^2) - \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (2n\beta t^{\alpha-1} + 4\beta^2 \|x\|_2^2 t^{\alpha-2}) \\
&= \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (\alpha t^{\alpha-1} - \beta t^{\alpha-2} \|x\|_2^2 - 2n\beta t^{\alpha-1} - 4\beta^2 \|x\|_2^2 t^{\alpha-2}) \\
&= \exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (t^{\alpha-1}(\alpha - 2n\beta) - t^{\alpha-2}\beta \|x\|_2^2(1 + 4\beta))
\end{aligned}$$

Ahora busquemos  $\alpha, \beta$  tales que se cumpla:

$$\frac{\partial w}{\partial t} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} = 0$$

Lo anterior se puede escribir como:

$$\exp \left( \frac{\beta}{t} \|x\|_2^2 \right) (t^{\alpha-1}(\alpha - 2n\beta) - t^{\alpha-2}\beta \|x\|_2^2(1 + 4\beta)) = 0, \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_0^+$$

Dado que la función exponencial es no negativa para todo  $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_0^+$  lo anterior ocurre solo si:

$$t^{\alpha-1}(\alpha - 2n\beta) = t^{\alpha-2}\beta \|x\|_2^2(1 + 4\beta), \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_0^+$$

Y como lo anterior se debe cumplir para cualesquiera  $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_0^+$  se debe tener que:

$$\alpha - 2n\beta = 0 \wedge (\beta = 0 \vee 1 + 4\beta = 0)$$

$$\iff (\alpha = 2n\beta \wedge \beta = 0) \vee \left( \alpha = 2n\beta \wedge \beta = -\frac{1}{4} \right)$$

Así se tiene que las constantes  $\alpha, \beta$  para que la función  $w(x, t)$  dada sea solución de la **EDP** son:

$$(\alpha, \beta) = (0, 0) \text{ y } (\alpha, \beta) = \left( -\frac{n}{2}, -\frac{1}{4} \right), \quad n \in \mathbb{N}$$

**Problema 6.** Se considera la ecuación

$$2x^2 + y + \sin(xy) = 0.$$

¿Es posible resolver esta ecuación en una vecindad de  $(0,0)$  en la forma  $y = g_1(x)$  o  $x = g_2(y)$ ?

Si es posible, calcular las derivadas  $g'_1(0)$  y  $g'_2(0)$ .

**Solucion:**

Sea  $\vartheta(x, y) := x^2 + y + \sin(xy)$ . Notamos que  $\vartheta(0, 0) = 0$  y además, dado que  $\vartheta(x, y)$  es composición de funciones que pertenecen a  $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ , se tiene que  $\vartheta \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ .

i) Para saber si podemos resolver esta ecuación en una vecindad de  $(0,0)$  de la forma  $y = g_1(x)$  calculamos lo siguiente :

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial y}(x, y) = 1 + x \cos(xy) \implies \frac{\partial \vartheta}{\partial y}(0, 0) = 1$$

Así como  $\vartheta(0, 0) = 0$ ,  $\vartheta \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$  y  $\frac{\partial \vartheta}{\partial y}(0, 0) = 1 \neq 0$ . Es posible utilizar el **Teorema 3.2** por el cual concluimos que la ecuación puede ser resuelta de manera única como  $y = g_1(x)$  en una vecindad de  $(0,0)$  esto es:

$$\exists \varsigma \in \mathbb{R}^+ : \vartheta(x, g_1(x)) = 0, \quad \forall x \in (-\varsigma, \varsigma)$$

Luego para obtener  $g'_1(0)$  derivamos implícitamente lo anterior obteniendo que:

$$2x + g'_1(x) + \cos(xg_1(x))(g_1(x) + xg'_1(x)) = 0$$

Luego evaluando en  $x = 0$

$$\begin{aligned} 2(0) + g'_1(0) + \cos((0)g_1(0))(g_1(0) + (0)g'_1(0)) &= 0 \\ g'_1(0) + g_1(0) &= 0 \\ \implies g'_1(0) &= g_1(0) \end{aligned}$$

Ahora buscamos calcular  $g_1(0)$  como sigue:

$$\begin{aligned} \vartheta(0, g_1(0)) &= 0^2 + g_1(0) + \sin((0)g_1(0)) = 0 \\ \implies g_1(0) &= 0 \end{aligned}$$

y por tanto con lo obtenido anteriormente concluimos que

$$g'_1(0) = 0$$

ii) Ahora para saber si podemos resolver la ecuación en una vecindad de  $(0,0)$  de la forma  $x = g_2(y)$  calcularemos lo siguiente:

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial x}(x, y) = 2x + y \cos(xy) \implies \frac{\partial \vartheta}{\partial x}(0, 0) = 0$$

Y por tanto no podemos usar el **Teorema 3.2**. Buscaremos mostrar que no se puede resolver la ecuación deseada en una vecindad de  $(0,0)$  de la forma  $x = g_2(y)$ .

*Demostración.* Supongamos que existe una función tal que es posible resolver la ecuación en una vecindad de  $(0,0)$  de la forma  $g_2(y) = x$ .

Por hipótesis  $\exists \alpha \in \mathbb{R}^+ : \vartheta(g_2(y), y) = 0, \forall y \in (-\alpha, \alpha)$ , en particular para  $y = 0$  se tiene que:

$$\vartheta(g_2(0), 0) = 0 \iff 2g_2(0)^2 = 0 \iff g_2(0) = 0$$

Luego por hipótesis sabemos que podemos derivar implícitamente, como sigue:

$$\begin{aligned} 4g_2(y)g_2(y)' + 1 + \cos(g_2(y)y)(g_2(y)'y + g_2(y)) &= 0 \\ \implies 4g_2(0)g_2(0)' + 1 + \cos(g_2(0)(0))(g_2(0)'(0) + g_2(0)) &= 0 \\ \iff 0 + 1 + 0 = 0 &\iff 1 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, hemos llegado a una **contradicción**, la cual viene de suponer que tal función existe. Concluimos que tal función  $g_2(y) = x$  **no** puede existir.

□

**Problema 7.** Se considera el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}x^2 + uy + e^v &= 0, \\2x + u^2 - uv &= 5.\end{aligned}$$

Demostrar que en una vecindad de  $(2, 5)$  el sistema (1) es resoluble mediante una función continuamente diferenciable  $(x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$  tal que  $u(2, 5) = -1$  y  $v(2, 5) = 0$ . Determinar las primeras derivadas de  $u$  y  $v$  en el punto  $(2, 5)$ .

**Demostración.**

Sea  $P_0 = (2, 5, -1, 0)$  y sean  $\xi(x, y, u, v) := x^2 + uy + e^v$  y  $\varphi(x, y, u, v) := 2x + u^2 - uv - 5$ , además  $\xi, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^4)$ . Por otro lado, notemos que:

$$\xi(P_0) = 2^2 + (-1)(5) + 1 = 0, \quad \varphi(P_0) = 2(2) + (-1)^2 - (-1)(0) - 5 = 0$$

Luego calcularemos  $\frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(u, v)}(P_0)$  como sigue:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial u} & \frac{\partial \xi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \end{bmatrix}_{P_0} = \begin{bmatrix} y & e^v \\ 2u - v & -u \end{bmatrix}_{P_0} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Y por tanto  $\det \left( \frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(u, v)}(P_0) \right) = 5(1) - (-2)(1) = 7 \neq 0$  y como  $\xi, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^4)$  por el **Teorema 3.2** concluimos que el sistema  $\xi(P_0) = 0, \varphi(P_0) = 0$  puede ser resuelto en una vecindad de  $P_0$  de forma única.

□

Luego para determinar las primeras derivadas de  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  en el punto pedido calculamos lo siguiente: Como  $\det \left( \frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(u, v)}(P_0) \right) \neq 0$  es invertible y su inversa es :

$$\left( \frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(u, v)}(P_0) \right)^{-1} = \frac{1}{7} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculamos  $\frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(x, y)}(P_0)$  como sigue:

$$\frac{\partial(\xi, \varphi)}{\partial(x, y)}(P_0) = \begin{bmatrix} 2x & u \\ 2 & 0 \end{bmatrix}_{P_0} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Por el **Teorema 3.2** las derivadas de  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  en el punto  $(2, 5)$ , están dadas por :

$$\begin{aligned}\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(2, 5) &= -\frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 18 & -2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

y por igualdad de matrices se tiene que:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(2, 5) = -\frac{2}{7}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(2, 5) = \frac{1}{7}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(2, 5) = -\frac{18}{7}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(2, 5) = \frac{2}{7}$$