

DESIGUALDAD DE HARDY MEDIANTE CONVOLUCIÓN RESPECTO A UNA MEDIDA ESPECIAL

LEONARDO FIGUEROA C.

A. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 1 (2015-I) Y UNOS NUEVOS

Reproduzco definiciones y resultados que aparecieron en la evaluación 1 del primer semestre de 2015 (Definición A.1 y partes 1, 2 y 3 de la Proposición A.2 más abajo) junto a otros nuevos (partes 4 y 5 de la misma proposición) cuya demostración se explica muy sucintamente.

Definición A.1 (Espacios L^p y convolución respecto a otra medida). Sea R_+ el conjunto de los números reales estrictamente positivos y sea $w: R_+ \rightarrow R$ definida por $w(t) := 1/t$. Dado $p \in [1, \infty)$ definimos al espacio

$$L_w^p(R_+) := \left\{ f: R_+ \rightarrow R \text{ medible} \mid \int_{R_+} |f|^p w < \infty \right\}$$

identificando entre sí a miembros que sean iguales casi en todas partes. Equipamos a este espacio con la norma

$$L_w^p(R_+) \ni f \mapsto \|f\|_{L_w^p(R_+)} := \left(\int_{R_+} |f|^p w \right)^{1/p}.$$

También definimos $L_w^\infty(R_+) := L^\infty(R_+)$ con su misma norma.

Dadas funciones f y g en $C_c(R_+)$ definimos la función $f \odot g: R_+ \rightarrow R$ por

$$(A.1) \quad (f \odot g)(x) = \int_{R_+} f(x/y) g(y) w(y) dy$$

para todo $x \in R_+$.

Proposición A.2 (Propiedades de convolución con respecto a otra medida).

1. Demuestre la siguiente versión de la desigualdad de Hölder: Si $p, q \in [1, \infty]$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, entonces

$$(A.2) \quad (\forall (f, g) \in L_w^p(R_+) \times L_w^q(R_+)) \quad \left| \int_{R_+} fgw \right| \leq \|f\|_{L_w^p(R_+)} \|g\|_{L_w^q(R_+)}.$$

2. Demuestre que la operación \odot es simétrica en $C_c(R_+) \times C_c(R_+)$.
3. Sean $p, q, r \in [1, \infty]$ tales que $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$. Demuestre que para todo $f, g \in C_c(R_+)$,

$$\|f \odot g\|_{L_w^r(R_+)} \leq \|f\|_{L_w^p(R_+)} \|g\|_{L_w^q(R_+)}.$$

4. Dado $p \in [1, \infty)$ use la densidad de $C_c(R_+)$ en $L^p(R_+)$ para demostrar la densidad de $C_c(R_+)$ en $L_w^p(R_+)$.
5. Para $p, q, r \in [1, \infty]$ tales que $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$. Entonces la operación \odot puede extenderse por densidad a una operación bilineal y continua de $L^p(R_+) \times L^q(R_+)$ a $L^r(R_+)$ que puede expresarse mediante la misma fórmula integral.

Demostración. Las partes 1, 2 y 3 aparecieron en la evaluación 1 del semestre 2015-I. La parte 4 usa que en compactos de R_+ el peso w está acotado a ambos lados por cantidades positivas y la parte 5 se prueba de forma análoga a la manera en que se prueba el resultado correspondiente para la convolución convencional. \square

B. DESIGUALDAD DE HARDY

A continuación reproduzco el lema 13.4 de [Tar07] con una demostración alternativa que se esboza en ese mismo texto. Cabe mencionar que hallé necesario modificar la función h que se indica ahí.

Lema B.1 (Desigualdad de Hardy). *Sea $p > 1$ y dado $f \in L^p(R_+)$ se define $g: R_+ \rightarrow R$ por $g(t) := \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$ para todo $t > 0$. Entonces,*

$$g \in L^p(R_+) \quad y \quad \|g\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

Demostración. Definimos a la función $h: R_+ \rightarrow R$ por

$$(\forall t \in R_+) \quad h(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 1, \\ t^{1/p-1} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Usando la notación de la Definición A.1 y la Proposición A.2,

$$\|h\|_{L_w^1(R_+)} = \int_{R_+} h(t) w(t) dt = \int_1^\infty t^{1/p-1} \frac{1}{t} dt = \frac{p}{p-1} < \infty$$

y

$$\begin{aligned} \left(h \odot (s \mapsto s^{1/p} f(s)) \right) (t) &= \int_{R_+} h(t/s) s^{1/p} f(s) \frac{1}{s} ds \\ &= \int_0^t (t/s)^{1/p-1} s^{1/p-1} f(s) ds = t^{1/p} \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds = t^{1/p} g(t). \end{aligned}$$

Por lo tanto, usando la desigualdad de Young para la operación \odot (parte 5 de la Proposición A.2),

$$\begin{aligned} \|g\|_p &= \left\| t \mapsto t^{1/p} g(t) \right\|_{L_w^p(R_+)} = \left\| h \odot (s \mapsto s^{1/p} f(s)) \right\|_{L_w^p(R_+)} \\ &\leq \|h\|_{L_w^1(R_+)} \left\| s \mapsto s^{1/p} f(s) \right\|_{L_w^p(R_+)} = \frac{p}{p-1} \|f\|_p. \end{aligned}$$

\square

REFERENCIAS

- [Tar07] Luc Tartar, *An introduction to Sobolev spaces and interpolation spaces*, Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana, vol. 3, Springer, Berlin, 2007. MR 2328004 (2008g:46055)