

Problema 3

Sea $N_t^{(i)}$: núm. de partículas emitidas por la i -ésima fuente, es un proceso de Poisson con tasa λ_i .

Entonces, $N_t^{(i)} = N_t^{(i,r)} + N_t^{(i,nr)}$ donde

$\{N_t^{(i,r)}, t \geq 0\}$ y $\{N_t^{(i,nr)}, t \geq 0\}$ son procesos

de Poisson independientes, con tasas $\lambda_i p_i$ y $\lambda_i (1-p_i)$ respectivamente.

$N_t^{(i,r)}$ es el número de partículas emitidas por la i -ésima fuente registradas y

$N_t^{(i,nr)}$ —, — no registradas.

Por lo tanto, el núm. total $\{N_t, t \geq 0\}$ de las partículas ~~registradas~~ emitidas por las cinco fuentes está presentado como:

$$N_t = \sum_{i=1}^5 N_t^{(i)} = \underbrace{\sum_{i=1}^5 N_t^{(i,r)}}_{= N_t^{(r)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^5 N_t^{(i,nr)}}_{= N_t^{(nr)}}$$

donde $\{N_t^{(r)}, t \geq 0\}$ es el total de las partículas registradas y $\{N_t^{(nr)}, t \geq 0\}$ —, — de las no registradas. Ambas son procesos de Poisson independientes y con tasas

$$\lambda_r = \sum_{i=1}^5 \lambda_i p_i \quad \text{y} \quad \lambda_{nr} = \sum_{i=1}^5 \lambda_i (1-p_i),$$

respectivamente.

$$\begin{aligned} 1) \quad P(N_{60}^{(r)} \geq 1) &= 1 - P(N_{60}^{(r)} = 0) = \\ &= 1 - e^{-\lambda_r \cdot 60} = 1 - e^{-18 \cdot 60} \quad \text{pues,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_r &= 4 \times 0,9 + 4 \times 0,8 + 6 \times 0,7 + 5 \times 0,8 + 4 \times 0,75 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$2) \quad E[N_{180}^{(r)}] = 180 \cdot \lambda_r = 180 \times 18 = 3240 \quad \blacksquare$$

con $E[N_{180}^{(r)}] = 180 \cdot \lambda_r$

Diagrama 5