

Construcción de Algoritmos para trabajar con polinomios

Alberto Marileo Benjamín Jiménez
Benjamín Junemann

Departamento de Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción

Junio 2025

Índice

- ## 6 Conclusión

Motivación

- Los **Polinomios** son un elemento muy importante en diversas areas de la **Matematica, Fisica, Biologia o Ingenieria**.
- Sin embargo algunas veces trabajar con ellos nos lleva a calculos complejos o tediosos.

Definiciones previas para (\mathbb{Z})

- 1 Sean a, b enteros diremos que a **divide a** b si existe un entero k tal que $ak = b$.
- 2 Sean a, b enteros diremos que $a|b$ si y solo si a **divide a** b .
- 3 Diremos que el **Maximo comun divisor** de a y b es d ($\text{mcd}(a, b) = d$) si se cumple que:
 - $d|a$ y $d|b$
 - Si \hat{d} es otro entero tal que $\hat{d}|a$ y $\hat{d}|b$ entonces $\hat{d}|d$.

Algoritmo de Euclides (\mathbb{Z})

Algoritmo de Euclides

Dados $a, b \in \mathbb{Z}^+$, con $a > b$ y **b no es factor de a**.

Sean

$$(q_1, r_1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0^+ : a = bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b$$

$$(q_2, r_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0^+ : b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$\vdots$$

$$(q_m, r_m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0^+ : r_{m-2} = r_{m-1}q_m + r_m, \quad 0 < r_m < r_{m-1}$$

$$(q_{m+1}, r_{m+1}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_0^+ : r_{m-1} = r_mq_{m+1}, \quad r_{m+1} = 0$$

Entonces $r_m = \text{mcd}(a, b)$

Notemos además que $r_m = \text{mcd}(a, b)$ se obtiene luego de una cantidad finita de pasos, ya que

$$r_m < r_{m-1} < \cdots < r_1 \text{ y } r_m = \text{mcd}(a, b) \geq 1.$$

Identidad de Bézout (\mathbb{Z})

Identidad de Bezout

Sean $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, y sea $d := \text{mcd}(a, b)$. Entonces

$$\exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2 : ax + by = d$$

Extension a $\mathbb{R}[x]$

- Buscaremos extender los resultados y herramientas anteriores a $\mathbb{R}[x]$, es decir, al espacio de los **Polinomios**.
- Para ello, necesitaremos las siguientes definiciones

Definiciones previas para $(\mathbb{R}[x])$

División Euclidiana Polinomios

$$\forall (A, B) \in \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X]^* : \exists ! Q, R \in \mathbb{R}[X] :$$

$$A = BQ + R \quad , grad(R) < grad(B)$$

Definiciones previas para $(\mathbb{R}[x])$

Máximo Común Divisor Polinomios

Sean $P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]^*$ El *máximo común divisor* de P y Q es el polinomio $D(x) \in \mathbb{R}[x]$ que cumple:

- 1 $D(x) \mid P(x)$ y $D(x) \mid Q(x)$;
- 2 Si $E(x) \in \mathbb{R}[x]$ divide simultáneamente a P y Q , entonces $E(x) \mid D(x)$;
- 3 $D(x)$ es **mónico**, es decir, su coeficiente líder es 1.

En tal caso, escribimos

$$D(x) = \text{mcd}(P(x), Q(x)).$$

- Usando todas las definiciones anteriores buscamos generalizar el **Algoritmo de Euclides** y **Lema de Bezout**.


Ejemplos

Encuentre el **MCD** de los siguientes **polinomios**:

1 $P_1(x) = (x - 2)(x^2 - 1), \quad P_2(x) = (x - 2)(x + 2).$

2 $P_1(x) = x^6 - 22x^5 + 190x^4 - 820x^3 + 1849x^2 - 2038x + 840$
 $P_2(x) = x^5 - 45x^4 + 805x^3 - 7155x^2 + 31594x - 55440$

Para el segundo ejemplo usaremos el **Algoritmo de Euclides** implementado en **Matlab**.



Identidad de Bézout ($\mathbb{R}[x]$)

Identidad de Bezout en $\mathbb{R}[x]$

Sean $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]^*$. Entonces $\exists (A, B) \in (\mathbb{R}[X])^2$:

$$A(x)P_1 + B(x)P_2 = \text{mcd}(P_1, P_2)$$

Demostración.

Supongamos que hemos aplicado el **Algoritmo de Euclides** a P_1 y P_2 y se tiene que $R_{m+1} = \text{mcd}(P_1, P_2)$ es decir el algoritmo ha terminado en $m + 1$ pasos. (Notar que $m + 1$ es finito ya que $\text{grad}(R_{i+1}) < \text{grad}(R_i)$, $\forall i \in \{1, \dots, m\}$)

Buscaremos mostrar que:

$$R_j = A_j(x)P_1 + B_j(x)P_2 \quad , \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Del **Algoritmo de Euclides** sabemos que:

$$R_j = R_{j-2} - R_{j-1}Q_j \quad , \forall j \in \{1, \dots, m+1\}$$

Si $R_i = 0$, detener y fijar $m := i - 1$. Por tanto, el último resto no nulo R_m es:

$$D := R_m = \text{mcd}(P_1, P_2), \quad A := A_m, \quad B := B_m,$$

y se cumple que:

$$A P_1 + B P_2 = \text{mcd}(P_1, P_2) = D.$$

Por tanto, hemos obtenido los **Coeficientes de Bezout A y B**.

Ejemplos

Calcular el **MCD** y los **Coeficientes de Bezout** de los siguientes polinomios:

1 $P_1(x) = x^3 - 1, \quad P_2(x) = x^2 + 1.$

2 $P_1(x) = -5x^4 + 6x^3 - 7x^2 + 3x + 2$ y
 $P_2(x) = 3x^4 + 4x^3 - 5x^2 + 6x - 7$

Para el segundo ejemplo usaremos el **Algoritmo de Bezout** implementado en **Matlab**.

El Teorema de las Raíces Racionales

Teorema de las Raíces Racionales

Sea $p(x) := a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomio tal que $a_i \in \mathbb{Z} \forall i \in \{0, \dots, n\}$ y $a_0, a_n \neq 0$. Si $x = \frac{p}{q}$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$ es raíz de p , entonces $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$.

- El Teorema anterior induce un algoritmo para encontrar **raíces racionales**

Ejemplos

Calcule, si es que existen las **raíces racionales** de los siguientes **polinomios**.

1 $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$

2 $\vartheta(x) = 24x^6 - 7x^5 + 7x^4 + 2x^3 - 6x^2 + x + 8$

3 $\varsigma(x) = x^5 - 11x^4 + 2x^3 + 226x^2 - 803x + 585$

Para el segundo y tercer ejemplo usaremos el **Algoritmo** obtenido del teorema anterior implementado en **Matlab**.

Funciones Racionales

Las funciones racionales de la forma $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, son comunes en diversos problemas matemáticos.

En busca de simplificar estos problemas, hacemos lo siguiente:

Descomposición de funciones racionales

Supongamos que $Q(x)$ no es irreducible en $\mathbb{R}[X]$. Entonces, puede factorizarse como:

$$Q(x) = Q_1(x) \cdot Q_2(x), \quad \text{donde } Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X] \quad y \quad \text{mcd}(Q_1, Q_2) = 1,$$

Además, $\text{grad}(Q_1), \text{grad}(Q_2) < \text{grad}(Q)$.

Por la **Identidad de Bézout**, existen polinomios $A_0(x), A_1(x) \in \mathbb{R}[X]$ tales que:

$$A_0(x)Q_1(x) + A_1(x)Q_2(x) = 1.$$

Descomposición de funciones racionales

Sustituyendo en $f(x)$, se obtiene:

$$f(x) = \frac{P(x) \cdot (A_0(x)Q_1(x) + A_1(x)Q_2(x))}{Q_1(x)Q_2(x)} = \frac{P(x)A_0(x)}{Q_2(x)} + \frac{P(x)A_1(x)}{Q_1(x)}.$$

Ejemplos

Calcular la Serie de Taylor alrededor de $x = 0$ de la función racional:

$$f(x) = \frac{2x^4 - x^3 + 3x^2 + x + 5}{(1 - x^2)(1 - 2x)}$$

Para ello, usaremos lo anterior y el **Algoritmo de Bezout** implementado en Matlab.

Conclusión

- Extendimos resultados clasicos de \mathbb{Z} a $\mathbb{R}[x]$.
- En base a lo obtenido, generamos **Algoritmos** que nos ayudaran al trabajo con **Polinomios**

Referencias



Wikipedia contributors. *Euclidean division*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_division



Wikipedia contributors. *Euclidean Algorithm*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm



Wikipedia contributors. *Rational Root Theorem*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_root_theorem



Wikipedia contributors. *RSA cryptosistem*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_cryptosystem



Rommel Bustinza. *Curso TRM-1 2024, Universidad de Concepcion*.

<https://shorturl.at/NRhRs>