

Módulos 5 y 6, Ejemplos

Raimund Bürger

13 de agosto de 2020

Regla de substitución para integrales

Ejemplo 1 Calcular la siguiente integral, donde D es el disco circular $x^2 + y^2 \leq 4$, y $n > 0$:

$$I = \iint_D (x^2 + y^2)^n d(x, y).$$

Solución sugerida. Utilizando coordenadas polares $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, tomando en cuenta que

$$\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$


y definiendo $D^* = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, obtenemos

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D^*} (r^{2n}) r d(r, \theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^{2n+1} dr d\theta = \frac{1}{2n+2} \int_0^{2\pi} [r^{2n+2}]_{r=0}^{r=2} d\theta \\ &= \frac{2^{2(n+1)}}{2(n+1)} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2^{2(n+1)}}{n+1} \pi. \end{aligned}$$

Regla de substitución para integrales

Ejemplo 2 Calcular la siguiente integral, donde D es la región cuyos vértices son $A(0,0)$, $B(2,0)$ y $C(2,2)$:

$$I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{(x-y)^2 + 2(x+y) + 1}} d(x,y).$$



Solución sugerida. Como la función

$$f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{(x-y)^2 + 2(x+y) + 1}}$$

no tiene primitiva, conviene hacer la transformación


$$u = x - y, \quad v = x + y \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}(v + u), \quad y = \frac{1}{2}(v - u).$$

Regla de substitución para integrales

Ejemplo 2 (continuación) Considerando las coordenadas

$$A(u = 0, v = 0), \quad B(u = 2, v = 2), \quad C(u = 0, v = 4),$$

obtenemos como dominio de integración con respecto a u y v el siguiente triángulo E :



Considerando que

$$\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2},$$

obtenemos lo siguiente:

Regla de sustitución para integrales

Ejemplo 2 (continuación)

$$\begin{aligned} I &= \iint_E f(x(u, v), y(u, v)) \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \\ &= \int_0^2 \int_u^{4-u} \frac{1}{\sqrt{u^2 + 2v + 1}} \cdot \frac{1}{2} dv du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\int_u^{4-u} (u^2 + 2v + 1)^{-1/2} dv \right) du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left[\frac{1}{2} \cdot 2(u^2 + 2v + 1)^{1/2} \right]_{v=u}^{v=4-u} du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\sqrt{u^2 - 2u + 9} - (u + 1) \right) du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\sqrt{(u - 1)^2 + 8} - (u + 1) \right) du = \frac{3}{2} + 2 \ln 2. \end{aligned}$$

donde utilizamos una tabla de integrales:

Regla de sustitución para integrales

Ejemplo 2 (continuación)

$$\begin{aligned}& \int_0^2 \sqrt{(u-1)^2 + 8} \, du \\&= \int_{w=-1}^1 \sqrt{w^2 + 8} \, dw \\&= \left[\frac{1}{2} \left(w \sqrt{w^2 + 8} + 8 \ln \left(w + \sqrt{w^2 + 8} \right) \right) \right]_{w=-1}^1 \\&= \frac{1}{2} (1 \cdot 3 + 8 \ln 4) - \frac{1}{2} (-3 + 8 \ln 2) = \frac{3}{2} + 8 \ln 2 - \frac{3}{2} - 4 \ln 2 = 4 \ln 2.\end{aligned}$$


Entrada de tabla: si $X = x^2 + a^2$, entonces

$$\int \sqrt{X} \, dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{X} + a^2 \ln \left(x + \sqrt{X} \right) \right) + C.$$

Regla de substitución para integrales

Ejemplo 3 Calcular I , donde U es el sólido interior a la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y limitado por los planos $x + y = 0$ y $z = a$, $a > 0$:

$$I = \iiint_U \exp(\sqrt{x^2 + y^2}) \, d(x, y, z)$$



Solución sugerida. Aquí conviene utilizar coordenadas cilíndricas $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, donde tomamos en cuenta que

$$\det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Regla de sustitución para integrales

Ejemplo 3 (continuación) La ecuación $z^2 = x^2 + y^2 = a^2$ se convierte en $r^2 = a^2$, es decir $r = a$. El plano $z = a$ se convierte en $z = a$, y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $z = r$. Para el plano $x + y = 0$ obtenemos

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 0 \Rightarrow \tan \theta = -1 \Rightarrow \theta \in \{-\pi/4, 3\pi/4\},$$

entonces

$$U^* = \{(r, \theta, z) \mid r \leq z \leq a, 0 \leq r \leq a, -\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4\}.$$

Ahora

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{U^*} \exp(r) r \, d(z, r, \theta) = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^a \int_r^a \exp(r) r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^a \left(r \exp(r) \int_r^a dz \right) dr = \pi \int_0^a r \exp(r) (a - r) dr \end{aligned}$$

Aplicando integraciones por partes, obtenemos

$$I = (e^a(a - 1) + a + 1)\pi.$$

Regla de substitución para integrales

Ejemplo 4 Calcular la siguiente integral, donde U es la región entre $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, $b < a$:

$$I := \iiint_U \frac{d(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Solución sugerida. Como en el integrando aparece la función $x^2 + y^2 + z^2$ y el dominio U está limitado por dos esferas, conviene usar **coordenadas esféricas**:

$$x = \varrho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \varrho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \varrho \cos \phi,$$

donde el dominio de integración es

$$U^* = \{(\varrho, \theta, \phi) \mid b \leq \varrho \leq a, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

Tomando en cuenta que $x^2 + y^2 + z^2 = \varrho^2$ y

$$\det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\varrho, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\varrho \sin \phi \sin \theta & \varrho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \varrho \sin \phi \cos \theta & \varrho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\varrho \sin \phi \end{vmatrix} = -\varrho^2 \sin \phi,$$

Regla de sustitución para integrales

Ejemplo 4 (continuación)

obtenemos

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{U^*} \frac{1}{\varrho^3} \varrho^2 \sin \phi \, d(\varrho, \phi, \theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_b^a \frac{\sin \phi}{\varrho} \, d\varrho \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \int_b^a \frac{d\varrho}{\varrho} = 2\pi \cdot [-\cos \phi]_{\phi=0}^{\phi=\pi} \cdot [\ln \varrho]_{\varrho=b}^{\varrho=a} = 4\pi \ln \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

Integrales de línea

Ejemplo 5 Calcular la siguiente integral de línea, donde C es un segmento de la recta desde el punto $P(1, 1, 1)$ hasta $Q(2, 3, 4)$:

$$I = \int_C x \, dx + y \, dy + (x + y - 1) \, dz.$$

Solución sugerida. Verifiquemos primero si el campo vectorial $\vec{V} = (V_1, V_2, V_3) = (x, y, x + y - 1)$ es conservativo. Para ver que esto no es así, basta verificar que

$$\frac{\partial V_2}{\partial z} = 0, \quad \text{pero} \quad \frac{\partial V_3}{\partial y} = 1,$$

es decir como $\partial V_2 / \partial z \neq \partial V_3 / \partial y$ en todas partes, \vec{V} no es conservativo. Hay que **parametrizar** el segmento, por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(t) &= (1, 1, 1) + t((2, 3, 4) - (1, 1, 1)) \\ &= (1 + t, 1 + 2t, 1 + 3t), \quad t \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Integrales de línea

Ejemplo 5 (continuación)

Con esto obtenemos

$$f'(t) = (1, 2, 3),$$

luego

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \vec{V}(f(t)) \cdot f'(t) \, dt \\ &= \int_0^1 \left((1+t) \cdot 1 + (1+2t) \cdot 2 + (1+t+1+2t-1) \cdot 3 \right) dt \\ &= \int_0^1 (14t + 6) \, dt = 13. \end{aligned}$$