

Universidad de Concepción  
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  
Departamento de Ingeniería Matemática  
Dr. Raimund Bürger  
Profesor Titular

# Cálculo III

(Código 525211)

## Tarea 1 — martes 5 de mayo de 2020

Entrega: martes 12 de mayo de 2020, 23.00 horas

**Problema 1.** Indicar ejemplos de sucesiones  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  y  $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  tales que  $a_n \rightarrow \infty$  y  $b_n \rightarrow 0$  cuando  $n \rightarrow \infty$ , pero que

- (i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \infty$ ,
- (ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = -\infty$ ,
- (iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = c$  para cualquier  $c \in \mathbb{R}$  dado,
- (iv) la sucesión  $\{a_n b_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  es acotada, pero no converge.

**Problema 2.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y la sucesión  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  definida por

$$a_0 := a, \quad a_1 := b, \quad a_n := \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2}).$$

Demostrar que la sucesión converge y determinar su límite.

**Problema 3.** Para un espacio métrico  $(X, d)$  y un subconjunto  $A \subset X$  un punto  $x \in X$  se llama *punto adherente* de  $A$  si  $x$  pertenece a la *clausura* de  $A$ , denotada  $\bar{A}$ , es decir en cada vecindad de  $x$  existe por lo menos un elemento de  $A$ , es decir para todo  $\varepsilon > 0$ ,  $U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$ . Un conjunto  $A$  es cerrado si  $A = \bar{A}$ . Graficar los siguientes conjuntos (si posible) e identificar sus puntos interiores, de acumulación, de adherencia, de frontera y de puntos aislados. Además indicar si los conjuntos son abiertos, cerrados y compactos.

- (i)  $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ .
- (ii)  $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < 2|x| + |y| < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 16 \leq x^2 + 4y^2 < 64\}$ .
- (iii)  $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 < z < 4\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 4\}$ .
- (iv)  $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .
- (v)  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 4 - x^2 - y^2 \geq 0, (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}\} \cup \{(3, 3, \frac{1}{n}) \mid n \in \mathbb{N}\}$ .
- (vi)  $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2 < x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \leq 4\} \cup \{(0, 0, 0, 0)\}$ .
- (vii)  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}, 4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 16\}$ .

**Problema 4.**

- a) Sea  $(M, d)$  un espacio métrico. Demostrar que

$$\begin{aligned} \forall x, y, z \in M : \quad d(x, y) &\geq |d(x, z) - d(z, y)|; \\ \forall x, y, x', y' \in M : \quad |d(x, y) - d(x', y')| &\leq d(x, x') + d(y, y'). \end{aligned}$$

b) Se considera el espacio métrico  $\mathbb{R}^2$  con las métricas

$$d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}, \quad d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$

$$d_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\},$$

donde  $x = (x_1, x_2)$ ,  $y = (y_1, y_2)$ . Para cada una de las métricas, dibujar la bola unitaria

$$U_{i,1}(0) = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid d_i(0, y) \leq 1\}, \quad i = 1, 2, \infty.$$

**Problema 5.** ¿Cuales de las siguientes funciones  $g_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$  definen una métrica sobre  $\mathbb{R}^2$ ? Fundamente su respuesta o por una demostración, o por un contraejemplo.

$$g_1(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y, \end{cases} \quad g_2(x, y) = ((x_1 - y_1)^{1/2} + (x_2 - y_2)^{1/2})^2,$$

$$g_3(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \quad (\text{donde } d \text{ es alguna métrica sobre } \mathbb{R}^2),$$

$$g_4(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ d(x, z) + d(y, z) & \text{si } x \neq y, \end{cases}$$

donde en el caso de  $g_4$ ,  $d$  es alguna métrica sobre  $\mathbb{R}^2$  y  $z \in \mathbb{R}^2$  arbitrario.