

M2.4.

Notacja: $\langle n \rangle$ intuicyjnie oznacza n -krotnie skumulowany błąd względny nie większy niż u . Tzn. jeśli mamy $\tilde{x} = x \prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i)^{\pm 1}$ dla $|\alpha_i| \leq u$, to $\tilde{x} = x \langle n \rangle$. Z wykładu wiemy, że $|\langle n \rangle| \leq \frac{nu}{1-nu}$ oraz $\text{fl}(a \diamond b) = (a \diamond b) \langle 1 \rangle$.

Teza: Dla każdego $k \in \{0, \dots, n\}$ mamy

$$\tilde{w}_k = a_n x^{n-k} \langle 2(n-k) \rangle + \sum_{i=k}^{n-1} a_i x^{i-k} \langle 2(i-k) + 1 \rangle$$

Dowód:

Przypadek bazowy się zgadza $\tilde{w}_n = a_n$

Krok indukcyjny:

$$\begin{aligned} \tilde{w}_k &= ((\tilde{w}_{k+1} * x) \langle 1 \rangle + a_k) \langle 1 \rangle \\ &= \left(\left(a_n x^{n-k} \langle 2(n-k-1) \rangle + \sum_{i=k+1}^{n-1} a_i x^{i-k} \langle 2(i-k-1) + 1 \rangle \right) \langle 1 \rangle + a_k \right) \langle 1 \rangle \\ &= \left(\left(a_n x^{n-k} \langle 2(n-k-1) + 1 \rangle + \sum_{i=k+1}^{n-1} a_i x^{i-k} \langle 2(i-k) \rangle \right) + a_k \right) \langle 1 \rangle \\ &= a_n x^{n-k} \langle 2(n-k) \rangle + \sum_{i=k}^{n-1} a_i x^{i-k} \langle 2(i-k) + 1 \rangle \end{aligned}$$

Zatem $\tilde{w}_0 = a_n x^n \langle 2n \rangle + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \langle 2i + 1 \rangle$, jest to wynik dokładny dla tego samego x i pewnych współczynników a'_i zaburzonych o najwyżej $\langle 2n \rangle$ od początkowych a_i , czyli algorytm jest poprawny numerycznie.

M2.5.

$$\text{fl}(a + a^2) = (a + (a * a) \langle 1 \rangle) \langle 1 \rangle = a \langle 1 \rangle + (a * a) \langle 2 \rangle$$

Znajdźmy rozwiązanie $A = a \langle 1 \rangle + (a * a) \langle 2 \rangle = \bar{a} + \bar{a}^2$ dla $a > 2$. Jest to równanie kwadratowe i szukamy rozwiązania blisko a , a więc dodatniego i większego z dwóch.

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{-1 + \sqrt{1 + 4A}}{2} = \frac{-1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + A} = \frac{-1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a \langle 1 \rangle + (a * a) \langle 2 \rangle} \\ &= \frac{-1}{2} + \sqrt{\left(a \langle 1 \rangle + \frac{1}{2} \right)^2} = \frac{-1}{2} + \left(a \langle 1 \rangle + \frac{1}{2} \right) = a \langle 1 \rangle \end{aligned}$$

Zatem $\text{fl}(a + a^2)$ jest dokładną wartością $\bar{a} + \bar{a}^2$ dla pewnego $\bar{a} = a \langle 1 \rangle$, więc algorytm jest poprawny numerycznie.