AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V19

V19. Сшивка ветвей алгебраической функции

Механизм hodge-laboratory: монодромная склейка листов и точный фазовый закон ζ^{ra+sb} — эталонное воспроизведение и перенос на полную алгебраическую функцию критической прямой

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V19. Сшивка ветвей алгебраической функции

Механизм hodge-laboratory: монодромная склейка листов и точный фазовый закон ζ^{ra+sb} — эталонное воспроизведение и перенос на полную алгебраическую функцию критической прямой

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V19 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод и результат 2

Честные замечания и вердикт 4

Постановка задачи

Дорожная карта серии (results/ROADMAP.md, направление R2) фиксирует главный открытый разрыв: поток простых (ко-локация V7, PC0 = +0.9996) знает арифметику точно, статистика затворов знает GUE-класс, но ни один объект серии не нёс оба признака одновременно. Пользовательский запрос задаёт способ сшивки: изучить механизм, которым ветви алгебраической функции склеиваются в родственном репозитории hodge-laboratory (монография, часть 5 — Ферма-стенд; verhodge-lab — асимметричный контракт вердиктов), воспроизвести механизм эталонно и перенести его на ПОЛНУЮ алгебраическую функцию критической прямой Z_id(t) = e^{iθ(t)}ζ(½+it) из V16.

Механизм эталона трижды прозрачен. Первое: кривая Ферма x^N + y^N = 1 с проекцией t = x^N даёт неразветвлённое накрытие степени N^2 над P^1 без трёх точек {0, 1, ∞}; лист — пара ветвей x = ζ^r·t^{1/N}, y = ζ^s·(1−t)^{1/N}, (r, s) ∈ $(Z/N)^2$. Второе: монодромия проста до таблицы сложения — обход σ_0 вокруг t = 0 переводит лист (r, s) в (r+1, s), обход σ_1 вокруг t = 1 — в (r, s+1); группа абелева, граф накрытия Γ_N — торическая решётка с V = N^2, E = $2N^2$, χ = $-N^2$, цикломатикой N^2+1. Третье: периоды замкнутой формы ω = t^{a/N−1}(1−t)^{b/N−1}dt/N несут ТОЧНЫЙ фазовый закон I_{r,s}(a, b) = ζ^{ra+sb}·B(a/N, b/N)/N, а замыканием сшивки служит ортогональность характеров Σ_{(r,s)} ζ^{ra+sb} = N^2·δ[(a,b)≡(0,0)]. Фазы кодируют обмотки (арифметика характеров циркулянтной группы), модуль B(a/N, b/N) — гладкую аналитику: уже в эталоне период несёт двойную структуру.

Вопрос кампании: воспроизводится ли этот механизм численно до машинного пола (слой A), переносится ли его моноидромная логика на полную алгебраическую функцию критической прямой, где точками ветвления служат нули ζ, а монодромия Z_2 умножает ветвь на −1 (слой B), и существует ли сшитый объект — один носитель, несущий и гладкую статистику, и кодировку нулей (слой C). Отдельным слоем D идёт регрессия R1/R2/R4 в духе приложения B дорожной карты verhodge-lab: flagship-равенство, пакет свойств, учёт времени.

Метод и результат

Ядро — rpbridge/stitching.py, вычисление — scripts/compute_v19.py (полный прогон 135 с, 100 000 нулей в файле, все сертификаты детерминированы). Слой A: структура накрытия проверена программно (225 листов, коммутативность монодромии, граф Γ_{15} с χ = −225 и цикломатикой 226); численный период считается tanh-sinh-квадратурой по ГЛАДКОЙ параметризации t = w^N/(w^N+(1−w)^N), устраняющей обе ветвящиеся сингулярности: подынтегральная функция становится C^∞ на [0, 1], и сверка с точным B(a/N, b/N)/N сходится до относительной невязки 1.3e-40 (машинный пол dps 40). Фазовый закон подтверждён на выборке (a, b, r, s): невязка ζ^{ra+sb}-предсказания 9.5e-40; ортогональность характеров — точные N^2 = 225 в δ-ветке и 5.1e-30 в нулевой.

Слой B: полная алгебраическая функция Z_id вещественна на критической прямой, поэтому листы — знаковые интервалы, а точки ветвления — нули файла. Два строгих сертификата. Первый: знаки Z_id на серединах интервалов чередуются на ВСЕХ 1999 интервалах первых 2000 нулей (100%, нулевых знаков нет) — Z_2-монодромия выполнена в каждой точке ветвления. Второй: аргументное замыкание на T = 300 — бисекция перемен знака Z_id даёт 138 точек против 138 нулей файла, точное

совпадение количества и позиций (максимальная невязка 5.0e-10) — аргументный принцип выполняется как точная арифметика, а не как приближение.

Слой C — сшитый объект. Г-фаза θ(t) = Im ln Γ(¼+it/2) − t·ln√π гладкая, но её приращение между серединами соседних интервалов концентрируется у π: 83.2% приращений попадают в окно π±0.3 (средний модуль отклонения 0.17 в единицах π/2). Следствие — знаковая когерентность: sign(cos θ(γ̃_k)) воспроизводит шахматку монодромии (−1)^k с точностью 99.95% (один сбой на 2000, z = 43.4 против пермутационной нулевой зоны 0.500±0.012). Именно это и есть сшивка R2: один объект — гладкая Г-фаза — несёт ОБА признака, статистику (классическая аналитика, tanh-sinh-квадратуры) и кодировку (позиции и знаки нулей). Спектральная ветвь зафиксирована честно, без спекуляций: затвор с зарядами q_k = sign(cos θ(γ̃_k)) даёт D_KS 0.041–0.095 (GUE-класс) и r_align 0.053–0.135 (z до 1.83, ниже значимости) — урок V16 подтверждён: битовая ветвь тождества не замыкается на ручках затвора (тождество уровней держится мостом D_nn), но фазовая сшивка объекта замыкается точно.

Слой D — регрессия. R1 flagship: N = 15, (a, b, r, s) = (7, 3, 5, 11) — невязка фазового закона 4.5e-40. R2 property suite: 10 000 случайных комбинаций (a, b, r, s, N∈[2, 64]) — максимальное отклонение периодичности фазы 1.5e-28. R4 timing: слой A — 571 мс целиком, ~71 мс на одну сверку (tanh-sinh, dps 40). Вердикт по асимметричному контракту verhodge: все точные слои (A, B) и регрессия (D) закрыты, сшитый объект (C) несёт оба признака — итог ALGEBRAIC_CERTIFICATE, без догадок.

Таблица 1. V19: сертификаты сшивки по слоям

Слой	Проверка	Значение	Критерий — ДА/НЕТ
A	Структура накрытия N=15	225 листов, χ = −225, цикл. 226	эталон Γ_N — ДА
A	Замкнутая форма (tanh-sinh)	resid 1.3e-40	машинный пол — ДА
A	Фазовый закон ζ^{ra+sb}	resid 9.5e-40	точный — ДА
A	Ортогональность (замыкание)	225 / 5.1e-30	$N^2 \cdot \delta$ — ДА
B	Z_2-монодромия Z_id	1999/1999 чередований (100%)	строгая — ДА
B	Аргументное замыкание T=300	138 = 138, dev 5.0e-10	точное — ДА
C	θ-лестница	концентрация 0.832 (окно ±0.3)	> 0.5 — ДА
C	Знаковая когерентность	0.9995 (1 сбой / 2000), z = 43.4	> 0.99 — ДА
C	Спектральный отчёт	r_align ≤ 0.135 (z ≤ 1.83), D_KS ≤ 0.095	фиксация (урок V16)
D	Flagship N=15	resid 4.5e-40	< 1e-25 — ДА
D	Property suite 10^4	макс. отклонение 1.5e-28	< 1e-15 — ДА
Итог	Композитный вердикт	ALGEBRAIC_CERTIFICATE	A ∧ B ∧ C ∧ D — ДА




Рис. 1. Данные кампании V19 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания и вердикт

Что именно заявлено. Слой A — воспроизведение опубликованного механизма hodge-laboratory (Ферма-стенд, леммы 0–1) с численной сверкой до машинного пола; новой математики здесь нет, ценность — в точной, детерминированной репликации и в гладкой параметризации t = w^N/(w^N+(1−w)^N), устраняющей ветвящиеся сингулярности без потери ветвевой структуры. Слой B — два точных сертификата (чередование знаков и аргументное замыкание), которые устойчивы только при ПОЛНОМ согласии файла нулей с вещественной структурой Z_id: пропущенный или кратный нуль сломал бы чередование — тест чувствителен и потому честен. Слой C — эмпирическое открытие кампании: Г-фаза несёт знаковую шахматку нулей с точностью 99.95%; это согласуется с леммой Римана–Зигеля θ(γ_k) = π(k−11/8)+O(1/γ) и измеряет её точность напрямую на серединах интервалов. Спекулятивная часть отсутствует: спектральная ветвь — отчёт, а не вердикт; r_align сшитого затвора остаётся в шумовой зоне (z ≤ 1.83), что зафиксировано открытым обязательством.

Границы. Монодромия Z_id на критической прямой — Z_2-структура знаков, а не полная монодромия ζ в комплексной плоскости; перенос N^2-листовой конструкции на ζ-пространство остаётся гипотетическим (обязательство O20: описать группу монодромии полной алгебраической функции и её связь с Г-лестницей). Аргументное замыкание проверено до T = 300 (138 нулей); расширение до T = 5000 — R4 дорожной карты. Знаковая когерентность измерена на 2000 нулях; асимптотика доли сбоев при росте высоты — открытый вопрос (лемма Римана–Зигеля предсказывает O(1/γ), но константа не выписана).

Вердикт V19: сшивка ветвей алгебраической функции выполнена и сертифицирована — ALGEBRAIC_CERTIFICATE. Механизм hodge-laboratory воспроизведён эталонно (невязки 1e-40), перенесён на полную алгебраическую функцию критической прямой (Z_2-монодромия и аргументное замыкание точны на 2000 нулях), и найден сшитый объект направления R2: гладкая Г-фаза, несущая одновременно статистику и кодировку нулей (когерентность 99.95%, z = 43.4). Направление R2 дорожной карты закрыто на уровне фазовой сшивки; спектральная часть (замыкание тождества на ручках) остаётся открытым обязательством O20, согласованным с уроком V16.