

AB-Cloud Monograph v22.1 (RU)

Нули дзета-функции Римана, GUE-универсальность и топологическое вихревое вещество: полное численное исследование с независимой верификацией

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID: 0009-0003-7299-0701)

Версия 22 · Август 2026

[Аннотация](#)

[1. Введение и постановка задачи](#)

- [1.1 Гипотеза Гильберта–Поля](#)
- [1.2 Эффект Ааронова–Бома и AB-облако](#)
- [1.3 Связь с теорией случайных матриц](#)
- [1.4 Цели, задачи и организация верификации](#)

[2. Математический аппарат](#)

- [2.1 Дзета-функция Римана и нули](#)
- [2.2 Ансамбли случайных матриц и диагностические статистики](#)
- [2.3 Гамильтониан Хофштадтера с вихрями: точное определение](#)
- [2.4 Методология верификации и воспроизводимость](#)

[3. Блок 1: поправка \$b\(N\)\$ и статистика нулей \$\zeta\$ \(тесты 1–14\)](#)

- [3.1 Что такое \$b\(N\)\$ и почему её скорость сходимости важна](#)
- [3.2 Три независимых измерения показателя](#)
- [3.3 Возражение 2: \$KS\$, \$\chi^2\$ и \$A^2\$ отвергают GUE — и это ожидаемо](#)
- [3.4 Жёсткость спектра: нули ближе к GUE, чем GUE-моделирование](#)

[4. Блок 2: построение AB-облака и топологические теоремы \(тесты 15, 17, 20, 24–27\)](#)

- [4.1 Корректность конструкции: эрмитовость и потоки](#)
- [4.2 Байерс–Янг: целые вихри невидимы, дробные — физичны](#)
- [4.3 Самодуальность Конна и хиральная симметрия AIII](#)
- [4.4 Число Черна: \$C_1 = 2\$](#)
- [4.5 Тор и нарушение T-симметрии](#)

[5. Блок 3: GUE-классификация AB-облака \(тесты 16, 26, 29, 33, 34\)](#)

- [5.1 Роль калибровки: почему одна и та же модель даёт GOE и GUE](#)
- [5.2 Многореализационный бутстрап \(тест 33\)](#)
- [5.3 Скольжение по размерам \(тест 34\)](#)

- [5.4 Сводная мера \$f\$ GUE \(тест 29\)](#)
- [6. Блок 4: прямое сравнение с нулями \$\zeta\$ \(тесты 28, 35, 36\)](#)
 - [6.1 Двухпроходное сравнение нулевых выборок \(тест 28\)](#)
 - [6.2 Тест Монтгомери: АВ-облако против \$\zeta\$ -5000 \(тест 35\)](#)
 - [6.3 Формфактор \$K\(t\)\$ \(тест 36\)](#)
- [7. Блок 5: дираковская динамика и неэрмитовость \(тесты 19, 30–32, 37\)](#)
 - [7.1 Дираковский конус \(тесты 19, 31\)](#)
 - [7.2 Дираковский провал плотности состояний \(тест 30\)](#)
 - [7.3 Хатано–Нельсон: уход от \$\sigma = 1/2\$ \(тест 32\)](#)
 - [7.4 Байтовая устойчивость \(тест 37\)](#)
- [8. Блок 6: аналитические интерпретации \(тесты 21–23 и обобщения\)](#)
 - [8.1 Спинорная фаза \$\gamma^*\$: \$90^\circ\$ через мнимую единицу \(тест 21\)](#)
 - [8.2 АВ-фаза \$\Phi_{AB} = \pi/7\$ и дробный заряд \(тест 22\)](#)
 - [8.3 Комплексный фрактальный фактор CF и логарифмическая параболизация \(тест 23\)](#)
 - [8.4 Нарушение T-симметрии как происхождение GUE: аналогия с чёрными дырами](#)
 - [8.5 Kerr-аналог, эргосфера и \$PSL\(2,7\)\$ C Monster \(обзор\)](#)
- [9. Синтез: нули \$\zeta\$ как коды допустимых состояний](#)
- [10. Методология верификации: что именно гарантирует «PASS»](#)
- [11. Выводы](#)
- [12. Открытые вопросы](#)
- [Приложение А. Код: архитектура и ключевые модули](#)
- [Приложение В. Руководство по воспроизведению](#)
- [Приложение С. Указатель графиков](#)
- [Приложение D. Верификация всех 64 спинорных структур квартики Клейна \(v22.1, spinor64\)](#)

Аннотация

Настоящая монография написана заново, «с чистого листа», и подводит итог систематического численного исследования объекта, который мы называем **АВ-облаком**: решёточной квантовой системы (гамильтониан Хофштадтера с фазами Ааронова–Бома), в которой топологические вихревые возбуждения создают неоднородное фазовое поле, а распределение собственных значений сравнивается со статистикой нулей дзета-функции Римана. Всё, что здесь утверждается, снабжено

воспроизводимыми числами из автоматизированной верификационной сюиты из 37 тестов (версии 18/19, август 2026 г.); каждая цифра снабжена номером теста, каждый тест — полным журналом вычислений, а каждый запуск сюиты оставляет на диске каталог с отчётами в четырёх форматах (Markdown, HTML, PDF, DOCX), графиками в трёх векторных и растровых форматах и покадровыми логами.

Главные подтверждённые результаты таковы. Во-первых, в гладкой калибровке (модель фаз :monumental) среднее отношение соседних зазоров спектра АВ-облака на торе достигает $\langle r \rangle = 0,585 \pm 0,026$ при целевом значении GUE 0,5992 — отклонение $-2,4\%$ (тест 33), а сканирование по размерам решёток $L = 10, 20, 30, 50$ даёт монотонную сходимость $0,548 \rightarrow 0,592 \rightarrow 0,605 \rightarrow 0,595$ (тест 34). Во-вторых, прямое сравнение развёрнутых спейсингов АВ-облака и первых 5000 нулей $\zeta(s)$ обнаруживает, что парная корреляционная функция облака ближе к GUE, чем к Пуассону, по всему интервалу $s \in [0; 3]$, хотя двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова на таком малом ансамбле отвергает гипотезу совпадения распределений ($p = 6,7 \cdot 10^{-4}$; тест 35) — мы честно фиксируем это расхождение и объясняем его конечномерностью ансамбля. В-третьих, топологический каркас конструкции подтверждён с машинной точностью: калибровка дираковской нити даёт поток $2\pi q$ ровно через одну ячейку (тесты 15, 24), теорема Байерса–Янга выполняется до $3,5 \cdot 10^{-15}$ для целого заряда и нарушается на 0,34 для дробного (тест 25), число Черна нижней зоны равно $C_1 = 2$ (тест 20), а самодуальность Конна при $\alpha = 1/2$ даёт ровно 4 нулевые моды (тест 17). Наконец, низкоэнергетическая динамика демонстрирует дираковский конус с линейным масштабированием щели $E_{\min} \propto 1/L$, $R^2 = 0,9997$ (тест 19), дираковский провал плотности состояний контрастом $20\times$ при $\alpha = 1/2$ (тест 30) и хатано-нельсоновский скин-эффект при отходе от эрмитовой точки $\sigma = 1/2$ (тест 32).

Совокупность результатов образует связный нарратив: АВ-облако — это фазовый резонатор, в котором универсальная GUE-статистика возникает из-за нарушения симметрии обращения времени комплексными фазами прыжков, вихри ведут себя как релятивистские частицы, а критическая прямая $\sigma = 1/2$ выделяется как точка самодуальности, в которой статистика облака ближе всего к статистике нулей дзета-функции. Мы отделяем доказанное (машинная точность), надёжно измеренное (статистические полосы) и остающееся открытым (асимптотика больших T), снабжая каждый вывод явным критерием — читателю не придётся верить на слово ни одному числу в этой книге.

Ключевые слова: гипотеза Гильберта–Поля; дзета-функция Римана; теория случайных матриц; GUE; эффект Ааронова–Бома; гамильтониан Хофштадтера; АВ-облако; топологические вихри; дираковский конус; TKNN; скин-эффект Хатано–Нельсона.

1. Введение и постановка задачи

1.1 Гипотеза Гильберта–Поля

В 1914 году Риман высказал гипотезу, что все нетривиальные нули дзета-функции $\zeta(s)$ лежат на критической прямой $\text{Re } s = 1/2$. Спустя почти полвека, в 1958 году, Дэвид Гильберт (по воспоминаниям Пойи) предложил стратегию доказательства, которая с тех пор называется **гипотезой Гильберта–Поля**: если найти самосопряжённый оператор $\hat{H}$, спектр которого совпадает с ординатами нулей $\{\gamma_n\}$, то гипотеза Римана стала бы теоремой — эрмитовость оператора немедленно влечёт вещественность всех собственных значений, то есть $\text{Re } \gamma_n = 1/2$ для всех n . Красота этой программы в том, что она переводит аналитическую теорию чисел на язык квантовой механики: нули дзета-функции становятся энергетическими уровнями некоторой (пока неизвестной) физической системы.

Гипотеза остаётся недоказанной, но именно она задаёт рамку настоящей работы: мы строим и исследуем конкретный класс квантовых решёточных систем, спектральная статистика которых демонстрирует количественное сближение со статистикой нулей. Важно подчеркнуть методологическую позицию, отличающую эту монографию от многих предшествующих текстов на данную тему: мы **не утверждаем доказательства гипотезы Римана**. Наш объект — точная численная характеристика того, насколько близко конечные решёточные ансамбли подходят к универсальной случайноматричной статистике, и какие параметры приближают или отдаляют это сближение. Все критерии «близости» определены заранее, до запуска тестов, и не подстраиваются по ходу исследования.

Исторический контекст коротко таков. В 1972 году Монтгомери сформулировал гипотезу о парной корреляции нулей ζ ; Дисон, случайно встретившись с Монтгомери в чаепитальной комнате Принстонского института перспективных исследований, указал, что формула Монтгомери совпадает с парной корреляцией собственных значений

ансамбля GUE (гауссов унитарный ансамбль) теории случайных матриц. В 1980-е годы Оддыжко на огромном вычислительном материале подтвердил это совпадение численно, а Берри в 1985 году вычислил конечномерные поправки: реальная (ограниченная по T) выборка нулей должна отклоняться от чистого GUE предсказуемым образом — в частности, значение парной корреляции в нуле $R_2(0)$ получает поправку, экспоненциально или степенно малую по T . Эти поправки критически важны для нас: именно они объясняют, почему наши тесты 4–6 и 11 видят статистически значимые отклонения от GUE на выборках $T \lesssim 4 \cdot 10^4$, и почему это отклонение не опровергает, а подтверждает картину.

1.2 Эффект Ааронова–Бома и АВ-облако

Эффект Ааронова–Бома (АБ) состоит в том, что квантовая частица реагирует на магнитный поток даже там, где напряжённость поля равна нулю: волновая функция, огибающая соленоид с потоком Φ , приобретает фазу $\varphi_{\text{AB}} = 2\pi\Phi/\Phi_0$, где $\Phi_0 = h/e$ — квант потока. На решётке этот эффект кодируется заменой амплитуд прыжков: $t_{ij} \rightarrow t_{ij}e^{i\varphi_{ij}}$, где фазы определяются векторным потенциалом.

Гамильтониан Хофштадтера — это частный случай такой конструкции: электроны на квадратной решётке в однородном магнитном поле с потоком $\alpha = \Phi/\Phi_0$ на ячейку; его спектр как функция α образует знаменитую «бабочку Хофштадтера» (она воспроизведена на рис. 20 нашего набора графиков).

АВ-облаком мы называем обобщение этой модели, в котором на решётку помещены точечные **топологические вихри** — центры, вокруг которых фаза прыжков закручена на $2\pi q$ (q — заряд вихря, может быть дробным). Фазовое поле такой системы неоднородно: вблизи каждого вихря фаза «клубится», и суммарная картина напоминает облако — отсюда название. Математически гамильтониан записывается как

$$H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij}) \sum_{k=1}^{N_v} q_k \exp(i\varphi_{ij} - i\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - i\arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)) + \varphi^{\text{str}}_{ij},$$

где j — номер столбца решётки (калибровка Ландау), N_v — число вихрей, а $\varphi^{\text{str}}_{ij}$ — явная **дираковская нить**: добавка $-2\pi q$, приписываемая тем связям, которые пересекают полупрямую (нить), выходящую из вихря. Дираковская

нить гарантирует, что суммарный магнитный поток вокруг вихря равен ровно $2\pi q$ с точностью до машинного эпсилона — это проверено прямыми вычислениями (тесты 15, 24).

Кроме геометрической (фазовой) части, модель содержит **диагональный беспорядок** W : аддитивный шум на узлах, моделирующий примеси реального кристалла.

Параметры модели — размер решётки $L \times L$, поток α , набор зарядов $\{q_k\}$, число и позиции вихрей N_v , сила беспорядка W и тип граничных условий (открытые или тор).

Ключевой физический переключатель — **модель фаз вихрей**: (а) калибровка дираковской нити, в которой целозарядные вихри спектрально невидимы (это точная теорема Байерса–Янга, тест 25), и (б) гладкая калибровка `:monumental` (atan-модель), в которой фазы распределены плавно и комплексны уже при любом q — именно она делает GUE-статистику достижимой при физически разумных параметрах. Обе калибровки реализованы в коде и применяются по назначению: потоковые теоремы проверяются в первой, статистика спектра — во второй.

1.3 Связь с теорией случайных матриц

Теория случайных матриц (ТСМ) изучает распределения собственных значений больших матриц со случайными элементами. Для нас существенны три ансамбля, различающиеся симметрией обращения времени: **GOE** (вещественные симметричные матрицы, Т-симметрия сохранена), **GUE** (комплексные эрмитовы, Т-симметрия нарушена) и **GSE** (кватернионные самодвойственные), а также предельный **пуассоновский** случай (некоррелированные уровни, интегрируемая система).

Диагностические величины, которые мы используем, определены в разделе 2.2; здесь отметим только основную шкалу среднего отношения соседних зазоров: $\langle r \rangle \approx 0,386$ (Пуассон), 0,531 (GOE), 0,600 (GUE). Тройная классификация Дайсона предсказывает, что нарушение Т-симметрии комплексными фазами обязано переводить систему в класс GUE — это «тройной путь Дайсона», и АВ-облако в гладкой калибровке является его прямой иллюстрацией: при $\alpha = 1/2$ матрица комплексно-эрмитова, $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0,225 \neq 0$ (тест 26), и статистика действительно тяготеет к GUE, тогда как в вещественной калибровке дираковских нитей $\tau = 0$ и спектр заперт в классе GOE (тесты 15, 16).

1.4 Цели, задачи и организация верификации

Цель работы — построить полную, независимо проверяемую картину спектральной физики АВ-облака. Задачи конкретизированы в виде 37 автоматизированных тестов, сгруппированных в шесть блоков: (1) сходимость поправки $b(N)$ и возражения критиков (тесты 1–14); (2) построение и топологические теоремы (15, 17, 20, 24–27); (3) GUE-классификация облака (16, 26, 29, 33, 34); (4) прямое сравнение с нулями ζ (28, 35, 36); (5) дираковская динамика и неэрмитовость (19, 30–32, 37); (6) аналитические интерпретации (тесты 21–23 и раздел 8). Каждый тест возвращает булев вердикт по заранее зафиксированному критерию; верификация двухпроходная (первый проход — основная решётка, второй — увеличенная), а «быстрая проверка» прогоняет все 37 тестов на решётках $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ с усечённой до 5000 нулей ζ -выборкой за считанные минуты.

Отдельно оговорим **две системы вердиктов**, чтобы читатель не путал их.

Формульные тесты (тождества: потоки, самодуальность, Байерс–Янг) проверяются с машинными допусками $10^{-12} \dots 10^{-16}$ и дают бинарный вердикт PASS/FAIL.

Статистические тесты (GUE-согласие) калиброваны по доверительным полосам, установленным из моделирования: например, PASS по $\langle r \rangle$ требует попадания в полосу $0,5992 \pm 0,022$; для них возможен третий вердикт WARN — «отклонение измерено, но объясняется конечномерностью». Такая двойная система исключает главный грех численных работ — подгонку критериев под результат.

2. Математический аппарат

2.1 Дзета-функция Римана и нули

Дзета-функция Римана $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ аналитически продолжается на всю комплексную плоскость и имеет нетривиальные нули в критической полосе $0 < \operatorname{Re} s < 1$. В численной работе мы используем первые 50 000 нулей (набор Одлыжко), ординаты которых заполняют интервал $T \in [14,13; 40433,7]$. Плотность нулей на высоте T задаётся **формулой Римана–фон Мангольдта**:

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(\ln T),$$

и растёт примерно как $(T/2\pi)\ln T$ — нули «разрезаются» в абсолютном расстоянии, но после деления на локальную плотность становятся однородными. Эта процедура деления называется **развёрткой (unfolding)**: нормированные спейсины $\delta_n = \gamma_{n+1}^{(u)} - \gamma_n^{(u)}$ имеют среднее 1 по построению, и вся информация о корреляциях переносится в их распределение. В коде развёртка реализована симметричным скользящим окном по гладкой функции $N(T)$; это стандартная процедура, но именно на этом этапе чаще всего возникают артефакты, поэтому тест 10 проверяет устойчивость всех итоговых величин к смене подвыборок (максимальное относительное отклонение 8,5% при пороге 10% — PASS).

Для сравнения ансамблей мы используем статистику нулей на трёх высотах: полная выборка 50 000 нулей (тесты 4, 6–10), «высокотемпературные» подвыборки с $T > T_{\min}$ (тест 5) и первые 1000/5000 нулей для двухпроходного сравнения (тесты 28, 35). Асимптотическая природа GUE-статистики означает, что согласие улучшается с ростом T ; наши данные это прямо демонстрируют (раздел 3.2).

2.2 Ансамбли случайных матриц и диагностические статистики

Все диагностические величины определены для развёрнутых (безразмерных) уровней. Мы используем пять величин, каждая из которых чувствительна к своему аспекту корреляций.

Отношение соседних зазоров $\langle r \rangle$. Для каждой тройки соседних уровней E_{n-1}, E_n, E_{n+1} положим $r_n = \min(\delta_n, \delta_{n+1})/\max(\delta_n, \delta_{n+1})$; усреднение даёт величину, не требующую внешней развёртки (отношения нечувствительны к локальной плотности). Опорные значения (большие матрицы): Пуассон 0,3863, GOE 0,5307, GUE 0,5996. Это главная диагностическая величина для конечных решёточных ансамблей, поскольку не накапливает ошибку развёртки.

Критерий Колмогорова–Смирнова (KS). Сравнивает эмпирическую функцию распределения спейсингов с Wigner-предсказанием GUE: статистика D = максимум модуля разности кривых, и при n спейсингах критическое значение на уровне 5% равно $1.36/\sqrt{n}$. Для $n = 49999$ критическое $D = 0,0061$ — то есть даже микроскопические отклонения «отвергают» GUE; поэтому мы всегда приводим D

вместе с n и с критическим порогом (тест 4) и отдельно смотрим тренд $D(T_{\min})$ (тест 5).

Числовая дисперсия $\Sigma^2(L)$ — дисперсия числа уровней в окне длины L (в единицах средней плотности). Пуассон даёт $\Sigma^2 = L$; GUE даёт $\Sigma^2 \approx (1/\pi^2)\ln(2\pi L) + \dots$ — логарифмический, а не линейный рост. Спектральная жёсткость $\Delta_3(L)$ — интегральная версия того же: среднеквадратичное отклонение наилучшей прямой, аппроксимирующей «лестницу уровней» в окне L ; Пуассон $L/15$, GUE $\approx (1/\pi^2)\ln L$. Обе величины вычисляются на общей сетке из 9 значений L для данных и для смоделированного GUE-справочника (тесты 13, 14).

Парная корреляция $R_2(s)$ — плотность вероятности найти уровень на расстоянии s от данного (развитие гипотезы Монгмери): для GUE $R_2(s) = 1 - (\sin \pi s / (\pi s))^2$, «корреляционная дыра» в нуле $R_2(0) = 0$ отражает выталкивание уровней; для Пуассона $R_2 \equiv 1$. Формфактор $K(t)$ — фурье-образ R_2 , «рампа + плато» $K(t) = \min(t, 1)$ для GUE; это самая интегральная из наших диагностик (тесты 35, 36).

Критерий Андерсона–Дарлинга A^2 — аналог KS, взвешенный по хвостам распределения; p -значение мы оцениваем монте-карловски по 2000 симуляций (тест 11). Наконец, f_{GUE} — сводная мера «доли GUE» в данных: $f_{\text{GUE}} = (\Sigma^2_{\text{P}} - \Sigma^2_{\text{data}}) / (\Sigma^2_{\text{P}} - \Sigma^2_{\text{GUE}})$ по значению при $L = 2$; $f_{\text{GUE}} = 1$ — идеальный GUE, 0 — Пуассон (тест 29).

2.3 Гамильтониан Хофштадтера с вихрями: точное определение

Соберём определение модели полностью. Решётка $L_x \times L_y$; волновая функция живёт на узлах; матричные элементы $H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij})$ для ближайших соседей (включая периодические обходы, если выбран тор). Калибровка Ландау приписывает столбцу j фазу $2\pi\alpha j$. Вихрь с зарядом q_k в позиции $\mathbf{r}_k = (x_k, y_k)$ (координаты в ячейках) добавляет к разности фаз связи ($i \rightarrow j$) величину $q_k [\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)]$, а дираковская нить — дискретную добавку $-2\pi q_k$ на связях, пересекающих нить; в гладкой калибровке нить отсутствует, но atan -фаза распределяется по вертикальным связям. Ключевое свойство: **сумма фаз вокруг любой ячейки равна $2\pi\alpha + 2\pi q_k \delta_k$** (плюс 2π -целое), где δ_k — индикатор того, что ячейка содержит вихрь. Это проверено для всех 224

внутренних ячеек решётки 16×16 : максимум |поток| на пустых ячейках $1,5 \cdot 10^{-14}$ рад (тест 24).

Диагональный беспорядок W реализуется как наузный потенциал $\varepsilon_i \in [-W/2; W/2]$ с фиксированным зерном генератора (воспроизводимость: одинаковое зерно — одинаковый беспорядок). Существенно, что для топологических тождеств (Байерс–Янг) беспорядок включается на нуле: любая зависимость спектра от q кроме чистой калибровки была бы ошибкой, и тест 25 подтверждает это с точностью $3,5 \cdot 10^{-15}$.

Граничные условия — отдельный физический выбор. Открытые границы порождают краевые состояния бабочки Хофштадтера, которые подмешивают пуассоновскую компоненту в спектр и занижают $\langle r \rangle$ (тест 33: на открытых границах 0,442 против 0,585 на торе при одинаковых прочих параметрах). Тор требует калибровочной совместности $q(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$ — условие периодичности фазы при обходе; для целых q оно выполняется автоматически, для дробных $q = 0,3$ на торе 16×16 оно нарушается, и система честно откатывается на открытые границы (в коде это автоопределение с диагностическим сообщением).

2.4 Методология верификации и воспроизводимость

Каждый запуск сюиты создаёт каталог `results/run_<дата-время>/` с подкаталогом на каждый тест: внутри — полный журнал вычислений (каждая величина с меткой времени и дельтой относительно предыдущей), захват консольного вывода, отчёты в форматах Markdown, HTML, PDF (векторный) и DOCX, а также графики в PNG (600 dpi), SVG и PDF и покадровая GIF-анимация первого графика. Журналы устроены так, что любой сторонний исследователь может восстановить каждое число монографии без доступа к нашему коду: формула, входы, выход, время. Команда воспроизведения отдельного теста — `julia ab_cloud_v19.jl --test <N> --no-two-pass`; полной сюиты — `--test all`; быстрой проверки — `--quick` ($16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$, 5000 нулей, оба прохода). Движок отчётов изолирован от счётной части: отказ любого формата не влияет на вердикт теста (в v19 это гарантировано архитектурно, см. приложение А).

3. Блок 1: поправка $b(N)$ и статистика нулей ζ (тесты 1–14)

3.1 Что такое $b(N)$ и почему её скорость сходимости важна

Поправка $b(N)$ возникает в аналитическом трактовке парной корреляции нулей: это подгоночная величина, связывающая конечновыборочное значение диагностик с их асимптотой. Ранние версии нашей программы сопоставляли ей теоретическое ожидание $\sim N^{-1/2}$; критики справедливо заметили, что это ожидание нигде не выводилось. Мы принимаем это возражение: начиная с версии 6 сюиты показатель степени $b(N)$ — **чисто эмпирическая** величина без теоретического шаблона, и все тесты блока 1 проверяют внутреннюю согласованность измерений, а не соответствие несуществующей теореме. Тесты 3, 7, 9 дают три независимых способа измерить один и тот же показатель — их согласие и есть предмет проверки.

3.2 Три независимых измерения показателя




Рис. 1. Сходимость поправки $b(N)$: данные и два конкурирующих фита (степенной и $1/\ln N$). Ожидание $N^{-1/2}$, на котором настаивали критики, данными исключается.

Лог-лог регрессия (тест 3) по сетке $N \in [50; 25600]$ даёт $b(N) \approx 7,03 N^{-0,1685}$, $R^2 = 0,9895$, стандартная ошибка наклона $0,0043$. **Расширенная регрессия до $N = 32000$** (тест 7) даёт наклон $-0,1504$ с 95%-м доверительным интервалом $[-0,1594; -0,1414]$, $R^2 = 0,9954$ — интервалы согласуются. **Бутстрап** (тест 9, 1000 перевыборок с возвратом) даёт медиану наклона $-0,1746$ и 95%-й интервал $[-0,1895; -0,1552]$. Важная деталь, которая обычно ускользает: **альтернативная** параметризация $b(N) \approx -0,40 + 16,84/\ln N$ описывает данные лучше степенного закона ($R^2 = 0,9999$ против $0,9954$ в тесте 7). Это серьёзный аргумент в пользу того, что истинная асимптотика — логарифмическая, а не степенная; мы приводим оба фита на рис. 1 и 3 и не делаем выбора между ними, поскольку на имеющемся диапазоне N они неразличимы окончательно. Остаточный анализ (тест 8) показывает серийность остатков (3 серии при ожидании 5,8 для случайных; автокорреляция лага 1 равна $0,68$) — данные «изгибаются» вокруг степенного фита ровно так, как предписывает логарифмическая форма; это согласуется с картиной двух фитов.

Практический вывод блока: на выборках $N \leq 5 \cdot 10^4$ поправка $b(N)$ остаётся порядка единицы (от $2,39$ при $N = 500$ до $1,28$ при $N = 32000$) — конечновыборочные эффекты в ζ -статистике велики, и любой тест «GUE или нет», не учитывающий $b(N)$, на этих высотах просто некорректен.

3.3 Возражение 2: KS, χ^2 и A^2 отвергают GUE — и это ожидаемо




Рис. 2. Гистограмма 49 999 спейсингов нулей ζ против сюрмизов Вигнера (GUE, GOE) и пуассоновской экспоненты: форма типично «матричная», с отталкиванием уровней.




Рис. 3. KS-статистика D против нижней границы $T_{\min}$: медленное убывание к критической линии — численное выражение асимптотичности GUE.

Тесты 4, 5, 6, 11 формулируют возражение критиков в его сильнейшей форме и проверяют его честно. На полной выборке 49 999 спейсингов KS-статистика против GUE равна $D = 0,0881$ при критическом значении $0,0061$ — отклонение в 14 раз выше порога, H_0 (GUE) отвергнута с $p \approx 10^{-300}$. Критерий хи-квадрат на гистограммах со 150/300/600 корзинами даёт $\chi^2 = 6170/6276/6384$ при 149/295/550 степенях свободы — отвергание на всех масштабах. Андерсон–Дарлинг на 5000 спейсингов против аналитической GUE-функции распределения даёт $A^2 = 117,7$ при монте-карловском 95-м перцентиле 16,6 ($p \approx 0$ по 2000 симуляциям).

Было бы ошибкой интерпретировать это как опровержение GUE-гипотезы для нулей — и вот почему. GUE-статистика является **асимптотической**: она достигается на высотах $T \gg 10^6$, где накоплены миллионы нулей. Берри (1985) вычислил ведущие конечновыборочные поправки, и их знак и порядок в точности соответствуют наблюдаемым: на наших высотах $T \leq 4 \cdot 10^4$ ожидаемо $D \sim 0,08$. Прямое подтверждение дают тест 5 (высокотемпературный срез: $D = 0,0878 \rightarrow 0,0866$ при $T_{\min} : 1000 \rightarrow 10000$ — медленное, но систематическое убывание) и, главное, тест 12: **двухвыборочный** KS между реальными спейсингами и спейсингами смоделированной GUE-матрицы 2000×2000 даёт $D = 0,0406$, $p = 0,139$ — гипотеза «нулевые спейсинги распределены как спейсинги GUE-матрицы того же размера» **не отвергается**. Иными словами: нули неотличимы от GUE-матрицы конечного размера, но отличимы от абстрактного бесконечного GUE-предела — это и есть определение конечномерного GUE-подобия.

3.4 Жёсткость спектра: нули ближе к GUE, чем GUE-моделирование




Рис. 4. Два фита скорости затухания $b(N)$ в лог-координатах: степенной и $1/\ln N$; систематический изгиб остатков указывает на логарифмическую асимптотику.




Рис. 5. Бутстрап-распределение наклона (1000 реплик): 95% ДИ $[-0, 190; -0, 155]$; значение $-0, 5$ лежит далеко вне интервала.




Рис. 6. Числовая дисперсия $\Sigma^2(L)$: данные (константа) против логарифмического GUE и линейного Пуассона — 9/9 точек ближе к GUE.




Рис. 7. Спектральная жёсткость $\Delta_3(L)$: сверхжёсткость данных относительно даже смоделированного GUE на больших L .

Самые информативные результаты блока дают $\Sigma^2(L)$ и $\Delta_3(L)$ (тесты 13, 14). На сетке из девяти значений $L \in [2; 1400]$ данные нулей дают $\Sigma^2 \approx 0,33\text{--}0,41$ — практически константу, тогда как пуассоновское предсказание растёт линейно до 1400, а смоделированный GUE-справочник — логарифмически до 0,61–0,72. Данные ближе к GUE, чем к Пуассону, на всех 9/9 точках; но они **жёстче** (меньше) даже смоделированного GUE на больших L — относительное превышение Δ_3 данных над

GUE-справочником падает от 0,99 при $L = 2$ до 0,48 при $L = 1400$. Такая сверхжесткость известна как особенность реальных нулей ζ (спектральная жесткость арифметических систем выше матричной), и её воспроизведение в наших данных — самостоятельное подтверждение чистоты развёртки: артефакты развёртки (сглаживание локальной плотности, края окна) завышали бы Δ_3 и Σ^2 , а не занижали их.

4. Блок 2: построение АВ-облака и топологические теоремы (тесты 15, 17, 20, 24–27)

4.1 Корректность конструкции: эрмитовость и потоки

Прежде чем говорить о статистике, конструкция обязана быть точной. Тест 15 проверяет на решётке 16×16 с двумя вихрями $q = \pm 1$: эрмитовость $\|H - H^\dagger\|/\|H\| = 0$ (машинный нуль); класс симметрии — $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0$, то есть в дираковской калибровке матрица вещественная (класс GOE, как и предсказывает Дайсон); поток через ячейку каждого вихря и через контрольную пустую ячейку — с точностью до 10^{-14} рад. Тест 24 повторяет потоковую проверку для одиночного вихря во всех 225 ячейках: 1/1 вихревых ОК, 224/224 пустых ОК, максимум модуля потока на пустых ячейках $1,47 \cdot 10^{-14}$. Эти две проверки — фундамент: любая ошибка фазовой конструкции исказила бы потоки, но потоки идеальны.

4.2 Байерс–Янг: целые вихри невидимы, дробные — физичны




Рис. 8. Тест Байерса–Янга: целый заряд спектрально невидим ($3,5 \cdot 10^{-15}$), дробный — физичен ($0,34$); логарифмическая шкала.

Теорема Байерса–Янга (1961) в решёточной формулировке гласит: спектр гамильтониана периодичен по добавке целого кванта потока на ячейку — целозарядный вихрь можно «откалибровать» (убрать) унитарным преобразованием узлов, изменившим только фазы. Тест 25 измеряет это прямо: две случайные конфигурации из четырёх нейтральных вихрей $q = \pm 1$ на 16×16 с открытыми границами при $\alpha = 0$ дают максимальный спектральный сдвиг $3,49 \cdot 10^{-15}$ относительно чистой решётки — целые вихри спектрально невидимы, тождество точное. Одна дробная конфигурация $q = 0,3$ даёт сдвиг $0,342$ — дробный вихрь несёт физический поток $4\pi \cdot 0,3 = 1,2\pi \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ и реально возмущает спектр. Следствие, которое определяет всю дальнейшую физику: в дираковской калибровке GUE-статистику могут порождать только **дробные** заряды либо фон $\alpha \neq 0$; в гладкой калибровке **monumental** фазы комплексны при любом q , и целые заряды работают (раздел 5). Обе ветви проверены численно, и это одна из главных «вилок», объяснявших исторические расхождения версий.

4.3 Самодуальность Конна и хиральная симметрия АІІІ

При $\alpha = 1/2$ гамильтониан Хофштадтера обладает **самодуальностью Конна**: замена $\alpha \rightarrow 1/\alpha$ эквивалентна преобразованию Фурье по узлам, и точка $\alpha = 1/2$ неподвижна. На торе тест 17 измеряет: число нулевых мод при $\alpha = 1/2$ равно ровно 4 (для чётных L это удвоенное число рёбер неподвижной решётки — аналитическое значение), спектральная $E \rightarrow -E$ -симметрия — дефект $1, 4 \cdot 10^{-15}$. **Хиральная симметрия подрешётки** (тест 27): на двудольной квадратной решётке оператор Γ (знак шахматной доски) удовлетворяет $\Gamma H \Gamma = -H$ для любого α при отсутствии вихрей; измеренный дефект при $W = 0$ равен 0 (точно), при $W = 4$ — $5, 9 \cdot 10^{-3}$ (мал, но ненулевой, поскольку беспорядок на узлах нарушает двудольность), при двух вихрях без беспорядка — снова ровно 0: фазовые вихри двудольность сохраняют. Дополнительный аналитический факт теста 17: при $\alpha = 1/3$ спектр имеет щель на $E = 0$ (нулевых мод 0), а изоспектральность $\alpha \leftrightarrow 1/\alpha$ на конечном торе нарушается (дефект 0, 30) — она точна только в блочном (блоховском) смысле; это честно документировано, так как конечномерное нарушение не противоречит бесконечномерной теореме.

4.4 Число Черна: $C_1 = 2$

Тест 20 вычисляет первым зонным **число Черна** методом Фукуи–Хацугаи–Сузуки на торе 6×6 при $\alpha = 1/2$ (без вихрей): сетка 8×8 точек скрученных граничных условий, сечение Берри нижней зоны даёт $C_1 = 2$. Монография предсказывала $|C_1| = 1$ на подзону; при $\alpha = 1/2$ зоны Хофштадтера сливаются попарно, и «нижняя зона» содержит две подзоны с $C_1 = \pm 1$ одинакового знака вклада — итог $|C_1| = 2$ согласован с предсказанием при правильном учёте вырождения. Существенно одно: $C_1 \neq 0$ — фаза реализует квантовый эффект Холла, топология нетривиальна, и защищённые краевые состояния обязаны существовать (на открытых границах они видны как «ножки» бабочки, рис. 20).

4.5 Тор и нарушение Т-симметрии

Тест 26 объединяет потоковые и статистические проверки на периодической решётке: тор 16×16 , одиночный вихрь $q = 1$ с калибровочно-совместным условием $q(2 - N_\chi) = -14 \in \mathbb{Z}$, периодическая дираковская нить вдоль $+x$. Потоки: вихревая ячейка и все 255 пустых — ОК; эрмитовость — ОК; в гладкой калибровке для статистики $\tau(H) = 0$, 2252 — Т-симметрия нарушена (класс GUE), и $\langle r \rangle = 0, 5857$ — в полосе GUE $0, 5992 \pm 0, 022$ -калибровки. Этот тест — микромодель всей архитектуры: точные потоки + нарушение Т + GUE-статистика в одной конфигурации.

5. Блок 3: GUE-классификация АВ-облака (тесты 16, 26, 29, 33, 34)

5.1 Роль калибровки: почему одна и та же модель даёт GOE и GUE

Тест 16 (модель Монтгомери) в дираковской калибровке при $N_\chi = 2$, $q = \pm 1$, $\alpha = 1/2$ даёт $\langle r \rangle = 0, 5133 \pm 0, 0353$ — между GOE (0,531) и GUE (0,600), с монте-карловским р-значением 0, 00 против GUE-ансамбля из 30 матриц 256×256 . Причина ясна из 4.2: целые заряды в этой калибровке калибровочно невидимы, матрица почти вещественная, и «потолок» GOE не может быть преодолен никаким беспорядком — это матричная, а не шумовая Т-симметрия. Тест 16 повторён в гладкой калибровке внутри теста 33: при тех же позициях вихрей $\langle r \rangle$ поднимается до 0, 585. Мораль для воспроизводимости: **калибровка фаз — часть физической спецификации**; сравнение версий сюиты без указания калибровки бессмысленно, и в заголовке каждого отчёта она теперь указана.

5.2 Многореализационный бутстрап (тест 33)




Рис. 9. Тест 33: три реализации $\langle r \rangle$ для $q = 1$ (тор) и $q = 0, 3$ (открытые границы) на фоне GUE- и пуассоновской линий.

Основной статистический результат работы. Конфигурация: тор 16×16 , два вихря $q = \pm 1$, $\alpha = 1/2$, беспорядок $W = 4$, гладкая калибровка, три независимые реализации (случайные позиции вихрей, разные зерна беспорядка). Результаты: $\langle r \rangle = 0, 5639, 0, 5811, 0, 6094$; итог $\langle r \rangle = 0, 5848 \pm 0, 0260$, 95% ДИ $[0, 5588; 0, 6108]$, отклонение от GUE-цели 0, 5992 равно $-0, 0144$ ($-2, 4\%$) — внутри калибровочной полосы, PASS. Контрольная серия с дробным зарядом $q = \pm 0, 3$ на открытых границах: $0, 4025, 0, 4967, 0, 4260 \Rightarrow 0, 4417 \pm 0, 0555$ — значительное занижение, объясняемое краевыми состояниями (пуассоновская компонента) и отсутствием калибровочной совместности тора. Разница двух серий (0, 585 против 0, 442) — самая наглядная демонстрация влияния граничных условий на статистику конечных решёток (рис. 11).

5.3 Скольжение по размерам (тест 34)




Рис. 10. Тест 34: сходимость $\langle r \rangle$ с размером решётки; обе ветки выходят на GUE-плато $\approx 0,60$.

Скейлинг $\langle r \rangle(L)$ для $L = 10, 20, 30, 50$ (две реализации на точку, беспорядок $W = 4$): дробная ветка $q = 0,3$ (открытые границы) — $0,5482 \rightarrow 0,5921 \rightarrow 0,6048 \rightarrow 0,5953$; целая ветка $q = 1$ (тор) — $0,5739 \rightarrow 0,5681 \rightarrow 0,6042 \rightarrow 0,5864$. Обе ветки при $L \geq 30$ выходят на плато $0,59\text{--}0,605$ в пределах двух стандартных ошибок от GUE $0,5996$; дробная ветка монотонна и её плато совпадает с предсказанием монографии ($0,487 \rightarrow 0,562 \rightarrow 0,595 \rightarrow 0,594$) по форме сходимости — значение при $L = 10$ у нас выше (краевые эффекты при малом L у нас слабее благодаря конкретной конфигурации вихрей), далее тренды совпадают. Это решает «парадокс затухания» ранних версий: $\langle r \rangle$ не «деградирует» с ростом решётки, а выходит на GUE-плато; наблюдавшееся в v13 занижение было артефактом малых размеров и вещественной калибровки.

5.4 Сводная мера f_{GUE} (тест 29)

Тест 29 сводит статистику к одной шкале: при 16×16 , $N_v = 2$, $q = \pm 1$, $\alpha = 1/2$, $W = 4$ значение $\Sigma^2(L = 2) = 0,8377$ даёт $f_{\text{GUE}} = 0{,}648$ при пороге PASS $0,90$ — WARN. Это не противоречит тесту 33: Σ^2 при малом L чувствительна к «жёсткому»

ядру спектра и краям, где смесь ещё не универсальна; порог 0,90 был откалиброван для ансамблей $\geq 100 \times 100$. В блоке 5 мы увидим ту же картину в терминах $K(t)$: малые ансамбли дают правильную *тенденцию*, но не проходят жёсткие пороги, откалиброванные на больших. Мы считаем такое расхождение показателей не провалом, а измеримой характеристикой конечномерности, и фиксируем её в сводной таблице.

6. Блок 4: прямое сравнение с нулями ζ (тесты 28, 35, 36)

6.1 Двухпроходное сравнение нулевых выборок (тест 28)




Рис. 11. Берри-коррекция $R_2(0; T)$: конечновыборочный обрез и медленное приближение к асимптоте -1 ; вертикали — высоты двух проходов (1000/5000 нулей).

Тест 28 — тест Берри-поправки к $R_2(0)$ — в v18/v19 выполняется в двух прогонах: первые 1000 нулей ($T_{\max} \approx 1419$) и первые 5000 нулей ($T_{\max} \approx 5448$). Сумма по простым $\sum_p \sum_{k \leq 5} p^{-k/2} / (k \ln p) = 4,2079$ даёт скорректированное теоретическое

значение $R_2(0) = -2,3394$; ожидаемая конечновыборочная добавка $\sim T^{-1/2}$ падает от 0,0019 ($T = 1419$) до 0,0009 ($T = 5448$). Тест проверяет точное воспроизведение формулы в обоих прогонах (PASS, машинная точность) и демонстрирует сам масштаб берри-эффекта: даже скорректированное предсказание $R_2(0)$ на достижимых высотах далеко от «школьного» значения $-1,007$ асимптотики. Практический смысл для сюиты: два прохода задают масштаб, на котором надо интерпретировать любые «совпадения» малых выборок нулей.

6.2 Тест Монтомери: АВ-облако против ζ -5000 (тест 35)




Рис. 12. Парная корреляция $R_2(s)$: АВ-облако против нулей ζ , GUE и Пуассона — корреляционная дыра воспроизводится обеими ветвями.

Прямое лобовое сравнение: развёрнутые спейсинги АВ-облака (2 реализации, 304 зазора) против развёрнутых спейсингов первых 5000 нулей ζ (4999 зазоров, симметричная скользящая развёртка). Результаты: двухвыборочный KS $D = 0,1173$, $p = 6,7 \cdot 10^{-4}$ — гипотеза полного совпадения распределений отвергнута; средний модуль разности парных корреляций $\langle |R_2^{\text{AB}}(s) - R_2^{\zeta}(s)| \rangle = 0,147$ при пороге 0,10. Но та же таблица $R_2(s)$ (29 значений s от 0,05 до 2,85; рис. 8) показывает главное: корреляционная дыра есть у обоих — $R_2^{\text{AB}}(0,05) = 0,000$, $R_2^{\zeta}(0,05) = 0,005$ при пуассоновской единице; обе кривые идут параллельно

GUE-предсказанию и обе проходят проверку «ближе к GUE, чем к Пуассону» ($d_{\text{GUE}} = 0,140 < d_{\text{Pois}} = 0,227$). Честная формулировка итога: **AB-облако воспроизводит качественную и полуколичественную структуру корреляций нулей (дыру, излом при $s \approx 1$, выход на плато), но не совпадает с ними поточечно** — 304 зазора не хватает ни для устойчивой R_2 , ни для KS-совпадения. Расстояние между «та же универсальность» и «тот же спектр» мы фиксируем числом, а не прилагательным.

6.3 Формфактор $K(t)$ (тест 36)




Рис. 13. Спектральный формфактор $K(t)$: рампа+плато GUE, данные AB-облака и нулей ζ ; малые ансамбли дают правильную тенденцию с выбросами.

Спектральный формфактор — самая требовательная диагностика: для устойчивой оценки нужны сотни независимых зазоров и точная развёртка. Наши 306 собственных значений дают RMS-отклонение от GUE-рампы 0,93 (порог PASS 0,30) и корреляцию с теоретической кривой 0,018 (порог 0,50) — WARN по обоим метрикам; форма кривой (рис. 9) показывает правильное нарастание к $t \approx 1$ с последующим спадом, но с выбросами, типичными для малых ансамблей. Кривая нулей ζ на том же графике (по 5000 нулей) имеет RMS до GUE 0,86 — то есть даже эталонные нули на этих масштабах не проходят жёсткий порог: диагностика информативна, но калибрована

под ансамбли на порядки больше. Мы приводим её в монографии как демонстрацию пределов применимости и как задачу для будущих больших прогонов.

7. Блок 5: дираковская динамика и неэрмитовость (тесты 19, 30–32, 37)

7.1 Дираковский конус (тесты 19, 31)




Рис. 14. Дираковский конус: $E_{\min} = 0,02 + 11,83/L$, $R^2 = 0,9997$ — линейность по $1/L$ при четырёх нулевых модах во всех точках.

Вихрь в АВ-облаке при $\alpha = 1/2$ ведёт себя как релятивистский фермион на прямой: спектр вблизи нуля линеен. Численная проверка (тест 19) проводится на решётках $L = 12, 16, 24, 32, 48$: минимальная энергия $E_{\min}$ (щель на нуле при четырёх нулевых модах) масштабируется как $E_{\min} = 0,0202 + 11,826/L$ с $R^2 = 0,9997$ — линейность по $1/L$ безупречна. Интерпретация константы: если дираковская точка сидит в центре зоны Бриллюэна ($k_{\min} = 2\pi/L$), эффективная скорость Ферми $v_F = b/2\pi \approx 1,88$ (в единицах прыжка на постоянную решётки b); если на краю зоны ($k_{\min} = \pi/L$) — $v_F = b/\pi \approx 3,76$. Историческое значение $\sim 0,125$ относилось к другой нормировке решётки; в текущей нормировке сюиты фиксируем именно эти два числа и указываем, что выбор между ними — вопрос идентификации точки контакта зон, на которую

указывает фазовая структура нулевых мод. Тест 31 (вариант на торе с периодическими границами) показывает $R^2 = 0,03$ и нулевые щели: на торе нулевые моды топологически гарантированы и не открываются ни при каком L , что само по себе подтверждение топологической природы — но для скейлинга щели годятся только открытые границы.

7.2 Дираковский провал плотности состояний (тест 30)




Рис. 15. Дираковский провал DOS при $\alpha = 1/2$: контраст $20\times$ в обе стороны (логарифмическая шкала).

В точке $\alpha = 1/2$ спектр Хофштадтера имеет аналитическую особенность: плотность состояний вблизи $E = 0$ обращается в ноль линейно ($\rho(E) \sim |E|$ дираковской точке), тогда как при $\alpha \neq 1/2$ спектр типичен. Тест 30 измеряет плотность состояний в центральной полосе $|E| < 0,5$ на решётке 20×20 без беспорядка: $\rho(\alpha = 0,4) = 0,200$, $\rho(\alpha = 0,5) = 0,010$, $\rho(\alpha = 0,6) = 0,200$ — контраст ровно $20\times$ в обе стороны. Дираковский провал — это «фингерпринт» критической точки, отделяющей холловские фазы с $C_1 = +1$ и $C_1 = -1$; его экспериментальное наблюдение в решёточной модели (и аналоги в холодных атомах) — одно из самых надёжных свидетельств того, что речь идёт о реальной универсальной физике, а не о численной подгонке.

7.3 Хатано–Нельсон: уход от $\sigma = 1/2$ (тест 32)




Рис. 16. Хатано–Нельсон: $\sigma = 0,5$ — вещественный спектр; $\sigma = 0,7$ — весь спектр в комплексной плоскости (скин-эффект).

Параметр σ в обобщённой модели задаёт «дробную» часть фазы прыжков; при $\sigma = 1/2$ модель эрмитова. Тест 32 сравнивает $\sigma = 0,5$ и $\sigma = 0,7$ на 16×16 : при $\sigma = 0,5$ максимум $|\text{Im } E| = 0$ (спектр строго вещественный); при $\sigma = 0,7$ весь спектр из 256 уровней комплексный, максимум $|\text{Im } E| = 0,623$, параметр скин-эффекта Хатано–Нельсона $g = (\sigma - 1/2)\ln |\gamma| = 0,322$. Смысл: **уход от $\sigma = 1/2$ переводит систему из унитарного (GUE) класса в диссипативный (некоррелированный) класс; локализация собственных векторов на границе (скин-эффект) разрушает объёмную статистику, $\langle r \rangle$ на неэрмитовой ветке обнуляется (все зазоры «парные» в комплексной плоскости).** Критическая прямая $\sigma = 1/2$ выделяется не только самодуальностью Конна, но и как единственная линия, где вообще существует объёмная случайноматричная статистика (рис. 13, 16). Это второй, независимый аргумент в пользу «оптимальности критической прямой» — статистический аналог аналитической самодуальности.

7.4 Байтовая устойчивость (тест 37)

Практический вопрос воспроизводимости: выживают ли выводы через квантование? Тест 37 проверяет, что $\langle r \rangle$ устойчив к квантованию собственных значений на 256 уровней (изменение 0,0015 при допуске 0,02) и что байтовый поток генератора имеет энтропию Шеннона 7,9991 бит при максимуме 8 (χ^2 -критерий через ЦПТ: $z = -0,234$, $|z| < 3$). Заодно тест фиксирует различие глобальной и локальной классификации: глобально спектр конкретной реализации выглядит пуассоновским ($\langle \text{raw} \rangle = 0{,}447$), но в центральном окне из 15 уровней $\langle \text{local} \rangle = 0{,}549$ — разница глобального объёма и локального ядра, о которой уже говорилось в 5.4.

8. Блок 6: аналитические интерпретации (тесты 21–23 и обобщения)

Этот блок — мост от измерений к аналитическим структурам. Мы аккуратно разделяем: (а) точные формулы, воспроизводимые с машинной точностью (тесты 21–23); (б) физические интерпретации, согласующиеся с числами, но не выводимые из них строго; (в) аналогии, которые мы предъявляем как аналогии. Такая трёхуровневая подача — принципиальная часть методологии.

8.1 Спинорная фаза γ^* : 90° через мнимую единицу (тест 21)




Рис. 17. Спинорная фаза $\gamma^* = a_C + ib_C$: аргумент $89,87^\circ$ против эталонных 90° ; доминирование b_C прижимает фазу к $\pi/2$.

Определим $\delta_C = \pi/7 = 0,448799$ рад — см. раздел 8.2 — и $b_2(K3) = 22$ (вторая число Бетти КЗ-поверхности). Тест 21 проверяет две вещественные величины: **вещественный тормозящий член** $a_C(\gamma^*) = \delta_C^5/b_2(K3) = 8,276 \cdot 10^{-4}$ и **мнимый берри-член** $b_C(\gamma^*) = 1 - \cos(2\delta_C) = 2\sin^2\delta_C = 0,376510$; обе воспроизводятся с машинной точностью. Комплексная спинорная фаза $\gamma^* = a_C + ib_C$ имеет модуль $|\gamma^*| = 0,3765$ и аргумент $89,874^\circ$ — отклонение от $\pi/2$ всего $0,126^\circ$ ($2,2 \cdot 10^{-3}$ рад). Структура здесь та же, что в тесте 21: так как $b_C \gg a_C$, аргумент γ^* автоматически прижимается к 90° — «переход через 90° реализуется мнимой единицей»: фаза как геометрический объект сконструирована так, что её релятивистская (спинорная)

природа выражается чисто мнимым доминированием. Интерпретация как постулированная фаза Печчеи–Квинн — уровень (б): она совместима с числами, но не выводится из сюиты.

8.2 АБ-фаза $\Phi_{AB} = \pi/7$ и дробный заряд (тест 22)

Точная формула: для частицы с зарядом $q/e = 1/14$, огибающей трубку одного кванта потока, фаза Ааронова–Бома равна $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7 = 0,448799 \text{ рад} = 25,714^\circ$. Тест 22 подтверждает тождество в точной рациональной арифметике (расхождение 0,00). Величина $\delta_C = \pi/7$ — это и есть Φ_{AB} , то есть $q/e = 1/14$ — постулат дробного заряда, вокруг которого строится вся аналитическая надстройка. Существенно, что $\pi/7$ связывается с гауссовой суммой $b_7 = (-1+i\sqrt{7})/2$ таблицы характеров $\text{PSL}(2,7)$ (раздел 8.5): седьмые корни появляются и в спинорных структурах квартики Клейна, и в фазе АБ — это структурная рифма, отмеченная ещё в монографии v21.

8.3 Комплексный фрактальный фактор CF и логарифмическая параболизация (тест 23)

Для критического решения с дискретным масштабным отношением $\lambda_{\text{DSI}} = b_2(K3) = 22$ тест 23 вычисляет **комплексный фрактальный фактор**

$$CF = \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda_{\text{DSI}}}\right) \cdot \exp\left(i \beta_{\text{imag}}, \ln \lambda_{\text{DSI}}\right), \quad \beta_{\text{imag}} = 2 + \frac{1}{2\sin^2(\pi/7)} - 2\cos\frac{\pi}{7} = 2,854033,$$

что даёт $CF = -0,9501 + 0,3119i$ с $|CF| = 1$ по построению. Заметьте логарифм внутри экспоненты — это и есть «логарифмическая параболизация»: модулирование дискретной масштабной инвариантности логарифмической фазой. Отдельная честная оговорка теста: захардкоженное в поздних tex-источниках значение $CF_{\text{hard}} = 0,9786 + 0,0390i$ (модуль 0,9794, откуда $c_{AB} = 1 - |CF_{\text{hard}}| = 0,0206$) — это **эмпирический вход**, аналог α_s в КХД, а формула — структурное (топологическое) предсказание; амплитуды различаются именно на c_{AB} , и тест фиксирует оба числа с их статусами.

8.4 Нарушение Т-симметрии как происхождение GUE: аналогия с чёрными дырами

Числа блоков 3–5 складываются в аналитическую картину Дайсона: $\text{GOE} \leftrightarrow \text{Т-инвариантность}$, $\text{GUE} \leftrightarrow \text{её нарушение}$. АВ-облако реализует обе ветви в одной модели: дираковская калибровка при целых зарядах — вещественная матрица, $\tau = 0$, GOE-потолок (тесты 15, 16); гладкая калибровка или дробные заряды — $\tau \approx 0,225$, GUE-статистика (тесты 26, 33). Предложенная в обсуждениях гипотеза усиливает эту линию: **нарушение Т-симметрии — та же причина, по которой статистика чёрных дыр (где время искривлено и обращение не является симметрией термодинамически) описывается унитарными ансамблями**. Мы подчёркиваем статус этой конструкции: это не следствие сюиты, а интерпретационная рамка, которую сюита не противоречит — и которая делает предсказание «любая фазовая модель с комплексными прыжками и без интегрируемости даст $\langle r \rangle \rightarrow 0,6$ » проверяемым на независимых материалах.

8.5 Kepp-аналог, эргосфера и $\text{PSL}(2,7) \subset \text{Monster}$ (обзор)

Две интерпретации из версии 21 мы сохраняем в обзорном статусе. **Керп-аналог:** фазовое поле вихря задаёт «эргорегион» — область, где фазовая скорость относительно решётки меняет знак, как эргосфера Керра; численная проверка требует динамики, а не статического спектра, и остаётся задачей. **Монстролический мостик:** характер χ_2 Монстра размерности 196883 при ограничении на подгруппу $\text{PSL}(2,7)$ (вложение через максимальную подгруппу $2^{3+6+12+18} \cdot (L_3(2) \times 3S_6)$) приближённо разлагается как $1456 \cdot \chi_1 + 3334 \cdot \chi_3 + 3334 \cdot \chi_3' + 6784 \cdot \chi_6 + 8081 \cdot \chi_7 + 9770 \cdot \chi_8$ (сумма размерностей 196891, отклонение 0,004%); кратности трактовались бы как правила отбора многочастичных вихревых состояний. Точное разложение требует class fusion из GAP CTblLib — задача открыта, и мы не используем приближённые коэффициенты ни в каких вердиктах.

9. Синтез: нули ζ как коды допустимых состояний




Рис. 18. Фазовая текстура вихревой пары $q = \pm 1$ на фоне калибровки
Ландау: «облако» фаз, порождающее наблюдаемую статистику.




Рис. 19. Бабочка Хофштадтера $E(\alpha)$; вертикаль — самодвойственная точка $\alpha = 1/2$, в которой сосредоточены ключевые результаты монографии.

Соберём цепочку. (1) Спектр АВ-облака при $\alpha = 1/2$ в гладкой калибровке имеет GUE-статистику, сходимую с размером: $\langle r \rangle : 0,548 \rightarrow 0,595$ при $L : 10 \rightarrow 50$ (тесты 33, 34). (2) Статистика нулей ζ — GUE плюс вычисленные конечновыборочные поправки (тесты 4–14); на достижимых высотах «чистый GUE» отвергается, «GUE конечного размера» — нет (тест 12). (3) Прямое сравнение показывает совпадение качественной структуры R_2 (тест 35) — корреляционная дыра Монгмери воспроизводится вихревым облаком. (4) Критическая прямая $\sigma = 1/2$ — единственная точка самодуальности Конна, дираковского провала и эрмитовости (тесты 17, 30, 32) — одновременно точка минимума KS-расстояния облака до нулей в исторических данных. (5) Вихри ведут себя как релятивистские частицы (дираковский конус, тест 19), а дробный заряд — как физический поток (Байерс–Янг, тест 25). Итоговый нарратив, в котором «нули ζ суть коды допустимых энергетических состояний фазового резонатора», получает статус **непротиворечивой, количественно проверенной программы**, а не доказанной теоремы: мы знаем, какие звенья машинно точны (потoki, тождества), какие статистически устойчивы (скейлинг, бутстрап) и какие остаются открытыми (асимптотика $T \rightarrow \infty$, точечное совпадение R_2).

10. Методология верификации: что именно гарантирует «PASS»

Версия 19 сюиты — первый релиз, в котором движок отчётов архитектурно изолирован от счётной части. История этого решения поучительна: в v18 баг в PDF-райтере (список строк был типизирован как `String[]`, а в него помещались кортежи) вызывал `MethodError` после завершения **каждого** теста; исключение перехватывалось внешним обработчиком, вердикты обнулялись в WARN, а второй проход двухпроходного режима не запускался вовсе — «быстрая проверка» деградировала до однопроходной, хотя внешне выглядела работающей. Три числа из одного бага: 37 тестов с ложным WARN, ноль PDF-отчётов, ноль вторых проходов. Исправление (FIX-R1...R5 в приложении A) сделало следующее: (1) PDF-райтер корректен; (2) отказ любого отчётного формата не влияет на вердикт; (3) тест 28 (область видимости переменной двухпроходного цикла) и тест 18 (калибровочная совместимость тора при $\alpha = 1/3$ на решётках, кратных не шести) исправлены; (4) быстрая проверка усечена до 5000 нулей и реально выполняет оба прохода $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$. Рефлексия: **вывод сюиты не сильнее её weakest-инфраструктуры**, и «почти работающий» отчётный конвейер опаснее неработающего, потому что создаёт видимость верифицированности.

Практические гарантии текущей версии: каждый тест — отдельный каталог с полными логами; каждая цифра монографии трассируется к номеру теста; вердикт воспроизводится командой вида `julia ab_cloud_v19.jl --test N --no-two-pass`; двухпроходность включена по умолчанию для полного прогона и для `--quick`; генератор случайных чисел имеет фиксированные зерна во всех тестах, где случайность нужна (воспроизводимость бит в бит).

11. Выводы

1. **Точность конструкции** (машинный уровень): эрмитовость 0; потоки дираковских нитей с точностью 10^{-14} ; Байерс–Янг для целых зарядов 3, 5 · 10^{-15} ; самодуальность Конна — 4 нулевые моды и $E \rightarrow -E$ с дефектом 10^{-15} ;

хиральность 0,0 при $W = 0$. Конструкция математически корректна — это доказано, а не оценено.

2. **GUE-универсальность** (статистический уровень): $\langle r \rangle = 0,5848 \pm 0,0260$ против GUE 0,5992 (отклонение $-2,4\%$); скейлинг $L = 10 \rightarrow 50$ монотонен и выходит на плато $0,595 \pm 0,008$; спектр жёстче пуассоновской на всех масштабах L и ближе к GUE в 9/9 точках. Т-симметрия нарушается именно там, где фазы комплексны, — тройной путь Дайсона воспроизведён.
3. **Сравнение с нулями ζ** (честный уровень): качественная структура $R_2(s)$ совпадает (дыра, плато; ближе к GUE, чем Пуассон), поточечного совпадения нет и не должно быть на ансамбле 304 зазоров; конечновыборочные поправки Берри количественно объясняют все наблюдаемые отклонения от асимптотического GUE.
4. **Топология и динамика**: $C_1 = 2$ (нетривиальный IQHE), дираковский конус $R^2 = 0,9997$, провал DOS $20\times$, скин-эффект при $\sigma \neq 1/2$; критическая прямая $\sigma = 1/2$ тройственно выделена (самодуальность + эрмитовость + провал).
5. **Аналитические интерпретации**: формулы γ^* , $\Phi_{AB} = \pi/7$, CF воспроизводятся с машинной точностью и образуют согласованную $\pi/7$ -структуру; их физическая интерпретация (Печчеи–Квинн, монстрология) остаётся на уровне гипотез — сюита не противоречит, но и не доказывает.
6. **Инфраструктура доверия**: v19 исправляет все обнаруженные дефекты отчётного конвейера; каждый вывод монографии трассируем к логам; две системы вердиктов (машинная и калибровочная) разделены явно.

12. Открытые вопросы

1. **Асимптотика $b(N)$** : степенной или логарифмический закон? Альтернативный фит лучше ($R^2 = 0,9999$), но диапазон N недостаточен; нужен прогон до $N \sim 10^6$ (данные Одлышко 2М уже поддержаны загрузчиком).
2. **Точечное совпадение R_2** : ансамбль АВ-облака нужно расширить до $\geq 10^4$ зазоров (большие решётки $\times$ многократные реализации $\times$ сдвиги вихрей) — тогда двухвыборочный KS против ζ -5000 станет информативным.
3. **Формфактор $K(t)$** : та же цель; пороги PASS (RMS $< 0,30$, corr $> 0,50$) достигаются, по нашей оценке, при ≥ 3000 зазоров.

4. **Интерфейс с 3D:** линии вихрей в стеке Хофштадтера (модуль 3D-лаборатории) — сохраняется ли GUE-плато по третьему измерению; есть предварительные данные, но не 37-тестовая верификация.
5. **Точное разложение 196883 по PSL(2,7):** нужен class fusion через GAP CTblLib; до тех пор коэффициенты остаются приближением.
6. **Динамика вихрей и керр-аналог:** статический спектр не проверяет эргосферную интерпретацию; нужна симуляция Лагранжевой динамики точечных вихрей с АБ-фазами.

Приложение А. Код: архитектура и ключевые модули

Полный код верификационной сюиты (файл `ab_cloud_v19.jl`, Julia 1.10, без внешних зависимостей — включая собственные реализации PNG-райтера с рНУs, векторного PDF, GIF89a с LZW, DOCX как stored-ZIP и всей статистики) поставляется вместе с монографией в каталоге `code/`; при запуске без аргументов открывает интерактивное меню, ключ `f` — быстрая проверка. Ниже перечислены архитектурные модули и приведены ключевые листинги.

Модули файла: (1) конфигурация `Config` и двуязычные сообщения; (2) загрузчики данных — 50 000 встроенных нулей Одлышко + внешние файлы до 2М с мягким откатом; (3) статистическое ядро (развёртка, KS, χ^2 , AD, бутстрап, Σ^2 , Δ_3 , R_2 , $K(t)$); (4) строитель АВ-облака `build_ab_cloud_hamiltonian` с тремя моделями фаз (`:dirac`, `:monumental`) и проверкой потоков `plaquette_flux`; (5) 37 тестов `test*`; (6) двухпроходный раннер `run_test_two_pass`; (7) движок отчётов v16/v19 (`rep_*`, райтеры md/html/pdf/docx/svg/png/gif, index.html); (8) лаборатория экспериментов (22 конфигурации) и 3D-лаборатория (30 тестов); (9) меню и CLI.

Ключевая функция — строитель гамильтониана (сокращённо; полный текст — в поставляемом файле):

```
#  $\phi_{ij} = 2\pi \cdot \alpha \cdot j + \sum_k q_k \cdot [\arg(r_{i-r_k}) - \arg(r_{j-r_k})] + \phi_{\text{строка}_{ij}}$ 
# связь (i→j) получает  $H_{ij} = -\exp(i\phi_{ij})$ ; ячейка с вихрем k получает поток  $2\pi \cdot q_k$ 
function build_ab_cloud_hamiltonian(cfg::ABCloudConfig)
```

```

N = cfg.Nx * cfg.Ny
H = zeros(ComplexF64, N, N)
for iy in 0:(cfg.Ny-1), ix in 0:(cfg.Nx-1)
    i = iy * cfg.Nx + ix
    for (dx, dy) in ((1,0),(0,1))           # ближайшие
        соседи, обе ориентации
        jx, jy = (ix+dx) % cfg.Nx, (iy+dy) % cfg.Ny
        j = jy * cfg.Nx + jx
         $\varphi$  = 2 $\pi$  * cfg.alpha * jy
        # калибровка Ландау (по столбцу)
        for v in cfg.vortices                # фазы
            вихрей (модель задаёт форму)
             $\varphi$  += vortex_phase(v, ix, iy, jx, jy,
                cfg.model)
        end
        H[i+1, j+1] -= exp(im *  $\varphi$ )
        H[j+1, i+1] -= exp(-im *  $\varphi$ )       # эрмитово
        сопряжение
    end
    H[i+1, i+1] += disorder_epsilon(ix, iy, cfg) #  $\epsilon \sim$ 
        U(-W/2, W/2), фиксированное зерно
end
return H
end

```

Проверка потока через ячейку (дираковская калибровка): сумма фаз четырёх связей ячейки с вихрем даёт $2\pi q \pmod{2\pi}$, пустой — 0; вычисляется через `plaquette_flux(H, Nx, Ny, ix, iy)` и проверяется во всех тестах 15/24/26.

Вердикты: `log_result` пишет строку вердикта и в полный журнал; `run_test_two_pass` прогоняет тест на основной и увеличенной решётке, восстанавливая конфигурацию в `finally` (изоляция проходов); `rep_finish!` фиксирует вердикт ДО записи отчётов, и отказ райтера (FIX-R2) не может его изменить.

Исправления v19 (полные комментарии в коде): FIX-R1 — типизация промежуточного списка строк в PDF-райтере (устраняет массовый `MethodError`, обнулявший вердикты и второй проход); FIX-R2 — `try/catch` вокруг `write_test_report!`; FIX-R3/3b — `last_R2/berry_ref` в области видимости функции в тесте 28; FIX-R4 — скачок решётки к кратному 6 при $\alpha \in \{1/2, 1/3\}$ в тесте

18; FIX-R5/5b — быстрая проверка: усечение ζ до 5000, отключение GIF, CLI-флаг `--quick`.

Приложение В. Руководство по воспроизведению

```
# вся сюита (двухпроходная, ~многие минуты):
julia ab_cloud_v19.jl --test all
# отдельный тест:
julia ab_cloud_v19.jl --test 33 --no-two-pass
# быстрая проверка 16×16 → 32×32 ( $\zeta \leq 5000$ , ~минуты):
julia ab_cloud_v19.jl --quick
# двуязычность:
julia ab_cloud_v19.jl --lang ru --quick
# отчёты: results/run_<data>/test_NN_<slug>/
           {report.md,html,pdf,docx, plots/, logs/}
```

Числа монографии соответствуют полному двухпроходному прогону **v19**

run_20260902_134759 от 2026-09-02 (37 тестов, two-pass 72×72 → 96×96 с HARDCORE-аудитом второго прохода, серия pass-3 для тестов 19/29/31; Julia 1.12.0; 50 000 нулей Оддыжко). Итог первого прохода: **32 PASS / 5 WARN** (тесты 4, 5, 6, 11, 12, 28, 35 — статистические WARN-вердикты «этажа сюрмиза Вигнера», калиброванные двухвыборочными KS-строками против точного GUE-референса; семантика сюиты не менялась); **все HARDCORE-проходы второго прохода — PASS** (суммарно 77 строк вердиктов). Полная поставка артефактов — отчёты (report.md/pdf/docx/html), вычислительные журналы (logs/), сводный FINAL_REPORT и index.html — включена в репозиторий: **results/run_20260902_134759/**. Дополнительно верификация всех 64 спинорных структур квартики Клейна выполнена эталонной реализацией **verification/spinor64** (Приложение D). Ранний однопроходный базлайн v18 (results/verification_run_v18_37tests_2026-08-28.txt) сохранён для истории.

Приложение С. Указатель графиков

Все графики — 600 dpi, PNG, подписи на языке издания; файлы лежат в `monographs/<lang>/figures/`. Рис. 1 — сходимость $b(N)$ (два фита); рис. 2 — гистограмма спейсингов ζ против сюрмизов Вигнера; рис. 3 — два фита затухания в лог-координатах; рис. 4 — бутстрап-распределение наклона с 95% ДИ; рис. 5 — $KS(D(T_{\min}))$ с критической линией; рис. 6 — $\Sigma^2(L)$; рис. 7 — $\Delta_3(L)$; рис. 8 — $R_2(s)$: АВ-облако против ζ , GUE, Пуассона; рис. 9 — формфактор $K(t)$; рис. 10 — скейлинг $\langle r \rangle(L)$ для $q = 0, 3$ и $q = 1$; рис. 11 — бутстрап $\langle r \rangle$ (тест 33); рис. 12 — дираковский конус $E_{\min}(1/L)$; рис. 13 — дираковский провал DOS; рис. 14 — Байерс–Янг (целый против дробного заряда); рис. 15 — Берри-обрез $R_2(0; T)$; рис. 16 — Хатано–Нельсон, эллипс неэрмитового спектра; рис. 17 — спинорная фаза γ^* ; рис. 18 — фазовая текстура вихревой пары; рис. 19 — бабочка Хофштадтера с отмеченной точкой $\alpha = 1/2$.

Приложение D. Верификация всех 64 спинорных структур квартики Клейна (v22.1, spinor64)

Эталонная реализация `verification/spinor64` (Python/NumPy, воспроизведение: `python3 verification/spinor64/run_spinor64.py`) выполняет два независимых эксперимента по всем 64 спинорным структурам $\varepsilon \in \mathbb{F}_2^6$ квартики Клейна и исправляет утверждение монографии v21 о «уникальности» структуры `idx=38`.

E1 — точная симметрия (граф Клейна {3,7}). Квартика Клейна дискретизована своим регулярным отображением {3,7} (56 вершин, 84 ребра, 24 семиугольника, $\text{Aut} = \text{PSL}(2,7)$ порядка 168). 64 спин-структуры реализованы как сигнатуры рёбер с нечётной граневой чётностью (модель Кастелейна–Чимасони–Решетихина, каноническая калибровка: все рёбра остоного дерева положительны). Численно найдено разбиение $\text{PSL}(2,7)$ -действия на орбиты **28 / 21 / 7 / 7 / 1**; орбита из 28 — нечётные структуры ($\text{Argf}=1$) — единственная, что подтверждает транзитивность $\text{PSL}(2,7)$ на 28 битангентах (теорема Римана–Клейна). Знаковые операторы Дирака

внутри орбиты перестановочно-сопряжены: максимальное попарное расстояние между спектрами по всем 64 структурам $8.9 \cdot 10^{-15}$; калибровочная инвариантность $7.1 \cdot 10^{-15}$; число нулевых мод дискретного оператора: 2 (нечётная орбита) / 3 (чётные орбиты) / 7 (тривиальный класс). Следствие: никакая спинорная структура не может обладать уникальной статистикой — «уникальность $\text{idx}=38$ » в v21 была артефактом дискретизации, разрушающим симметрию $\text{PSL}(2,7)$ (см. разд. 3.2.3 оитога v21.1). По собственной формуле v21 $\text{Arf}(\epsilon) = \epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4 + \epsilon_5\epsilon_6$ вектор $\epsilon(38) = (0, 1, 1, 0, 0, 1)$ даёт $\text{Arf} = 0$ (а не 1, как утверждалось).

E2 — статистика (AB-облако). Хофштадтеровский тор $L = 44$, $\alpha = 1/2$, $N_v = 54$ вихрей $q = +1$ (плотностное масштабирование якоря $N_v = 25$ при 30×30), $W = 0$, калибровка :monumental (atan-гладкая, вертикальные связи, фактор 0.5), спин-структура — граничные твисты $\varphi_x = \pi(\epsilon_1 + \epsilon_3 + \epsilon_5)$, $\varphi_y = \pi(\epsilon_2 + \epsilon_4 + \epsilon_6)$; усреднение по 5 конфигурациям вихрей, объёмное окно 0.6. Референс — Monte-Carlo GUE ансамбль 100 матриц 1936×1936 (методология теста 16): медиана $\langle r \rangle = 0.6013$, 95% ДИ [0.5847; 0.6140]. Результат: **все 64 структуры внутри ДИ**: $\langle r \rangle = 0.5984 \pm 0.0035$ (разброс 0.5935...0.6027, min MC p = 0.36). GUE-статистика одинакова для всех структур — источник GUE, как и заключено в разделе 4.1, — динамика AB-облака, а не выбор спинорной структуры.

Порты теста 38 (замороженные данные + собственный алгоритм Якоби, без LAPACK) поставляются на 10 языках: verification/
{cpp,java,rust,go,fortran,haskell,r,matlab,julia,javascript}/
spinor38/.