

Soal dan Solusi UTS Fungsi Khusus 2024

Wildan Bagus Wicaksono

MATEMATIKA 2022

Question 1

Hitunglah fungsi Gamma:

(a). $\Gamma(-2.3)$.

(b). $\int_0^{\infty} x^5 e^{-4x} dx$.

Penyelesaian.

(a). Menggunakan sifat $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) \iff \Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+1)}{n}$, diperoleh

$$\Gamma(-2.3) = \frac{\Gamma(-1.3)}{(-2.3)} = \frac{\Gamma(-0.3)}{(-2.3)(-1.3)} = \frac{\Gamma(0.7)}{(-2.3)(-1.3)(-0.3)} = \frac{\Gamma(1.7)}{(-2.3)(-1.3)(-0.3)(0.7)}.$$

Berdasarkan $\Gamma(1.7) = 0.90864$, diperoleh $\Gamma(-2.3) = -1.44711$.

(b). Misalkan $u = 4x$, maka $du = 4 dx$. Diperoleh

$$\int_0^{\infty} x^5 e^{-4x} dx = \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{4}\right)^5 e^{-u} \frac{du}{4} = \frac{1}{4^6} \int_0^{\infty} u^5 e^{-u} du = \frac{\Gamma(6)}{4^6} = \frac{5!}{4^6} = \frac{30}{4^5}.$$



Question 2

Hitunglah fungsi Beta:

(a). $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\cot(x)} dx.$

(b). $\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{(x-2)(5-x)}}.$

Penyelesaian.

Akan digunakan fakta $B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}.$

(a). Perhatikan bahwa

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\cot(x)} dx = \int_0^{\pi/2} (\cos(x))^{1/2} (\sin(x))^{-1/2} dx.$$

Perhatikan bahwa

$$\int_0^{\pi/2} (\cos(x))^{2m-1} (\sin(x))^{2n-1} dx = \frac{1}{2} B(m, n).$$

Dengan memerhatikan nilai m dan n yang memenuhi $2m - 1 = \frac{1}{2}$ dan $2n - 1 = -\frac{1}{2}$, diperoleh $m = \frac{3}{4}$ dan $n = \frac{1}{4}$. Jadi,

$$\int_0^{\pi/2} (\cos(x))^{1/2} (\sin(x))^{-1/2} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{2}$$

mengingat $\Gamma(1) = 1$. Menurut Euler Reflection Formula, yaitu $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ untuk $z \in \mathbb{C}$ dengan $\text{Re}(z) > 0$, dapat diperoleh bahwa untuk $z = \frac{1}{4}$ berlaku

$$\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2}.$$

Jadi, $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\cot(x)} dx = \frac{1}{2} \cdot \pi\sqrt{2} = \frac{\pi}{2}\sqrt{2}.$

(b). Misalkan $x = 3u + 2$, maka $dx = 3 du$ dan diperoleh

$$\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{(x-2)(5-x)}} = \int_0^1 \frac{3 du}{\sqrt{3u(3-3u)}} = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)}} = \int_0^1 u^{1/2}(1-u)^{1/2} du.$$

Tinjau fakta bahwa $\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} = B(m, n)$. Dengan memerhatikan nilai m dan n yang memenuhi $m - 1 = \frac{1}{2}$ dan $n - 1 = \frac{1}{2}$, diperoleh $m = n = \frac{3}{2}$. Ini berarti

$$\int_0^1 u^{1/2}(1-u)^{1/2} du = B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right)} = \frac{(\Gamma\left(\frac{3}{2}\right))^2}{\Gamma(3)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2}{2!} = \frac{\frac{1}{4}\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$$

mengingat $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$



Question 3

Menggunakan relasi rekurensi fungsi Mittag-Leffler,

$$E_{\alpha,\beta}(z) = zE_{\alpha,\alpha+\beta}(z) + \frac{1}{\Gamma(\beta)},$$

tentukan $\frac{d}{dz} (z^2 E_{1,3}(z))$.

Penyelesaian.

Perhatikan bahwa

$$E_{1,2}(z) = zE_{1,3}(z) + \frac{1}{\Gamma(2)} = zE_{1,3}(z) + 1 \implies z^2 E_{1,3}(z) = zE_{1,2}(z) - z.$$

Diperoleh pula

$$E_{1,1}(z) = zE_{1,2}(z) + \frac{1}{\Gamma(1)} = zE_{1,2}(z) + 1 \implies zE_{1,2}(z) = E_{1,1}(z) - 1.$$

Dari sini diperoleh

$$z^2 E_{1,3}(z) = zE_{1,2}(z) - z = E_{1,1}(z) - z - 1.$$

Perhatikan bahwa

$$E_{1,1}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z.$$

Dari sini diperoleh $z^2 E_{1,3}(z) = e^z - z - 1$ yang memberikan

$$\frac{d}{dz} (z^2 E_{1,3}(z)) = \frac{d}{dz} (e^z - z - 1) = e^z - 1.$$



Question 4

- (a). Menggunakan rumus Rodrigues, hitunglah polinom Legendre $P_3(x)$.
- (b). Hitung $P_3^1(0.5)$ jika polinom Legendre associate derajat n dan orde m didefinisikan dengan

$$P_n^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x).$$

Penyelesaian.

- (a). Akan digunakan $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ sehingga diperoleh $P_3(x) = \frac{1}{8 \cdot 6} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3$. Maka

$$\frac{d^3}{dx^3} (x^6 - 3x^4 + 3x^2 + 1) = \frac{d^2}{dx^2} (6x^5 - 12x^3 + 6x) = \frac{d}{dx} (30x^4 - 36x^2 + 6) = 120x^3 - 72x.$$

$$\text{Ini berarti } P_3(x) = \frac{1}{48} (120x^3 - 72x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}.$$

- (b). Diperoleh $P_3^1(x) = (-1)^1 (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} \left(\frac{5x^3 - 3x}{2} \right)$ yang memberikan

$$P_3^1(x) = - (1-x^2)^{1/2} \cdot \frac{15x^2 - 3}{2} = \frac{3}{2} (1-5x^2) (1-x^2)^{1/2}.$$

Diperoleh pula

$$P_3^1(0.5) = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{5}{4} \right) \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{16}.$$

