Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con

#### Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Teorema de König sobre coloreo latera

### Matchings

Daniel Penazzi

14 de mayo de 2021

### Tabla de Contenidos

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas d Hall y Kőnig Perfección y

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Teorema del

Attrimonio de König

Teorema del

Teorem

### Matchings

- Definición y problema
- Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
- Ejemplo
  - Rehaciendo el ejemplo con matrices
- 2 Teoremas de Hall y Kőnig
  - Perfección y Completitud
  - Teorema de Hall

#### Matchings

Penazz

#### Matching: Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Matrimonio de Köniç Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### Definición

#### Matchings

Penazz

Matching Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral

### Definición

Dado un grafo G un matching en G es un subgrafo M de G tal que el grado (en M) de cada vértice de M es uno.

En otras palabras, un matching es un conjunto de lados disjuntos.

#### Matchings

Penazz

Matching Definición y problema

problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Feorema de Hall
Feorema del
Matrimonio de König
Feorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

### Definición

- En otras palabras, un matching es un conjunto de lados disjuntos.
- El problema a resolver será:

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König

### Definición

- En otras palabras, un matching es un conjunto de lados disjuntos.
- El problema a resolver será:
- Dado un grafo G bipartito, encontrar un matching en G con la mayor cantidad de lados posible.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König

### Definición

- En otras palabras, un matching es un conjunto de lados disjuntos.
- El problema a resolver será:
- Dado un grafo *G* bipartito, encontrar un matching en *G* con la mayor cantidad de lados posible.
- Un matching que tenga la mayor cantidad posible de lados se dice matching maximal

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar mate

encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas o

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Teoremas d

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Könin
Teorema de Könin

Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:

Muchos problemas de aplicación sólo requieren un grafo bipartito

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:
  - Muchos problemas de aplicación sólo requieren un grafo bipartito
  - El algoritmo para grafos no bipartitos se "apoya" en el algoritmo para bipartitos, así que hay que conocer este de todos modos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Feorema de Hall
Feorema del
Matrimonio de König
Feorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:
  - Muchos problemas de aplicación sólo requieren un grafo bipartito
  - 2 El algoritmo para grafos no bipartitos se "apoya" en el algoritmo para bipartitos, así que hay que conocer este de todos modos.
- Nota: la persona que generalizó el algoritmo que daremos para grafos bipartitos a grafos no bipartitos es....

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matriceon

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Feorema de Hall
Feorema del
Matrimonio de König
Feorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:
  - Muchos problemas de aplicación sólo requieren un grafo bipartito
  - 2 El algoritmo para grafos no bipartitos se "apoya" en el algoritmo para bipartitos, así que hay que conocer este de todos modos.
- Nota: la persona que generalizó el algoritmo que daremos para grafos bipartitos a grafos no bipartitos es....Edmonds.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Seobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Si bien hay problemas de matchings en grafos generales, nos concentraremos en matchings en grafos bipartitos, pues:
  - Muchos problemas de aplicación sólo requieren un grafo bipartito
  - 2 El algoritmo para grafos no bipartitos se "apoya" en el algoritmo para bipartitos, así que hay que conocer este de todos modos.
- Nota: la persona que generalizó el algoritmo que daremos para grafos bipartitos a grafos no bipartitos es....Edmonds. El algoritmo es mucho mas complicado y no lo daremos.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

### Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König

■ Ejemplo: *G* es un grafo cuyos vértices son tareas que hay que hacer y trabajadores que pueden hacer esas tareas.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Ejemplo: G es un grafo cuyos vértices son tareas que hay que hacer y trabajadores que pueden hacer esas tareas.
- Se une un trabajador con una tarea si el trabajador es capaz de hacer esa tarea.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

maximales a flujo Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König

- Ejemplo: G es un grafo cuyos vértices son tareas que hay que hacer y trabajadores que pueden hacer esas tareas.
- Se une un trabajador con una tarea si el trabajador es capaz de hacer esa tarea.
- Queremos encontrar la mayor cantidad posible de emparejamientos tarea/trabajador.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Eiemolo

ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Ejemplo: *G* es un grafo cuyos vértices son tareas que hay que hacer y trabajadores que pueden hacer esas tareas.
- Se une un trabajador con una tarea si el trabajador es capaz de hacer esa tarea.
- Queremos encontrar la mayor cantidad posible de emparejamientos tarea/trabajador.
- Es decir, un matching maximal.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema del Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König Sobre coloreo lateral

- Ejemplo: *G* es un grafo cuyos vértices son tareas que hay que hacer y trabajadores que pueden hacer esas tareas.
- Se une un trabajador con una tarea si el trabajador es capaz de hacer esa tarea.
- Queremos encontrar la mayor cantidad posible de emparejamientos tarea/trabajador.
- Es decir, un matching maximal.
- Mas adelante veremos una generalización de este problema, cuando pej asociamos a cada par tarea/trabajados un costo que puede cambiar dependiendo de cual trabajador hace cual tarea, y no sólo querramos un matching maximal sino un matching maximal de costo mínimo.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema

problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Köni
Teorema de König

La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:

#### Matchings

Daniel Penazz

Matching Definición y

problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:
  - Transformamos el grafo bipartito no dirigido en un network (el cual tendrás todas sus capacidades enteras)

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

matrices Teoremas de Hall y König

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:
  - Transformamos el grafo bipartito no dirigido en un network (el cual tendrás todas sus capacidades enteras)
  - Encontramos un flujo entero maximal en ese network, que sabemos por el teorema de la Integralidad que existe.

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kő

- La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:
  - Transformamos el grafo bipartito no dirigido en un network (el cual tendrás todas sus capacidades enteras)
  - Encontramos un flujo entero maximal en ese network, que sabemos por el teorema de la Integralidad que existe.
  - 3 A partir de ese flujo maximal obtenemos un matching maximal

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema del Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bioartifos

- La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:
  - Transformamos el grafo bipartito no dirigido en un network (el cual tendrás todas sus capacidades enteras)
  - 2 Encontramos un flujo entero maximal en ese network, que sabemos por el teorema de la Integralidad que existe.
  - 3 A partir de ese flujo maximal obtenemos un matching maximal
- Sabemos como hacer la segunda de esas cosas, pues si las capacidades son enteras cualquier especificación de Ford-Fulkerson como Edmonds-Karp o Dinitz lo encuentra.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema del Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafas binartins

- La solución original a este problema no es exactamente la que daremos, pero la daremos de la forma en que la daremos para aprovechar lo que hemos aprendido:
  - Transformamos el grafo bipartito no dirigido en un network (el cual tendrás todas sus capacidades enteras)
  - Encontramos un flujo entero maximal en ese network, que sabemos por el teorema de la Integralidad que existe.
  - 3 A partir de ese flujo maximal obtenemos un matching maximal
- Sabemos como hacer la segunda de esas cosas, pues si las capacidades son enteras cualquier especificación de Ford-Fulkerson como Edmonds-Karp o Dinitz lo encuentra.
- Veamos como hacer las otras dos.



#### Matchings

Daniel Penazz

Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo e

ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kõ

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del

viatrimonio de Konig Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings

Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network *N*, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por *s* y *t*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network *N*, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por *s* y *t*.
- Los lados del network sera la unión de todos los siguientes lados:

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfeccion y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network *N*, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por *s* y *t*.
- Los lados del network sera la unión de todos los siguientes lados:
  - $\overrightarrow{xy}$  para todo  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  $xy \in E(G)$

#### Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfeccion y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network *N*, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por *s* y *t*.
- Los lados del network sera la unión de todos los siguientes lados:
  - $\overrightarrow{xy}$  para todo  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  $xy \in E(G)$
  - $\overrightarrow{sx}$  para todo  $x \in X$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

matrices

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kőnig Teorema de König sobre coloreo lateral

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network *N*, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por *s* y *t*.
- Los lados del network sera la unión de todos los siguientes lados:
  - $\overrightarrow{xy}$  para todo  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  $xy \in E(G)$
  - $\overrightarrow{sx}$  para todo  $x \in X$
  - yt para todo  $y \in Y$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Sea *G* bipartito, y *X*, *Y* sus partes. Es decir:
- $V(G) = X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , y no hay lados entre vértices de X o entre vértices de Y.
  - Por lo tanto los únicos lados son entre algún vértice de X y algún vértice de Y.
- Para construir el network N, agregamos a los vértices dos vértices nuevos, que denotaremos por s y t.
- Los lados del network sera la unión de todos los siguientes lados:
  - $\overrightarrow{xy}$  para todo  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  $xy \in E(G)$
  - $\overrightarrow{sx}$  para todo  $x \in X$
  - yt para todo  $y \in Y$
- Con capacidad 1 en todos los lados

# Relación entre matchings maximales en *G* y flujos maximales enteros en *N*

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings

Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.

# Relación entre matchings maximales en *G* y flujos maximales enteros en *N*

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.
- Como la capacidad de todos los lados es 1, tenemos:

# Relación entre matchings maximales en *G* y flujos maximales enteros en *N*

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.
- Como la capacidad de todos los lados es 1, tenemos:
  - Si  $x \in X$ , como sólo hay un lado que entre a x (el  $\overrightarrow{sx}$ ) entonces  $in_f(x) = f(\overrightarrow{sx})$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.
- Como la capacidad de todos los lados es 1, tenemos:
  - Si  $x \in X$ , como sólo hay un lado que entre a x (el  $\overrightarrow{sx}$ ) entonces  $in_f(x) = f(\overrightarrow{sx})$ .
  - Como f es entero, y la capacidad de  $\overrightarrow{sx}$  es uno, entonces  $f(\overrightarrow{sx})$  es 1 o 0, y por lo de arriba, entonces  $in_f(x)$  es 1 o 0.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con staticios o restrictos o restri

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Feorema de Hall
Feorema del
Matrimonio de König
Feorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.
- Como la capacidad de todos los lados es 1, tenemos:
  - Si  $x \in X$ , como sólo hay un lado que entre a x (el  $\overrightarrow{sx}$ ) entonces  $in_f(x) = f(\overrightarrow{sx})$ .
  - Como f es entero, y la capacidad de  $\overrightarrow{sx}$  es uno, entonces  $f(\overrightarrow{sx})$  es 1 o 0, y por lo de arriba, entonces  $in_f(x)$  es 1 o 0.
  - Si un vértice  $x \in X$  como  $out_f(x) = in_f(x)$ , debe ser  $out_f(x)$  tambien 1 o 0.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un flujo *f* entero.
- Como la capacidad de todos los lados es 1, tenemos:
  - Si  $x \in X$ , como sólo hay un lado que entre a x (el  $\overrightarrow{sx}$ ) entonces  $in_f(x) = f(\overrightarrow{sx})$ .
  - Como f es entero, y la capacidad de  $\overrightarrow{sx}$  es uno, entonces  $f(\overrightarrow{sx})$  es 1 o 0, y por lo de arriba, entonces  $in_f(x)$  es 1 o 0.
  - Si un vértice  $x \in X$  como  $out_f(x) = in_f(x)$ , debe ser  $out_f(x)$  tambien 1 o 0.
  - Asi que si  $out_f(x) > 0$ , debe ser 1, y entonces, como f es entero, debe haber un único  $y \in Y$  con  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings Definición y problema

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König ■ Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .

#### Matchings

Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo f entero, entonces si tomamos:

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

Teoremas d Hall v Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo *f* entero, entonces si tomamos:
  - $W = \{x \in X : in_f(x) = 1\}$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo *f* entero, entonces si tomamos:
  - $W = \{x \in X : in_f(x) = 1\}$
  - $U = \{ y \in Y : out_f(y) = 1 \}$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el elegando con

matrices Teoremas de Hall v Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Teorema de König
aobre coloreo latera
de grafos bipartitos

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo f entero, entonces si tomamos:
  - $W = \{x \in X : in_f(x) = 1\}$
  - $U = \{y \in Y : out_f(y) = 1\}$
  - $F = \{xy \in E(G) : x \in W, y \in U : f(\overrightarrow{xy}) = 1\}$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo *f* entero, entonces si tomamos:

```
W = \{x \in X : in_f(x) = 1\}
```

■ 
$$U = \{y \in Y : out_f(y) = 1\}$$

$$F = \{xy \in E(G) : x \in W, y \in U : f(\overrightarrow{xy}) = 1\}$$

■ Entonces  $(W \cup U, F)$  es un subgrafo de G que es un matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con restrictor

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Teorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Un razonamiento similar, usando t, se puede hacer con los  $y \in Y$ : o bien  $out_f(y) = 0$ , o es 1, y en este último caso existe un único  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos que dado un flujo *f* entero, entonces si tomamos:
  - $W = \{x \in X : in_f(x) = 1\}$
  - $U = \{y \in Y : out_f(y) = 1\}$
  - $F = \{xy \in E(G) : x \in W, y \in U : f(\overrightarrow{xy}) = 1\}$
- Entonces  $(W \cup U, F)$  es un subgrafo de G que es un matching.
- Pues para cada  $x \in W$  hay un único  $y \in U$  con  $xy \in F$  y para cada  $y \in U$  hay un único  $x \in W$  con  $xy \in F$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Hall y Kőnig

Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Köni

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Es decir, podemos construir matchings a partir de flujos.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

#### Teoremas de Hall v Kőnig

Perieccion y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Es decir, podemos construir matchings a partir de flujos.
- Observemos que la cantidad de lados del matching será igual a la cantidad de  $x \in X$  con  $in_f(x) = 1$ ,

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Es decir, podemos construir matchings a partir de flujos.
- Observemos que la cantidad de lados del matching será igual a la cantidad de  $x \in X$  con  $in_f(x) = 1$ ,
- Pero esto es igual a  $out_f(s) = v(f)$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con problema con probl

#### Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Es decir, podemos construir matchings a partir de flujos.
- Observemos que la cantidad de lados del matching será igual a la cantidad de  $x \in X$  con  $in_f(x) = 1$ ,
- Pero esto es igual a  $out_f(s) = v(f)$ .
- Asi que la cantidad de lados del matching es igual al valor del flujo.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König

Viceversa, dado un matching, simplemente definimos f igual a 1 en los lados del matching, 0 en los otros lados  $\overrightarrow{xy}$ , y definimos  $f(\overrightarrow{sx}) = 1$  si x es un vértice del matching y  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$  si y es un vértices del matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Viceversa, dado un matching, simplemente definimos f igual a 1 en los lados del matching, 0 en los otros lados  $\overrightarrow{xy}$ , y definimos  $f(\overrightarrow{sx}) = 1$  si x es un vértice del matching y  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$  si y es un vértices del matching.
- Es trivial ver que *f* es flujo (facil: lo costruimos camino a camino con caminos de la forma *sxyt*)

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera

- Viceversa, dado un matching, simplemente definimos f igual a 1 en los lados del matching, 0 en los otros lados  $\overrightarrow{xy}$ , y definimos  $f(\overrightarrow{sx}) = 1$  si x es un vértice del matching y  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$  si y es un vértices del matching.
- Es trivial ver que *f* es flujo (facil: lo costruimos camino a camino con caminos de la forma *sxyt*)
- Y como antes, el valor de f es la cantidad de lados del matching

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Hall y König
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral

- Viceversa, dado un matching, simplemente definimos f igual a 1 en los lados del matching, 0 en los otros lados  $\overrightarrow{xy}$ , y definimos  $f(\overrightarrow{sx}) = 1$  si x es un vértice del matching y  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$  si y es un vértices del matching.
- Es trivial ver que f es flujo (facil: lo costruimos camino a camino con caminos de la forma sxyt)
- Y como antes, el valor de f es la cantidad de lados del matching
- Por lo tanto flujos maximales enteros se corresponden con matching maximales.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matching: Definición y

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall y Kőnic

Perfección y

Teorema del Hall

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matching Definición v

Petinición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőni

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:
  - Construir el network asociado.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:
  - Construir el network asociado.
  - Encontrar flujo maximal entero f en el network. (como dijimos, pej Edmonds-Karp o Dinitz encuentran un flujo maximal entero si todas las capacidades son enteras)

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral
de grafis binartitos

- Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:
  - Construir el network asociado.
  - Encontrar flujo maximal entero f en el network. (como dijimos, pej Edmonds-Karp o Dinitz encuentran un flujo maximal entero si todas las capacidades son enteras)
  - Tomar como matching aquellos lados  $xy \operatorname{con} f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas Hall y Kőr

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bicartitos

- Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:
  - Construir el network asociado.
  - Encontrar flujo maximal entero f en el network. (como dijimos, pej Edmonds-Karp o Dinitz encuentran un flujo maximal entero si todas las capacidades son enteras)
  - Tomar como matching aquellos lados  $xy \operatorname{con} f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- En realidad, ya sea que se use Dinitz o Edmonds-Karp, la primera parte es siempre "con Dinitz".

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Perfección y
Completitud
Teorema del Hall
Teorema del
Matrimonio de Kö
Teorema de Köni

Con lo cual, para resolver el problema del matching maximal basta con:

- Construir el network asociado.
- Encontrar flujo maximal entero f en el network. (como dijimos, pej Edmonds-Karp o Dinitz encuentran un flujo maximal entero si todas las capacidades son enteras)
- Tomar como matching aquellos lados  $xy \operatorname{con} f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- En realidad, ya sea que se use Dinitz o Edmonds-Karp, la primera parte es siempre "con Dinitz".
- Lo pongo entre comillas porque ni siquiera usamos Dinitz, pero es equivalente.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Fiemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

Observemos que si hicieramos Dinitz, el primer network auxiliar tendría nivel 0 igual a {s}, nivel 1 igual a X, nivel 2 igual a Y y nivel 3 igual a {t}.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Observemos que si hicieramos Dinitz, el primer network auxiliar tendría nivel 0 igual a {s}, nivel 1 igual a X, nivel 2 igual a Y y nivel 3 igual a {t}.
- Todo camino aumentante en ese primer network auxiliar será de la forma sxyt con x ∈ X, y ∈ Y, y corresponderá a agregar xy al matching.

#### Matchings

Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

- Observemos que si hicieramos Dinitz, el primer network auxiliar tendría nivel 0 igual a  $\{s\}$ , nivel 1 igual a X, nivel 2 igual a Y y nivel 3 igual a  $\{t\}$ .
- Todo camino aumentante en ese primer network auxiliar será de la forma sxyt con  $x \in X$ ,  $y \in Y$ , y corresponderá a agregar xy al matching.
- Asi que la primera parte simplemente consiste en buscar un matching inicial agregando todos los lados que se pueda sin romper la condición de matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Observemos que si hicieramos Dinitz, el primer network auxiliar tendría nivel 0 igual a {s}, nivel 1 igual a X, nivel 2 igual a Y y nivel 3 igual a {t}.
- Todo camino aumentante en ese primer network auxiliar será de la forma sxyt con  $x \in X, y \in Y$ , y corresponderá a agregar xy al matching.
- Asi que la primera parte simplemente consiste en buscar un matching inicial agregando todos los lados que se pueda sin romper la condición de matching.
- Y esto es equivalente a correr Dinitz en el primer network auxiliar.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Observemos que si hicieramos Dinitz, el primer network auxiliar tendría nivel 0 igual a {s}, nivel 1 igual a X, nivel 2 igual a Y y nivel 3 igual a {t}.
- Todo camino aumentante en ese primer network auxiliar será de la forma sxyt con  $x \in X, y \in Y$ , y corresponderá a agregar xy al matching.
- Asi que la primera parte simplemente consiste en buscar un matching inicial agregando todos los lados que se pueda sin romper la condición de matching.
- Y esto es equivalente a correr Dinitz en el primer network auxiliar.
- Y luego de esa primera parte, se trata de ir extendiendo el matching inicial.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings

Definición y
problema

Reducción del

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Veamos un ejemplo. Pero antes hablemos un poco de cómo representaremos grafos bipartitos para estos problemas.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Veamos un ejemplo. Pero antes hablemos un poco de cómo representaremos grafos bipartitos para estos problemas.
- Sea *G* grafo bipartito con partes *X* e *Y*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Veamos un ejemplo. Pero antes hablemos un poco de cómo representaremos grafos bipartitos para estos problemas.
- Sea G grafo bipartito con partes X e Y.
- Si bien en general es mas eficiente representar la estructura de vecinos de un grafo usando una lista o un array de vécinos, en muchos de estos problemas en realidad estan muchos de los vértices de X unidos a muchos de los vértices de Y.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Perfección y
Completitud
Feorema de Hall
Feorema del
Matrimonio de König
Feorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Veamos un ejemplo. Pero antes hablemos un poco de cómo representaremos grafos bipartitos para estos problemas.
- Sea *G* grafo bipartito con partes *X* e *Y*.
- Si bien en general es mas eficiente representar la estructura de vecinos de un grafo usando una lista o un array de vécinos, en muchos de estos problemas en realidad estan muchos de los vértices de X unidos a muchos de los vértices de Y.
- Asi que en realidad en estos problemas es común usar una matriz de adyacencia en vez de una lista o array.

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matching:

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas d

Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kör

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Como *G* es bipartito, una matriz de adyacencia para *G*, va a "lucir" como:

 $A^t 0$ 

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

matrices
Teoremas de

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

■ Como *G* es bipartito, una matriz de adyacencia para *G*, va a "lucir" como:

 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^t & 0 \end{bmatrix}$ 

puesto que no hay lados entre vértices de X o vértices de Y.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Como *G* es bipartito, una matriz de adyacencia para *G*, va a "lucir" como:

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^t & 0 \end{bmatrix}$$

- puesto que no hay lados entre vértices de X o vértices de Y.
- Asi que en vez de dar toda la matriz de adyacencia se suele dar solamente A, cuyas filas representan elementos de X y cuyas columnas elementos de Y.

### Representación de un grafo bipartito

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ En el caso de un grafo sin pesos, las entradas son 1 o 0, indicando simplemente si *x* es vécino de *y* o no.

### Representación de un grafo bipartito

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perteccion y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- En el caso de un grafo sin pesos, las entradas son 1 o 0, indicando simplemente si *x* es vécino de *y* o no.
- En el caso de un grafo con pesos en los lados (que veremos mas adelante) se suele poner en la entrada (x, y) el peso del lado xy si existe un lado entre x e y, o bien  $\infty$  si no existe lado.

### Representación de un grafo bipartito

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- En el caso de un grafo sin pesos, las entradas son 1 o 0, indicando simplemente si *x* es vécino de *y* o no.
  - En el caso de un grafo con pesos en los lados (que veremos mas adelante) se suele poner en la entrada (x, y) el peso del lado xy si existe un lado entre x e y, o bien  $\infty$  si no existe lado.
  - Pej, podria ser una matriz asi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 & \infty & 4 \\ \infty & 5 & \infty & 7 \\ 4 & 7 & 4 & 8 \\ 9 & 4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos Veamos un ejemplo del algoritmo.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices


### Hall y Kőniç

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Kőnig

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Veamos un ejemplo del algoritmo.
- Sea *G* bipartito con  $X = \{A, B, C, D\}$ ,  $Y = \{I, II, III, IV\}$  dado por el siguiente grafo:



#### Matchings

### Eiemplo

- Veamos un ejemplo del algoritmo.
- Sea G bipartito con  $X = \{A, B, C, D\}, Y = \{I, II, III, IV\}$ dado por el siguiente grafo:
- Lo podemos representar por la matriz con filas A, B, C, D y columnas, I, II, III, IV:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Teoremas o

Perfección y

Teorema del Hall

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera Un matching inicial, simplemente mirando

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo


Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos Un matching inicial, simplemente mirando



#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Teoremas of Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Köni

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Un matching inicial, simplemente mirando se puede construir como *AI*, *BII*, *DIII*.



#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Teoremas of Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Ha

Matrimonio de Köni Teorema de König sobre coloreo latera ■ Un matching inicial, simplemente mirando se puede construir como AI, BII, DIII.



#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching


problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral ■ Un matching inicial, simplemente mirando se puede construir como *AI*, *BII*, *DIII*.



■ No podemos asignarle a *C* porque sus unicos vécinos son I y II, y ya estaban en el matching con A y B.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matching:
Definición y

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas d Hall v Kőnic

Hall y König

Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de Konig Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos En este ejemplo tan chico, es obvio como "arreglar" esto "a ojo", pero estamos queriendo ejemplificar el algoritmo, asi que sigamos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a fluios

#### Ejemplo Rehacier

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- En este ejemplo tan chico, es obvio como "arreglar" esto "a ojo", pero estamos queriendo ejemplificar el algoritmo, asi que sigamos.
- Supongamos que usamos Edmonds-Karp.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Fiemplo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y König
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral

- En este ejemplo tan chico, es obvio como "arreglar" esto "a ojo", pero estamos queriendo ejemplificar el algoritmo, asi que sigamos.
- Supongamos que usamos Edmonds-Karp.
- Recordemos que al construir la cola ibamos guardando tanto quien fue el vértice que pone al nuevo vértice en la cola, como el " $\epsilon(x)$ " que vamos teniendo hasta ese momento.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Teorema de gobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- En este ejemplo tan chico, es obvio como "arreglar" esto "a ojo", pero estamos queriendo ejemplificar el algoritmo, asi que sigamos.
- Supongamos que usamos Edmonds-Karp.
- Recordemos que al construir la cola ibamos guardando tanto quien fue el vértice que pone al nuevo vértice en la cola, como el " $\epsilon(x)$ " que vamos teniendo hasta ese momento.
- Pero en nuestro caso, como todas las capacidades son uno, esto último es irrelevante y no hace falta hacerlo.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnic

Perfección y

Teorema del Teorema del

Teorema de König sobre coloreo latera Asi que la cola empieza:

sC

S

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Hall y Kőn Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

Asi que la cola empieza:

Pues al estar A, B, D en el matching es lo mismo que decir que  $f(\overrightarrow{sA}) = f(\overrightarrow{sB}) = f(\overrightarrow{sD}) = 1$  asi que sólo queda C para enviarle flujo.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices


### Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Asi que la cola empieza:

S

Pues al estar A, B, D en el matching es lo mismo que decir que  $f(\overrightarrow{sA}) = f(\overrightarrow{sB}) = f(\overrightarrow{sD}) = 1$  asi que sólo queda C para enviarle flujo.



#### Matchings

Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchi maximales a flujo


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema de König sobre coloreo latera ■ C tiene vécinos a I, II



#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kör C tiene vécinos a I, II

Asi que la cola sigue:

sCIII sCC

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices


#### Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- C tiene vécinos a I, II
- Asi que la cola sigue:

Tanto I como II está en el matching, asi que f( Ît ) = f( Îlt ) = 1 y ninguno puede agregar a t a la cola.



#### Matchings

Daniel Penazz

Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kan

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Pero justamente, como están en el matching, ambos tienen un vértice en *X* con el cual están matcheados.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

#### Teoremas o Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König


- Pero justamente, como están en el matching, ambos tienen un vértice en *X* con el cual están matcheados.
- A en el caso de I, B en el caso de II.



#### Matchings

#### Eiemplo

- Pero justamente, como están en el matching, ambos tienen un vértice en X con el cual están matcheados.
- A en el caso de I. B en el caso de II.



Esto dice que f(AI) = f(BII) = 1 y por lo tanto I puede agregar a A backward y II puede agregar a B backward

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

# Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Pero justamente, como están en el matching, ambos tienen un vértice en *X* con el cual están matcheados.
- A en el caso de I, B en el caso de II.
- Esto dice que  $f(\overrightarrow{AI}) = f(\overrightarrow{BII}) = 1$  y por lo tanto I puede agregar a A backward y II puede agregar a B backward.
- La cola queda:

sCIIIAB sCCI-II-

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

#### Ejemplo


Rehaciendo e ejemplo con matrices

#### Teoremas d Hall v Kőnio

Perfección y Completitud

Teorema de Hall Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral



A tiene vecinos a I,III,IV.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőn Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kön

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- A tiene vecinos a I,III,IV.
- El primero ya está en la cola pero los otros dos no, asi que se agregan:

sCIIIAB IIIIV sCCI-II-A A

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching


Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőr

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos



- A tiene vecinos a I,III,IV.
- El primero ya está en la cola pero los otros dos no, asi que se agregan:
- B tiene a II, IV como vecinos,

#### Matchings

Eiemplo

- A tiene vecinos a I,III,IV.
- El primero ya está en la cola pero los otros dos no, asi que se agregan:

B tiene a II, IV como vecinos, ambos están, no se agrega nada.

#### Matchings

Penazz

### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos III forma parte del matching, lo que significa, como vimos en el caso de I,II, que sólo puede agregar (backwards) al vértice de X con el cual forma matching, en este caso, D:

> sCIIIAB III IV D sCCI-II-A AIII-

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema

problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

#### Ejemplo


Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera

■ III forma parte del matching, lo que significa, como vimos en el caso de I,II, que sólo puede agregar (backwards) al vértice de X con el cual forma matching, en este caso, D:

■ IV no forma parte del matching.



#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera
de grafos bipartitos

III forma parte del matching, lo que significa, como vimos en el caso de I,II, que sólo puede agregar (backwards) al vértice de X con el cual forma matching, en este caso, D:

- IV no forma parte del matching.
- Esto significa que  $f(\overrightarrow{IVt}) = 0$  y puede agregar a t a la cola, con lo que terminamos.

#### Matchings

Daniel Penazzi

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

III forma parte del matching, lo que significa, como vimos en el caso de I,II, que sólo puede agregar (backwards) al vértice de X con el cual forma matching, en este caso, D:

- IV no forma parte del matching.
- Esto significa que  $f(\overrightarrow{IVt}) = 0$  y puede agregar a t a la cola, con lo que terminamos.

Y reconstruimos el camino como sC IA IVt



#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchii

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Teoremas d

Perfección y

Teorema de Hal

Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos



#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kön

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### ■ sC IA IVt

Cambiando el flujo de acuerdo con ese camino, vemos que tenemos que sumarle 1 a los lados ⇒ C, CI, AIV, IVt y restarle 1 al lado AI.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching

#### Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kön

■ sC IA IVt

- Cambiando el flujo de acuerdo con ese camino, vemos que tenemos que sumarle 1 a los lados sC, CI, AIV, IVt y restarle 1 al lado AI.
- Esto ¿cómo se traduce en términos del matching?

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

#### Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas o Hall y Kőni Perfección y

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

# ■ sC IA IVt

- Cambiando el flujo de acuerdo con ese camino, vemos que tenemos que sumarle 1 a los lados sC, CI, AIV, IVt y restarle 1 al lado AI.
- Esto ¿cómo se traduce en términos del matching?
- $\overrightarrow{sC}$ ,  $\overrightarrow{IVt}$  son sólo auxiliares de la construcción que hemos hecho.

## Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

# Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kö
Teorema de König

# ■ sC IA IVt

- Cambiando el flujo de acuerdo con ese camino, vemos que tenemos que sumarle 1 a los lados ⇒ → → → → → → → → velos de la lado → dí.
- Esto ¿cómo se traduce en términos del matching?
- sc, IVt son sólo auxiliares de la construcción que hemos hecho.
- Asi que lo importante es que le sumamos 1 a  $\overrightarrow{CI}$ ,  $\overrightarrow{AIV}$  y restamos 1 al lado  $\overrightarrow{AI}$ .

## Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

# Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

# ■ sC IA IVt

- Cambiando el flujo de acuerdo con ese camino, vemos que tenemos que sumarle 1 a los lados ⇒ C, CI, AIV, IVt y restarle 1 al lado AI.
- Esto ¿cómo se traduce en términos del matching?
- $\overrightarrow{sC}$ ,  $\overrightarrow{IVt}$  son sólo auxiliares de la construcción que hemos hecho.
- Asi que lo importante es que le sumamos 1 a  $\overrightarrow{CI}$ ,  $\overrightarrow{AIV}$  y restamos 1 al lado  $\overrightarrow{AI}$ .
- Que significa que agregamos *CI*, *AIV* al matching y eliminamos el lado *AI* del matching.

# Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

#### Ejemplo


Rehaciendo e ejemplo con matrices

# Hall y Kőni

Perfección y Completitud

Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos ■ Agregamos *CI*, *AIV* al matching:



# Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

#### Ejemplo


Rehaciendo e ejemplo con matrices

# Hall y Kőni

Perfección y Completitud

Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera ■ Agregamos *CI*, *AIV* al matching:



#### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

# Teoremas o

Perfección y Completitud Teorema de Ha

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Agregamos CI, AIV al matching y eliminamos el lado AI del matching:



#### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos


#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

#### Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de H

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Agregamos CI, AIV al matching y eliminamos el lado AI del matching:



#### Matchings

Daniel Penazz

# Matching


problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König Agregamos CI, AIV al matching y eliminamos el lado AI del matching:



■ El matching queda AIV, BII, CI, DIII y claramente es maximal.

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

Penazz

# Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a fluios

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall v Kőnig

Perfección y
Completitud

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig

Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Köni

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $sx_{i_1}y_{i_1} \xrightarrow{x_{i_2}} y_{i_2} \xrightarrow{x_{i_3}} \dots y_{i_{r-1}} \xrightarrow{x_{i_r}} y_{i_r} t$ .

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

# Eiemplo

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $SX_{i_1}Y_{i_1}X_{i_2}Y_{i_2}X_{i_2}....Y_{i_{r-1}}X_{i_r}Y_{i_r}t.$
- Por eso se le suele llamar un camino alternado (porque alterna entre elementos de X y elementos de Y)

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $sx_{i_1}y_{i_1} \xrightarrow{x_{i_2}} y_{i_2} \xrightarrow{x_{i_3}} .... y_{i_{r-1}} \xrightarrow{x_{i_r}} y_{i_r} t$ .
- Por eso se le suele llamar un camino alternado (porque alterna entre elementos de *X* y elementos de *Y*)
- Y respecto del matching significará que:

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Ke

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $sx_{i_1}y_{i_1}^{\leftarrow}x_{i_2}y_{i_2}^{\leftarrow}x_{i_3}^{\leftarrow}....y_{i_{r-1}}^{\leftarrow}x_{i_r}y_{i_r}^{\leftarrow}t$ .
- Por eso se le suele llamar un camino alternado (porque alterna entre elementos de *X* y elementos de *Y*)
- Y respecto del matching significará que:
  - 1 Se agregarán al matching los lados  $x_{i_j}y_{i_j}$ , j=1,2,...,r

# Estructura general de los caminos aumentantes

# Matchings

Eiemplo

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $SX_{i_1}Y_{i_1}X_{i_2}Y_{i_2}X_{i_3}....Y_{i_{r-1}}X_{i_r}Y_{i_r}t.$
- Por eso se le suele llamar un camino alternado (porque alterna entre elementos de X y elementos de Y)
- Y respecto del matching significará que:
  - 1 Se agregarán al matching los lados  $x_i, y_i, j = 1, 2, ..., r$
  - 2 Se borrarán del matching los lados  $x_i, y_{i-1}, j = 2, ..., r$

# Estructura general de los caminos aumentantes

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König sobre coloreo lateral

- Algo similar a esto, por la estructura del grafo, es algo que va a pasar siempre:
- El camino aumentante será de la forma  $sx_{i_1}y_{i_1} \xrightarrow{x_{i_2}} y_{i_2} \xrightarrow{x_{i_3}} ...y_{i_{r-1}} \xrightarrow{x_{i_r}} y_{i_r} t$ .
- Por eso se le suele llamar un camino alternado (porque alterna entre elementos de X y elementos de Y)
- Y respecto del matching significará que:
  - 1 Se agregarán al matching los lados  $x_{i_i}y_{i_i}$ , j = 1, 2, ..., r
  - 2 Se borrarán del matching los lados  $x_{i_j} y_{i_{j-1}}, j = 2, ..., r$
- Como se agregan r lados y se borran r-1, el matching aumenta en un lado y se continua de esta forma hasta que no se pueda seguir mas.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

Una cosa que se puede hacer al hacerlo a mano es ir escribiendo en la misma matriz tanto el matching (marcando por ejemplo con un circulo las entradas) como las etiquetas de la cola, si se usa Edmonds-Karp, en cada fila o columna correspondiente.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig
Perfección y Completitud
Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König sobre coloreo lateral

- Una cosa que se puede hacer al hacerlo a mano es ir escribiendo en la misma matriz tanto el matching (marcando por ejemplo con un circulo las entradas) como las etiquetas de la cola, si se usa Edmonds-Karp, en cada fila o columna correspondiente.
- En vez de marcar con un circulo, aca le cambiare el color a los elementos del matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera

- Una cosa que se puede hacer al hacerlo a mano es ir escribiendo en la misma matriz tanto el matching (marcando por ejemplo con un circulo las entradas) como las etiquetas de la cola, si se usa Edmonds-Karp, en cada fila o columna correspondiente.
- En vez de marcar con un circulo, aca le cambiare el color a los elementos del matching.
- Matriz era:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Fiemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo lateral

- Una cosa que se puede hacer al hacerlo a mano es ir escribiendo en la misma matriz tanto el matching (marcando por ejemplo con un circulo las entradas) como las etiquetas de la cola, si se usa Edmonds-Karp, en cada fila o columna correspondiente.
- En vez de marcar con un circulo, aca le cambiare el color a los elementos del matching.
- Matching inicial AI,BII,DIII:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching manales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

# Teoremas d

Hall y Kőnig
Perfección y

Teorema de Hall Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall v Kőnig

Perfección y

Teorema del Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

# Matchings

eiemplo con

Rehaciendo el matrices

Ahora empezamos la cola, marcando con una "s" las filas no matcheadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

Recorremos esa fila, buscanco vecinos, es decir, "1".

# Matchings

Rehaciendo el eiemplo con

matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

- Recorremos esa fila, buscanco vecinos, es decir, "1".
- Encontramos las columnas I, II.

# Matchings

Daniel Penazz

# Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

# Teoremas Hall y Kőr

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Sobre coloreo latera

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

- Recorremos esa fila, buscanco vecinos, es decir, "1".
- Encontramos las columnas *I*, *II*.
- Esto es lo mismo que antes cuando poniamos:

# Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

matrices
Teoremas

Hall y Kőni Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera
de grafos bipartitos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

- Recorremos esa fila, buscanco vecinos, es decir, "1".
- Encontramos las columnas I, II.
- Esto es lo mismo que antes cuando poniamos:

# Matchings

Rehaciendo el eiemplo con matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

- Recorremos esa fila, buscanco vecinos, es decir, "1".
- Encontramos las columnas I, II.
- Esto es lo mismo que antes cuando poniamos:
- Pero en esa cola, marcabamos con una C a I,II. ¿Cómo hacemos ahora?

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchi maximales a flujo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas o

Perfección y

Teorema de Ha

Teorema del

Teorema de König sobre coloreo latera

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

## Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos Ejemplo

maximales a fluj Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Hall y Kőn Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera

■ Simplemente marcamos las columnas I y II con "C"

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

En la siguiente etapa de la cola, mirabamos ambos vértices I,II, veiamos que no podiamos llegar a t, pero podiamos devolver flujo.

## Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

# Hall y Kőr Perfección y

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera
de grafos bipartitos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C \quad C$$

- En la siguiente etapa de la cola, mirabamos ambos vértices I,II, veiamos que no podiamos llegar a t, pero podiamos devolver flujo.
- En la matriz es equivalente a revisar la columna correspondiente y ver si hay "1" marcado o no.

## Matchings

Daniel Penazz

Matching

Definición y
problema

Reducción d

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

$$C \quad C$$

- En la siguiente etapa de la cola, mirabamos ambos vértices I,II, veiamos que no podiamos llegar a t, pero podiamos devolver flujo.
- En la matriz es equivalente a revisar la columna correspondiente y ver si hay "1" marcado o no.
- Si no hay, es porque la columna no forma parte del matching y podemos extender el matching.

# Matchings

Daniel Penazz

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo

eiemplo con

matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kő

- En la siguiente etapa de la cola, mirabamos ambos vértices I,II, veiamos que no podiamos llegar a t, pero podiamos devolver flujo.
- En la matriz es equivalente a revisar la columna correspondiente y ver si hay "1" marcado o no.
- Si no hay, es porque la columna no forma parte del matching y podemos extender el matching.
- Si hay un "1" marcado, podemos agregar la fila donde esta ese 1 a la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Fiemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Kônio

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching: Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola. Previamente lo hicimos asi:

> sCIIIAB sCCI-II-

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kön

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola. Ahora:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

#### Matchings

Rehaciendo el eiemplo con matrices

En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola. Ahora:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} s$$

#### Matchings

Rehaciendo el eiemplo con matrices

En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola. Ahora:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C \end{matrix}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kör En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola. Ahora:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C \end{matrix}$$

Ahora revisamos esas dos filas, buscando 1s y etiqueteando las colummnas correspondientes, si no estan ya etiqueteadas. (pues si lo estan, es que ya han sido puestas en la cola):

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kön

- En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola.
- Ahora revisamos esas dos filas, buscando 1s y etiqueteando las colummnas correspondientes, si no estan ya etiqueteadas. (pues si lo estan, es que ya han sido puestas en la cola):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C \end{matrix}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Könio
Teorema de Könio

- En este caso en las dos columnas hay 1 marcados, asi que agregamos las filas correspondientes a la cola.
- Ahora revisamos esas dos filas, buscando 1s y etiqueteando las colummnas correspondientes, si no estan ya etiqueteadas. (pues si lo estan, es que ya han sido puestas en la cola):

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

> Teorema de Hall Teorema del

viatrimonio de Konig Feorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos La columna IV ha sido etiqueteada y no tiene 1 marcados.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{I}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo laterai

La columna IV ha sido etiqueteada y no tiene 1 marcados.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

Podemos extender el matching entonces.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos La columna IV ha sido etiqueteada y no tiene 1 marcados.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C & A & A \end{matrix}$$

- Podemos extender el matching entonces.
- Nos fijamos en la etiqueta que tiene la columna "libre" ,
   A en este caso.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafes hiportifico La columna IV ha sido etiqueteada y no tiene 1 marcados.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C & A & A \end{matrix}$$

- Podemos extender el matching entonces.
- Nos fijamos en la etiqueta que tiene la columna "libre" ,
   A en este caso.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

ejemplo con matrices

#### Hall y Kői Perfección y

Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kön

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} H$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

Esto representa la etiqueta en la cola que dice quien lo puso en la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el

ejemplo con

matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

- Esto representa la etiqueta en la cola que dice quien lo puso en la cola.
- Por lo que el lado *AIV* formará parte del camino y por lo tanto mandaremos flujo por el.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

- Esto representa la etiqueta en la cola que dice quien lo puso en la cola.
- Por lo que el lado *AIV* formará parte del camino y por lo tanto mandaremos flujo por el.
- Es decir, agregaremos *AIV* al matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall v Kőnig

Hall y Konig

Perfección y

Teorema de Hall

Matrimonio de Kön Teorema de König sobre coloreo latera

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Agregamos AIV al matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de

Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall

Matrimonio de Konig Teorema de König sobre coloreo latera

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Agregamos AIV al matching.

#### Matchings

eiemplo con

Rehaciendo el matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.
- Borramos el "otro" 1, que podemos ver por la etiqueta del costado.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.
- Borramos el "otro" 1, que podemos ver por la etiqueta del costado.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C & A & A \end{matrix}$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.
- Borramos el "otro" 1, que podemos ver por la etiqueta del costado.
- Esto deja libre la columna I, asi que miramos su etiqueta, C.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Fiemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ s \\ C & C & A & A \end{matrix}$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.
- Borramos el "otro" 1, que podemos ver por la etiqueta del costado.
- Esto deja libre la columna I, asi que miramos su etiqueta, C.
- Agregamos el 1 correspondiente al matching y listo.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Fiemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} I$$

$$C \quad C \quad A \quad A$$

- Agregamos AIV al matching.
- Esto hace que la fila A tenga ahora dos 1 marcados.
- Borramos el "otro" 1, que podemos ver por la etiqueta del costado.
- Esto deja libre la columna I, asi que miramos su etiqueta, C.
- Agregamos el 1 correspondiente al matching y listo.

#### Matchings

Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo Fiemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas o

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Veremos mas ejemplos la clase que viene.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

- Veremos mas ejemplos la clase que viene.
- Pero la idea básica es esa: construir un matching inicial, luego para extenderlo en cada caso vamos revisando filas etiqueteadas, etiqueteando las columnas donde hay 1s, y luego miramos columnas etiqueteadas, mirando si hay 1s marcados. Si los hay, etiqueteamos las filas correspondientes, y si no, terminamos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices Teoremas d Hall y Kőnig

- Veremos mas ejemplos la clase que viene.
- Pero la idea básica es esa: construir un matching inicial, luego para extenderlo en cada caso vamos revisando filas etiqueteadas, etiqueteando las columnas donde hay 1s, y luego miramos columnas etiqueteadas, mirando si hay 1s marcados. Si los hay, etiqueteamos las filas correspondientes, y si no, terminamos.
- Si tenemos una columna libre, le miramos la etiqueta, agregamos el 1 correspondiente al matching, liberamos el "otro"1, esto deja una columa libre, repetimos hasta llegar a una fila marcada con "s", con lo cual habremos extendido el matching en un lado

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Feoremas c

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Veremos mas ejemplos la clase que viene.
- Pero la idea básica es esa: construir un matching inicial, luego para extenderlo en cada caso vamos revisando filas etiqueteadas, etiqueteando las columnas donde hay 1s, y luego miramos columnas etiqueteadas, mirando si hay 1s marcados. Si los hay, etiqueteamos las filas correspondientes, y si no, terminamos.
- Si tenemos una columna libre, le miramos la etiqueta, agregamos el 1 correspondiente al matching, liberamos el "otro"1, esto deja una columa libre, repetimos hasta llegar a una fila marcada con "s", con lo cual habremos extendido el matching en un lado
- Seguimos hasta que no podemos mas.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehariendo el

ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

- Veremos mas ejemplos la clase que viene.
- Pero la idea básica es esa: construir un matching inicial, luego para extenderlo en cada caso vamos revisando filas etiqueteadas, etiqueteando las columnas donde hay 1s, y luego miramos columnas etiqueteadas, mirando si hay 1s marcados. Si los hay, etiqueteamos las filas correspondientes, y si no, terminamos.
- Si tenemos una columna libre, le miramos la etiqueta, agregamos el 1 correspondiente al matching, liberamos el "otro"1, esto deja una columa libre, repetimos hasta llegar a una fila marcada con "s", con lo cual habremos extendido el matching en un lado
- Seguimos hasta que no podemos mas.
- En el ejemplo terminamos matcheando todas las filas, pero no siempre sucederá eso.

#### Matchings

Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Problemas relacionados con el de matching maximal son:

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

### Teoremas o

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Ka

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Problemas relacionados con el de matching maximal son:
  - ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices?

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

problema A Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig Perfección y

Completitud Teorema de Hall Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Problemas relacionados con el de matching maximal son:
  - 1 ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices?
    - (Es decir, que el conjunto de vértices del matching sea igual al conjunto de vértices de *G*)

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de

Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

ejemplo con matrices

Perfección y
Completitud
Teorema de Ha

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Problemas relacionados con el de matching maximal son:
  - ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices?
    - (Es decir, que el conjunto de vértices del matching sea igual al conjunto de vértices de G)
    - Un matching que cubra todos los vértices se dice perfecto

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Teoremas de

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kön Teorema de König

- Problemas relacionados con el de matching maximal son:
  - 1 ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices?
    - (Es decir, que el conjunto de vértices del matching sea igual al conjunto de vértices de *G*)
    - Un matching que cubra todos los vértices se dice perfecto
  - ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices de una de las partes del grafo?

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

- Problemas relacionados con el de matching maximal son:
  - 1 ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices?
    - (Es decir, que el conjunto de vértices del matching sea igual al conjunto de vértices de *G*)
    - Un matching que cubra todos los vértices se dice perfecto
  - ¿Existe un matching que "cubra" todos los vértices de una de las partes del grafo?
    - Pej. si cubre todos los vértices de X, se dice que es completo sobre X, o completo de X a Y.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

### Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonia de Kā

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Si X e Y son las partes del grafo es obvio que una condición necesaria para que exista un matching perfecto es que |X| = |Y|.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con patricios

# Hall y Kőniç

- Si X e Y son las partes del grafo es obvio que una condición necesaria para que exista un matching perfecto es que |X| = |Y|.
- Tambien es obvio que una condición necesaria para que un matching sea completo sobre una de las partes, pej X, es que  $|X| \le |Y|$ , porque si vamos a cubrir todos los vértices de X, necesitamos para cada uno de ellos un vértice en Y correspondiente.

#### Matchings

### Perfección y Completitud

- Si X e Y son las partes del grafo es obvio que una condición necesaria para que exista un matching perfecto es que |X| = |Y|.
- Tambien es obvio que una condición necesaria para que un matching sea completo sobre una de las partes, pej X, es que  $|X| \leq |Y|$ , porque si vamos a cubrir todos los vértices de X, necesitamos para cada uno de ellos un vértice en Y correspondiente.
- Obviamente, un matching completo sobre X v completo sobre Y es perfecto.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo lateral

- Si X e Y son las partes del grafo es obvio que una condición necesaria para que exista un matching perfecto es que |X| = |Y|.
- Tambien es obvio que una condición necesaria para que un matching sea completo sobre una de las partes, pej X, es que  $|X| \le |Y|$ , porque si vamos a cubrir todos los vértices de X, necesitamos para cada uno de ellos un vértice en Y correspondiente.
- Obviamente, un matching completo sobre X y completo sobre Y es perfecto.
- Ademas, si |X| = |Y|, cualquier matching completo, sobre X o Y, es perfecto.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Pej, si tenemos tareas y trabajadores que hagan las tareas, un matching perfecto es un matching en el cual todas las tareas se hacen y todos los trabajadores tienen un trabajo.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

#### Teoremas de Hall y Kőnig

- Pej, si tenemos tareas y trabajadores que hagan las tareas, un matching perfecto es un matching en el cual todas las tareas se hacen y todos los trabajadores tienen un trabajo.
- Un matching completo sobre los trabajadores es un matching tal que ningún trabajador queda sin empleo, pero podria quedar alguna tarea sin realizar.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchiny
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Pej, si tenemos tareas y trabajadores que hagan las tareas, un matching perfecto es un matching en el cual todas las tareas se hacen y todos los trabajadores tienen un trabajo.
- Un matching completo sobre los trabajadores es un matching tal que ningún trabajador queda sin empleo, pero podria quedar alguna tarea sin realizar.
- Un matching completo sobre las tareas es un matching tal que todas las tareas se realizan pero puede quedar algún trabajador sin empleo.

### Matchings

Daniel Penazz

Matching: Definición y

problema

Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Observar que no podemos elegir entre tener un matching completo sobre los trabajadores o tener uno completo sobre las tareas, pues hay condiciones estructurales que nos pueden impedirlo:

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchin
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall v Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera

- Observar que no podemos elegir entre tener un matching completo sobre los trabajadores o tener uno completo sobre las tareas, pues hay condiciones estructurales que nos pueden impedirlo:
  - si la cantidad de trabajadores es mayor que la cantidad de tareas, no puede haber un completo sobre los trabajadores

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Observar que no podemos elegir entre tener un matching completo sobre los trabajadores o tener uno completo sobre las tareas, pues hay condiciones estructurales que nos pueden impedirlo:
  - si la cantidad de trabajadores es mayor que la cantidad de tareas, no puede haber un completo sobre los trabajadores
  - si la cantidad de tareas es mayor que la cantidad de trabajadores, no puede haber un completo sobre las tareas

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Observar que no podemos elegir entre tener un matching completo sobre los trabajadores o tener uno completo sobre las tareas, pues hay condiciones estructurales que nos pueden impedirlo:
  - si la cantidad de trabajadores es mayor que la cantidad de tareas, no puede haber un completo sobre los trabajadores
  - si la cantidad de tareas es mayor que la cantidad de trabajadores, no puede haber un completo sobre las tareas
  - mientras que si la cantidad de trabajadores y tareas son iguales, todo completo sobre las tareas será perfecto y completo sobre los trabajadores.

### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Eiemplo

Ejemplo

Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

# Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Ahora bien, aunque la cantidad sea igual, podria suceder que no exista un matching perfecto, o en el caso de no ser iguales, que no exista un completo sobre ninguna de las 2 partes.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

ejemplo con matrices

Hall y Kőnig Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera

- Ahora bien, aunque la cantidad sea igual, podria suceder que no exista un matching perfecto, o en el caso de no ser iguales, que no exista un completo sobre ninguna de las 2 partes.
- Por ejemplo, si tenemos 2 tareas A y B y 10 trabajadores, pero ninguno de ellos puede hacer la tarea B, entonces no puede haber un matching completo sobre las tareas. (ni sobre los trabajadores)

### Matchings

Perfección y Completitud

- Ahora bien, aunque la cantidad sea igual, podria suceder que no exista un matching perfecto, o en el caso de no ser iguales, que no exista un completo sobre ninguna de las 2 partes.
- Por ejemplo, si tenemos 2 tareas A y B y 10 trabajadores, pero ninguno de ellos puede hacer la tarea B, entonces no puede haber un matching completo sobre las tareas. (ni sobre los trabajadores)
- Para resolver estos problemas simplemente hallamos un matching maximal y chequeamos si es completo o perfecto.

### Matchings

Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kör

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Pero ademas se pueden probar cosas teóricas que se usan bastante.

### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

ejemplo con matrices

### Hall y Kön Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bioartitos

- Pero ademas se pueden probar cosas teóricas que se usan bastante.
- Vimos que la condición  $|X| \le |Y|$  es necesaria para que exista un matching completo sobre X, pero con el ejemplo anterior vimos que no es suficiente.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre colorporo lateral

- Pero ademas se pueden probar cosas teóricas que se usan bastante.
- Vimos que la condición  $|X| \le |Y|$  es necesaria para que exista un matching completo sobre X, pero con el ejemplo anterior vimos que no es suficiente.
- Esto es porque no es suficiente que la cardinalidad de X sea menor que la de Y, sino que necesitamos que existan suficientes vecinos para los elementos de X.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Pero ademas se pueden probar cosas teóricas que se usan bastante.
- Vimos que la condición  $|X| \le |Y|$  es necesaria para que exista un matching completo sobre X, pero con el ejemplo anterior vimos que no es suficiente.
- Esto es porque no es suficiente que la cardinalidad de X sea menor que la de Y, sino que necesitamos que existan suficientes vecinos para los elementos de X.
- En el ejemplo anterior, *B* no tenia ningún vecino.

### Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Pero aún si todos los vértices tienen vecinos, podria no haber un matching completo.

### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Pero aún si todos los vértices tienen vecinos, podria no haber un matching completo.
- Por ejemplo, supongamos que tenemos  $X = \{A, B, C, D, E\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  y lados  $E = \{A1, A4, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C5, D1, D4, D5, E4, E5\}.$

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

# Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Pero aún si todos los vértices tienen vecinos, podria no haber un matching completo.
- Por ejemplo, supongamos que tenemos  $X = \{A, B, C, D, E\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  y lados  $E = \{A1, A4, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C5, D1, D4, D5, E4, E5\}.$
- Si queremos encontrar un matching completo sobre X no podriamos.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo lateral de grafes hieratties

- Pero aún si todos los vértices tienen vecinos, podria no haber un matching completo.
- Por ejemplo, supongamos que tenemos  $X = \{A, B, C, D, E\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  y lados  $E = \{A1, A4, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C5, D1, D4, D5, E4, E5\}.$
- Si queremos encontrar un matching completo sobre X no podriamos.
- Analizemos rapidamente porqué:

# Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchi maximales a flujo

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőni

# Perfección y Completitud

Teorema de Hall Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Miremos el subconjunto  $S = \{A, C, D, E\}$ .

### Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

> Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Miremos el subconjunto  $S = \{A, C, D, E\}$ .
- La unión de todos los vécinos de los vértices de S es  $\{1,4,5\}$ . (E=

```
\{A1, A4, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C5, D1, D4, D5, E4, E5\})
```

### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo ejemplo cor matrices

# Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Miremos el subconjunto  $S = \{A, C, D, E\}$ .
- La unión de todos los vécinos de los vértices de *S* es {1,4,5}.
- Por lo tanto no hay suficiente cantidad de vécinos para el conjunto S, lo cual dice que S no puede ser cubierto, mucho menos X.

### Matchings

Daniel Penazz

### Matchings

Definición y problema Reducción del problema de encontrar match maximales a fluj Eiemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kön Teorema de König ■ Dado un subconjunto *S* de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Dado un subconjunto S de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

■ Si hubiese un matching completo sobre X, y  $S \subseteq X$ , tendriamos que restringiendo el matching a S deberiamos tener al menos |S| vécinos de los elementos de S.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőni
Perfección y
Completitud

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos Dado un subconjunto S de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

- Si hubiese un matching completo sobre X, y  $S \subseteq X$ , tendriamos que restringiendo el matching a S deberiamos tener al menos |S| vécinos de los elementos de S.
- $\blacksquare$  Y esos vecinos estan todos en  $\Gamma(S)$ .

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas o Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kör
Teorema de König

Dado un subconjunto S de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

- Si hubiese un matching completo sobre X, y  $S \subseteq X$ , tendriamos que restringiendo el matching a S deberiamos tener al menos |S| vécinos de los elementos de S.
- **Y** esos vecinos estan todos en  $\Gamma(S)$ .
- Por lo tanto una condición necesaria para que exista matching completo sobre |X| es que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ .

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo latera de grafeo bisostitos

Dado un subconjunto S de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

- Si hubiese un matching completo sobre X, y  $S \subseteq X$ , tendriamos que restringiendo el matching a S deberiamos tener al menos |S| vécinos de los elementos de S.
- **Y** esos vecinos estan todos en  $\Gamma(S)$ .
- Por lo tanto una condición necesaria para que exista matching completo sobre |X| es que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ .
- Esto se llama la condición de Hall.

# Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos ■ Dado un subconjunto *S* de vértices definimos

$$\Gamma(S) = \cup_{x \in S} \Gamma(x) = \{z : \exists x \in S : xz \in E\}$$

- Si hubiese un matching completo sobre X, y  $S \subseteq X$ , tendriamos que restringiendo el matching a S deberiamos tener al menos |S| vécinos de los elementos de S.
- **Y** esos vecinos estan todos en  $\Gamma(S)$ .
- Por lo tanto una condición necesaria para que exista matching completo sobre |X| es que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ .
- Esto se llama la condición de Hall.
- Y resulta que no sólo es necesaria sino suficiente.

# Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

# Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig

Perfección y

### Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kõ

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

# Teorema (Hall)

Si G es un grafo bipartito con partes X e Y y  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ , entonces existe un matching completo sobre X.

### Matchings

Daniel Penazz

### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo cor

Teoremas de

Perfección y

Teorema de Hall

Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

# Teorema (Hall)

Si G es un grafo bipartito con partes X e Y y  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ , entonces existe un matching completo sobre X.

Prueba:

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas Hall y Kőn

Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

# Teorema (Hall)

Si G es un grafo bipartito con partes X e Y y  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ , entonces existe un matching completo sobre X.

- Prueba:
- Supongamos que el teorema no es cierto, es decir que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$  pero que no existe un matching completo sobre X.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchiny
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kőnig sobre coloreo latera

# Teorema (Hall)

Si G es un grafo bipartito con partes X e Y y  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ , entonces existe un matching completo sobre X.

- Prueba:
- Supongamos que el teorema no es cierto, es decir que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$  pero que no existe un matching completo sobre X.
- Probaremos que el hecho de que no exista un matching completo sobre X implica que existe  $S \subseteq X$  con  $|S| > |\Gamma(S)|$  lo cual contradice la hipotesis.

### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y

Teorema de Hall

Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos La prueba de que existe tal S la haremos analizando el algoritmo que dimos antes.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Fiemplo

ejemplo con matrices Teoremas de

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- La prueba de que existe tal *S* la haremos analizando el algoritmo que dimos antes.
- Como estamos suponiendo que no existe matching completo sobre X, entonces corriendo el algoritmo para hallar matching maximal, usando Edmonds-Karp, obtenemos un matching maximal que NO cubre todos los vértices de X.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema del Matrimonio de König Teorema del König sobre colorco lateral de expete bisperativa.

- La prueba de que existe tal *S* la haremos analizando el algoritmo que dimos antes.
- Como estamos suponiendo que no existe matching completo sobre X, entonces corriendo el algoritmo para hallar matching maximal, usando Edmonds-Karp, obtenemos un matching maximal que NO cubre todos los vértices de X.
- Sea  $S_0$  aquellos vértices de X que, al terminar el algoritmo, han quedado sin cubrir. ( $S_0 \neq \emptyset$  porque estamos suponiendo que no hemos cubierto a todos los vértices de X)

# Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y

Teorema de Hall

Tooromo dol

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Entonces  $x \in S_0$  si y solo si no existe  $y \in Y$  tal que xy sea lado del matching.

### Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y

### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Entonces  $x \in S_0$  si y solo si no existe  $y \in Y$  tal que xy sea lado del matching.
- Esto significa que  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y, donde f es el flujo maximal encontrado.

### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

<sub>matrices</sub> Teoremas de

Perfección y Completitud

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera

- Entonces  $x \in S_0$  si y solo si no existe  $y \in Y$  tal que xy sea lado del matching.
- Esto significa que  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y, donde f es el flujo maximal encontrado.
- Por lo tanto  $out_f(x) = 0$  para todo  $x \in S_0$ .

### Matchings

Daniel Penazz

# Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

# Hall y Kőr

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Entonces  $x \in S_0$  si y solo si no existe  $y \in Y$  tal que xy sea lado del matching.
- Esto significa que  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y, donde f es el flujo maximal encontrado.
- Por lo tanto  $out_f(x) = 0$  para todo  $x \in S_0$ .
- Como f es flujo, eso significa que  $in_f(x) = 0$  para todo  $x \in S_0$ .

# Matchings

Teorema de Hall

■ Viceversa, supongamos que x es un vértice tal que  $in_f(x) = 0.$ 

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Completitud

#### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Viceversa, supongamos que x es un vértice tal que  $in_f(x) = 0$ .
- Entonces  $out_f(x) = 0$  y por lo tanto  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y lo cual significa que x no forma parte del matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Viceversa, supongamos que x es un vértice tal que  $in_f(x) = 0$ .
- Entonces  $out_f(x) = 0$  y por lo tanto  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y lo cual significa que x no forma parte del matching.
- Conclusión:  $S_0 = \{x \in X : in_f(x) = out_f(x) = 0\}.$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo ejemplo con matrices

Hall y Kőn Perfección y Completitud

#### Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Viceversa, supongamos que x es un vértice tal que  $in_f(x) = 0$ .
- Entonces  $out_f(x) = 0$  y por lo tanto  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y lo cual significa que x no forma parte del matching.
- Conclusión:  $S_0 = \{x \in X : in_f(x) = out_f(x) = 0\}.$
- En el último paso del algoritmo, Edmonds-Karp encuentra un corte minimal.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kö
Teorema de Köni

■ Viceversa, supongamos que x es un vértice tal que  $in_f(x) = 0$ .

- Entonces  $out_f(x) = 0$  y por lo tanto  $f(\overrightarrow{xy}) = 0$  para todo y lo cual significa que x no forma parte del matching.
- Conclusión:  $S_0 = \{x \in X : in_f(x) = out_f(x) = 0\}.$
- En el último paso del algoritmo, Edmonds-Karp encuentra un corte minimal.
- Antes denotabamos los cortes con la letra S, pero ahora usaremos otra letra porque el corte minimal no es el "S" que estamos buscando. Digamos que el corte es C.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y

Teorema de Hall

Matrimonio de Köniç Teorema de König sobre coloreo lateral ■ Ese corte *C* incluye a *s*, y los otros elementos de *C* son vértices de *G*, que pueden estar en *X* o en *Y*.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema

Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y

#### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Ese corte *C* incluye a *s*, y los otros elementos de *C* son vértices de *G*, que pueden estar en *X* o en *Y*.
- Asi que existen  $S \subseteq X$ ,  $T \subseteq Y$  tal que  $C = \{s\} \cup S \cup T$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Hall y Kőr Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Ese corte *C* incluye a *s*, y los otros elementos de *C* son vértices de *G*, que pueden estar en *X* o en *Y*.
- Asi que existen  $S \subseteq X$ ,  $T \subseteq Y$  tal que  $C = \{s\} \cup S \cup T$ .
- Recordemos que C se obtiene al hacer la ultima cola BFS: C consiste de todos los vértices que en algún momento estan en esa última cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera

- Ese corte *C* incluye a *s*, y los otros elementos de *C* son vértices de *G*, que pueden estar en *X* o en *Y*.
- Asi que existen  $S \subseteq X$ ,  $T \subseteq Y$  tal que  $C = \{s\} \cup S \cup T$ .
- Recordemos que C se obtiene al hacer la ultima cola BFS: C consiste de todos los vértices que en algún momento estan en esa última cola.
- Como  $x \in S_0 \iff in_f(x) = 0 \iff f(\overrightarrow{sx}) = 0$ , entonces los vértices de  $S_0$  son precisamente todos los vértices que s agrega a la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Parfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
sobre coloreo latera
de mafes binartibles

- Ese corte *C* incluye a *s*, y los otros elementos de *C* son vértices de *G*, que pueden estar en *X* o en *Y*.
- Asi que existen  $S \subseteq X$ ,  $T \subseteq Y$  tal que  $C = \{s\} \cup S \cup T$ .
- Recordemos que C se obtiene al hacer la ultima cola BFS: C consiste de todos los vértices que en algún momento estan en esa última cola.
- Como  $x \in S_0 \iff in_f(x) = 0 \iff f(\overrightarrow{sx}) = 0$ , entonces los vértices de  $S_0$  son precisamente todos los vértices que s agrega a la cola.
- Por lo tanto,  $S_0 \subseteq S$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

maximales a fluj Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall

leorema de Hai

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Ahora bien, todos los otros elementos de *S* (los que no estan en *S*<sub>0</sub>, si es que hay alguno) deben haber sido agregados a la cola por algún elemento distinto de *s*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de Köni Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Ahora bien, todos los otros elementos de S (los que no estan en  $S_0$ , si es que hay alguno) deben haber sido agregados a la cola por algún elemento distinto de s.
- Pero un vértice solo puede agregar a algún vecino, ya sea vecino hacia adelante o hacia atras.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Ahora bien, todos los otros elementos de *S* (los que no estan en *S*<sub>0</sub>, si es que hay alguno) deben haber sido agregados a la cola por algún elemento distinto de *s*.
- Pero un vértice solo puede agregar a algún vecino, ya sea vecino hacia adelante o hacia atras.
- Esto quiere decir que los vértices de S no pueden haber sido agregado por otros vértices de S, pues como S ⊆ X, no hay lados entre ellos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y König
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos binartitos

- Ahora bien, todos los otros elementos de S (los que no estan en  $S_0$ , si es que hay alguno) deben haber sido agregados a la cola por algún elemento distinto de s.
- Pero un vértice solo puede agregar a algún vecino, ya sea vecino hacia adelante o hacia atras.
- Esto quiere decir que los vértices de S no pueden haber sido agregado por otros vértices de S, pues como  $S \subseteq X$ , no hay lados entre ellos.
- Asi que los vértices de S que no están en  $S_0$  deben haber sido agregados por vértices de T.

#### Matchings

Daniel Penazzi

#### Matching

problema
Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujo:

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y

#### Teorema de Hall

Tooromo dol

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral ■ Pero  $T \subseteq Y$  y todo vértice y de Y tiene  $\Gamma^+(y) = \{t\}$ .

#### Matchings

#### Teorema de Hall

- Pero  $T \subseteq Y$  y todo vértice y de Y tiene  $\Gamma^+(y) = \{t\}$ .
- Asi que *T* sólo puede agregar a un vértice de *X* a la cola si lo agrega por medio de un lado backward

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

### Completitud Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos binartitos

- Pero  $T \subseteq Y$  y todo vértice y de Y tiene  $\Gamma^+(y) = \{t\}$ .
- Asi que *T* sólo puede agregar a un vértice de *X* a la cola si lo agrega por medio de un lado backward
- Para que y agregue a x como backward, debe pasar que  $f(\overrightarrow{xy}) > 0$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőni Perfección y Completitud Teorema de Ha

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera
de grafos bipartitos

- Pero  $T \subseteq Y$  y todo vértice y de Y tiene  $\Gamma^+(y) = \{t\}$ .
- Asi que T sólo puede agregar a un vértice de X a la cola si lo agrega por medio de un lado backward
- Para que y agregue a x como backward, debe pasar que  $f(\overrightarrow{xy}) > 0$ .
- En nuestro caso, esto implica  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$  y que xy sea parte del matching.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo attendidade grafas binattinas

- Pero  $T \subseteq Y$  y todo vértice y de Y tiene  $\Gamma^+(y) = \{t\}$ .
- Asi que *T* sólo puede agregar a un vértice de *X* a la cola si lo agrega por medio de un lado backward
- Para que y agregue a x como backward, debe pasar que  $f(\overrightarrow{xy}) > 0$ .
- En nuestro caso, esto implica  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$  y que xy sea parte del matching.
- Por lo tanto, cada y que pueda agregar a la cola a algún vértice en forma backward, puede agregar UN SÓLO tal vértice.

#### Matchings

Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchi maximales a flujo

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y

Teorema de Hall

Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Entonces cada vértice de *T* puede agregar un sólo vértice a la cola.

#### Matchings

Teorema de Hall

- Entonces cada vértice de T puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.

#### Matchings

Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción de problema de

Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo latera

- Entonces cada vértice de T puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

matrices
Teoremas de

Perfección y

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kön Teorema de König sobre colorea later

- Entonces cada vértice de *T* puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?
- Supongamos que no, que exista  $y \in T$  que no agrega a nadie a la cola.

#### Matchings

Teorema de Hall

- Entonces cada vértice de T puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?
- Supongamos que no, que exista  $y \in T$  que no agrega a nadie a la cola.
- $\blacksquare$  Como C es un corte,  $t \notin C$ , asi que y no deberia poder agregar a t a la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfeción y
Completity
Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König
Sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Entonces cada vértice de *T* puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?
- Supongamos que no, que exista  $y \in T$  que no agrega a nadie a la cola.
- Como C es un corte,  $t \notin C$ , asi que y no deberia poder agregar a t a la cola.
- Con lo cual, debemos tener que  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Entonces cada vértice de *T* puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?
- Supongamos que no, que exista  $y \in T$  que no agrega a nadie a la cola.
- Como C es un corte,  $t \notin C$ , asi que y no deberia poder agregar a t a la cola.
- Con lo cual, debemos tener que  $f(\overrightarrow{yt}) = 1$ .
- Entonces  $out_f(y) = 1$  y por lo tanto  $in_f(y) = 1$  y debe existir  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchin
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König Sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Entonces cada vértice de *T* puede agregar un sólo vértice a la cola.
- Pero ademas, cada vértice de T efectivamente agrega un vértice a la cola.
- ¿Por qué?
- Supongamos que no, que exista  $y \in T$  que no agrega a nadie a la cola.
- Como C es un corte,  $t \notin C$ , asi que y no deberia poder agregar a t a la cola.
- Con lo cual, debemos tener que f(yt) = 1.
- Entonces  $out_f(y) = 1$  y por lo tanto  $in_f(y) = 1$  y debe existir  $x \in X$  tal que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Pero entonces x es "candidato" a ser agregado a la cola como backward por y.



#### Matchings

Daniel Penazz

Matching: Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con

Teoremas de

Perfección y

Teorema de Hall

Teorema de König sobre coloreo lateral Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.

#### Matchings

Teorema de Hall

Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a Χ.

La única razón posible es que x ya esté en la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y

Teorema de Hall

Teorema de Hai

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.
- La única razón posible es que x ya esté en la cola.
- Pero ¿quien lo agregó?

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.
- La única razón posible es que *x* ya esté en la cola.
- Pero ¿quien lo agregó?
- No lo puede haber agregado alguien de T pues si fuese asi:

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.
- La única razón posible es que x ya esté en la cola.
- Pero ¿quien lo agregó?
- No lo puede haber agregado alguien de T pues si fuese asi:
  - y no lo agrega asi que debería ser otro vértice z de T, agregandolo backward.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchiny
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y König
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafas bipartifios

- Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.
- La única razón posible es que *x* ya esté en la cola.
- Pero ¿quien lo agregó?
- No lo puede haber agregado alguien de T pues si fuese asi:
  - y no lo agrega asi que debería ser otro vértice z de T, agregandolo backward.
  - Pero esto significaria que tanto xz como xy estan en el matching, absurdo.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matchiny maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perlección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo lateral de grafes bipartitires

- Como estamos suponiendo que y no agrega a nadie a la cola, debe haber una razón para que y no agregue a x.
- La única razón posible es que *x* ya esté en la cola.
- Pero ¿quien lo agregó?
- No lo puede haber agregado alguien de T pues si fuese asi:
  - y no lo agrega asi que debería ser otro vértice z de T, agregandolo backward.
  - Pero esto significaria que tanto xz como xy estan en el matching, absurdo.
- Entonces la única posibilidad que queda es que haya sido agregado por s, es decir, que x esté en  $S_0$ .

### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y

#### Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kön Teorema de König sobre colorea later: Pero si  $x \in S_0$ , entonces  $out_f(x) = 0$  lo que contradice que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Perfección y

Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Pero si  $x \in S_0$ , entonces  $out_f(x) = 0$  lo que contradice que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos entonces que todo y en T agrega a alguien a la cola, y por lo que vimos antes, agrega exactamente un tal alguien a la cola.

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

matrices
Teoremas de

Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Pero si  $x \in S_0$ , entonces  $out_f(x) = 0$  lo que contradice que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .
- Concluimos entonces que todo y en T agrega a alguien a la cola, y por lo que vimos antes, agrega exactamente un tal alguien a la cola.
- Esos elementos agregados son los de  $S S_0$ , asi que concluimos que  $|S S_0| = |T|$ .

#### Matchings

#### Teorema de Hall

Analicemos ahora un poco a los vértices de T.

#### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall

leorema de Hai

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Analicemos ahora un poco a los vértices de T.
- Todos ellos deben haber sido agregados por alguien de *X* de la cola, es decir, por alguien de *S*.

#### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Matrimonio de Kőnig Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Analicemos ahora un poco a los vértices de T.
- Todos ellos deben haber sido agregados por alguien de *X* de la cola, es decir, por alguien de *S*.
- Esto sólo puede pasar si cada vértice de *T* es un vécino de algún vértice de *S*.

#### Matchings

Teorema de Hall

- Analicemos ahora un poco a los vértices de T.
- Todos ellos deben haber sido agregados por alguien de X de la cola, es decir, por alguien de S.
- Esto sólo puede pasar si cada vértice de T es un vécino de algún vértice de S.
- Por lo tanto,  $T \subseteq \Gamma(S)$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Petinición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con

Teoremas c Hall y Kőnic

Perfección y

Teorema de Hall

Tooroma dol

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y

#### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \notin T$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo cor

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

#### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \notin T$ .
- Como  $y \in \Gamma(S)$  entonces existe  $x \in S$  con  $xy \in E$ .

#### Matchings

Teorema de Hall

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \not\in T$ .
- Como  $y \in \Gamma(S)$  entonces existe  $x \in S$  con  $xy \in E$ .
- Como  $x \in S$ . x está en C.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

matrices
Teoremas de

Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kön Teorema de König sobre coloreo latera

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \notin T$ .
- Como  $y \in \Gamma(S)$  entonces existe  $x \in S$  con  $xy \in E$ .
- Como  $x \in S$ , x está en C.
- Pero  $y \notin T$ , asi que y no está en C.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con matrices

Hall y Kőni Perfección y

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Köni Teorema de König sobre coloreo latera

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \notin T$ .
- Como  $y \in \Gamma(S)$  entonces existe  $x \in S$  con  $xy \in E$ .
- Como  $x \in S$ , x está en C.
- Pero  $y \notin T$ , asi que y no está en C.
- Asi que *x* nunca agregó a *y*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema del König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Habiendo visto que  $T \subseteq \Gamma(S)$ , ahora nos preguntamos si son iguales o no.
- Si no son iguales, entonces existe  $y \in \Gamma(S)$  tal que  $y \notin T$ .
- Como  $y \in \Gamma(S)$  entonces existe  $x \in S$  con  $xy \in E$ .
- Como  $x \in S$ , x está en C.
- Pero  $y \notin T$ , asi que y no está en C.
- Asi que x nunca agregó a y.
- Pero  $xy \in E$ , asi que para que x no agregue a y, debe pasar que  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$ .

### Matchings

#### Teorema de Hall

Pero entonces, ¿quien agregó a x?

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

#### Ejemplo Rehaciendo ejemplo con

ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Teorema de Hall

#### - . . .

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral

- Pero entonces, ¿quien agregó a x?
- y no fue porque nunca estuvo en la cola.

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud

#### Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Pero entonces, ¿quien agregó a x?
- y no fue porque nunca estuvo en la cola.
- No puede ser ningún otro elemento de T pues  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$  implica que no existe ningún otro z con  $f(\overrightarrow{xz}) = 1$ .

#### Matchings

Teorema de Hall

- Pero entonces, ¿quien agregó a x?
- y no fue porque nunca estuvo en la cola.
- No puede ser ningún otro elemento de *T* pues  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$  implica que no existe ningún otro z con  $f(\overrightarrow{xz}) = 1.$
- Debe haber sido agregado por s, pero esto implica que  $out_f(x) = 0$  absurdo pues  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Pero entonces, ¿quien agregó a x?
- y no fue porque nunca estuvo en la cola.
- No puede ser ningún otro elemento de T pues  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$  implica que no existe ningún otro z con  $f(\overrightarrow{xz}) = 1$ .
- Debe haber sido agregado por s, pero esto implica que  $out_f(x) = 0$  absurdo pues  $f(\overrightarrow{xy}) = 1$
- El absurdo vino de suponer que T y  $\Gamma(S)$  no eran iguales, así que concluimos que  $T = \Gamma(S)$ .

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

#### Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Kô

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

## Entonces:

$$|\Gamma(S)| = |T| = |S - S_0| = |S| - |S_0| < |S|$$

### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehacien

ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

## Teorema de Hall

Matrimonio de Köni Teorema de König sobre coloreo latera Entonces:

$$|\Gamma(S)| = |T| = |S - S_0| = |S| - |S_0| < |S|$$

• (la ultima desigualdad pues  $S_0 \neq \emptyset$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo cor matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

## Entonces:

$$|\Gamma(S)| = |T| = |S - S_0| = |S| - |S_0| < |S|$$

- (la ultima desigualdad pues  $S_0 \neq \emptyset$ .
- Hemos probado que  $|\Gamma(S)| < |S|$ , lo que contradice la hipotesis de que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo cor matrices

## Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

## Teorema del Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Entonces:

$$|\Gamma(S)| = |T| = |S - S_0| = |S| - |S_0| < |S|$$

- (la ultima desigualdad pues  $S_0 \neq \emptyset$ .
- Hemos probado que  $|\Gamma(S)| < |S|$ , lo que contradice la hipotesis de que  $|S| \le |\Gamma(S)|$  para todo  $S \subseteq X$ .
- Fin

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching

maximales a fluj Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafes bipartitos OBSERVACIÓN: A veces al teorema de Hall se le llama "teorema del matrimonio" pero en realidad ese nombre se suele reservar para otro teorema, del húngaro Dénnes Kőnig.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kőnig

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos OBSERVACIÓN: A veces al teorema de Hall se le llama "teorema del matrimonio" pero en realidad ese nombre se suele reservar para otro teorema, del húngaro Dénnes Kőnig.

## Teorema del matrimonio (Kőnig, 1914)

Todo grafo bipartito regular tiene un matching perfecto.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchin;
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de carafe bipartities

OBSERVACIÓN: A veces al teorema de Hall se le llama "teorema del matrimonio" pero en realidad ese nombre se suele reservar para otro teorema, del húngaro Dénnes Kőnig.

## Teorema del matrimonio (Kőnig, 1914)

Todo grafo bipartito regular tiene un matching perfecto.

Antes de dar la prueba, hay que explicar un poco porqué se llama "teorema del matrimonio".

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matchiny
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral OBSERVACIÓN: A veces al teorema de Hall se le llama "teorema del matrimonio" pero en realidad ese nombre se suele reservar para otro teorema, del húngaro Dénnes Kőnig.

## Teorema del matrimonio (Kőnig, 1914)

Todo grafo bipartito regular tiene un matching perfecto.

- Antes de dar la prueba, hay que explicar un poco porqué se llama "teorema del matrimonio".
- El nombre viene de una de las aplicaciones del teorema.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujo:

Rehaciendo el ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Supongamos que tenemos un conjunto de hombres y mujeres que quieren casarse.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

matrices
Teoremas de

Perfección y
Completitud

Teorema del Matrimonio de Könio

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un conjunto de hombres y mujeres que quieren casarse.
- Nota: como esto fue hecho hace decadas, obvio que no existia el matrimonio homosexual, y por eso vamos a tener un grafo bipartito, de lo contrario tendriamos que usar otro teorema.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Supongamos que tenemos un conjunto de hombres y mujeres que quieren casarse.
- Nota: como esto fue hecho hace decadas, obvio que no existia el matrimonio homosexual, y por eso vamos a tener un grafo bipartito, de lo contrario tendriamos que usar otro teorema.
- asi que en la epoca actual tendremos que agregar la hipotesis que todos los involucrados son heterosexuales.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

leoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Sobre coloreo lateral de grafes bioartilos

- Supongamos que tenemos un conjunto de hombres y mujeres que quieren casarse.
- Nota: como esto fue hecho hace decadas, obvio que no existia el matrimonio homosexual, y por eso vamos a tener un grafo bipartito, de lo contrario tendriamos que usar otro teorema.
- asi que en la epoca actual tendremos que agregar la hipotesis que todos los involucrados son heterosexuales.
- Cada hombre hace una lista de las mujeres con las cuales aceptaria casarse, y cada mujer hace una lista de los hombres con los cuales aceptaria casarse.

### Matchings

Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos ■ Luego para cada mujer *x* hacemos una lista reducida de hombres compatibles: aquellos hombres *y* en la lista de *x* que tienen a *x* en la lista de *y*.

#### Matchings

Teorema del Matrimonio de Konia

- Luego para cada mujer x hacemos una lista reducida de hombres compatibles: aquellos hombres y en la lista de x que tienen a x en la lista de y.
- Y hacemos lo mismo para cada hombre y: una lista de mujeres x que estan en la lista de y tales que y está en la lista de x.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Luego para cada mujer *x* hacemos una lista reducida de hombres compatibles: aquellos hombres *y* en la lista de *x* que tienen a *x* en la lista de *y*.
- Y hacemos lo mismo para cada hombre y: una lista de mujeres x que estan en la lista de y tales que y está en la lista de x.
- Es decir, *x* está en la lista reducida de *y* si y sólo si *y* está en la lista reducida de *x* si y solo si *x* e *y* son mutuamente compatibles.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

leoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König sobre coloreo latera de grafis bipartitis

- Luego para cada mujer x hacemos una lista reducida de hombres compatibles: aquellos hombres y en la lista de x que tienen a x en la lista de y.
- Y hacemos lo mismo para cada hombre y: una lista de mujeres x que estan en la lista de y tales que y está en la lista de x.
- Es decir, x está en la lista reducida de y si y sólo si y está en la lista reducida de x si y solo si x e y son mutuamente compatibles.
- Entonces el teorema dice que si cada hombre es compatible con exactamente k mujeres y cada mujer es compatible con exactamente k hombres, con  $k \neq 0$ , entonces se pueden casar a todos los hombres y a todas las mujeres de forma compatible.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kāni

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Si lo prefieren pueden pensar en terminos de tareas/trabajadores que si cada tarea puede ser realizada por exactamente k trabajadores y cada trabajador puede realizar exactamente k tareas, con k > 0, entonces se pueden realizar todas las tareas y ningún trabajador se queda sin trabajo.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Si lo prefieren pueden pensar en terminos de tareas/trabajadores que si cada tarea puede ser realizada por exactamente k trabajadores y cada trabajador puede realizar exactamente k tareas, con k > 0, entonces se pueden realizar todas las tareas y ningún trabajador se queda sin trabajo.
- En esta formulación podría llamarse el teorema de la distribución de tareas o algo asi, pero bueno, no es asi como se lo conoce.

# Prueba del Teorema del matrimonio

## Matchings

Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matci maximales a flu

## Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Könio

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral Vayamos a la prueba.

## Prueba del Teorema del matrimonio

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Fiemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera

- Vayamos a la prueba.
- Dado un conjunto  $W \subseteq V$ , definamos  $E_W = \{zw \in E | w \in W\}$

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Vayamos a la prueba.
- Dado un conjunto  $W \subseteq V$ , definamos  $E_W = \{zw \in E | w \in W\}$
- Sean *X* e *Y* las partes del grafo bipartito.

### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con

Teoremas de

## Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Vayamos a la prueba.
- Dado un conjunto  $W \subseteq V$ , definamos  $E_W = \{zw \in E | w \in W\}$
- Sean X e Y las partes del grafo bipartito.
- Supongamos que  $W \subseteq X$ . Entonces:

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y problema

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König

Matrimonio de Konig Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Vayamos a la prueba.
- Dado un conjunto  $W \subseteq V$ , definamos  $E_W = \{zw \in E | w \in W\}$
- Sean X e Y las partes del grafo bipartito.
- Supongamos que  $W \subseteq X$ . Entonces:
- $|E_W| = |\{zw \in E | w \in W\}| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}|$

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kő

Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Vayamos a la prueba.
- Dado un conjunto  $W \subseteq V$ , definamos  $E_W = \{zw \in E | w \in W\}$
- Sean *X* e *Y* las partes del grafo bipartito.
- Supongamos que  $W \subseteq X$ . Entonces:
- $|E_W| = |\{zw \in E | w \in W\}| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}|$
- La última igualdad pues como W ⊆ X entonces no estamos contando un lado zw dos veces, pues zw ∈ E implica que z ∈ Y y por lo tanto no puede estar en W.

### Matchings

Daniel Penazzi

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar match maximales a fluj Ejemplo

#### Rehaciendo el ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral ■ Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$ 

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

## Teoremas of Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Könio

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:

## Matchings

Daniel Penazz

## Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

# Hall y Kőnig Perfección y

Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$

### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

Teoremas de

## Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Könio

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$
- Con un razonamiento similar, tenemos que si  $W \subseteq Y$  entonces tambien vale que  $|E_W| = \Delta.|W|$ .

## Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$
- Con un razonamiento similar, tenemos que si  $W \subseteq Y$  entonces tambien vale que  $|E_W| = \Delta.|W|$ .
- Apliquemos esta propiedad para diversos *W*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Ha

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$
- Con un razonamiento similar, tenemos que si  $W \subseteq Y$  entonces tambien vale que  $|E_W| = \Delta.|W|$ .
- Apliquemos esta propiedad para diversos *W*.
- Si tomamos W = X tendremos que  $|E_X| = \Delta.|X|$ .

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Ha

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$
- Con un razonamiento similar, tenemos que si  $W \subseteq Y$  entonces tambien vale que  $|E_W| = \Delta.|W|$ .
- Apliquemos esta propiedad para diversos *W*.
- Si tomamos W = X tendremos que  $|E_X| = \Delta.|X|$ .
- Pero *G* es bipartito, así que  $E_X = \{xy \in E : x \in X\} = E$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Perfección y Completitud Teorema de Ha

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Entonces  $|E_W| = \sum_{w \in W} |\{z : zw \in E\}| = \sum_{w \in W} d(w)$
- Como G es regular,  $d(w) = \Delta$  para todo w, asi que tenemos:
- $\blacksquare |E_W| = \sum_{w \in W} d(w) = \sum_{w \in W} \Delta = \Delta.|W|.$
- Con un razonamiento similar, tenemos que si  $W \subseteq Y$  entonces tambien vale que  $|E_W| = \Delta . |W|$ .
- Apliquemos esta propiedad para diversos *W*.
- Si tomamos W = X tendremos que  $|E_X| = \Delta.|X|$ .
- Pero *G* es bipartito, asi que  $E_X = \{xy \in E : x \in X\} = E$
- Concluimos que  $|E| = \Delta . |X|$ .

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo

## Teoremas o

Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hal

Matrimonio de König Teorema de König ■ Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchir maximales a flujo

#### Ejemplo Rehaciendo ejemplo con

Teoremas o

## Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .

## Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con

Teoremas o Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .
- Entonces |E| es igual a  $\Delta . |X|$  y a  $\Delta . |Y|$ .

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema del Matrimonio de Könia

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .
- Entonces |E| es igual a  $\Delta . |X|$  y a  $\Delta . |Y|$ .
- Por lo tanto  $\Delta$ . $|X| = \Delta$ .|Y| asi que |X| = |Y|.

## Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

matrices
Teoremas de

Hall y Kőnig Perfección y Completitud

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .
- Entonces |E| es igual a  $\Delta . |X|$  y a  $\Delta . |Y|$ .
- Por lo tanto  $\Delta$ . $|X| = \Delta$ .|Y| asi que |X| = |Y|.
- (observar que estamos usando  $\Delta \neq 0$ . Esto es asi porque la definición de "bipartito" que dimos el primer dia de clase era que  $\chi(G)=2$ , asi que esto implica que hay al menos un lado y  $\Delta \neq 0$ )

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .
- Entonces |E| es igual a  $\Delta . |X|$  y a  $\Delta . |Y|$ .
- Por lo tanto  $\Delta$ . $|X| = \Delta$ .|Y| asi que |X| = |Y|.
- (observar que estamos usando  $\Delta \neq 0$ . Esto es asi porque la definición de "bipartito" que dimos el primer dia de clase era que  $\chi(G)=2$ , asi que esto implica que hay al menos un lado y  $\Delta \neq 0$ )
- Entonces, como |X| = |Y|, para probar que existe un matching perfecto basta probar que existe un matching completo sobre X.

### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König

- Tomando W = Y concluimos  $|E_Y| = \Delta.|Y|$ .
- Pero  $E_Y = E$  asi que tenemos que  $|E| = \Delta.|Y|$ .
- Entonces |E| es igual a  $\Delta . |X|$  y a  $\Delta . |Y|$ .
- Por lo tanto  $\Delta$ . $|X| = \Delta$ .|Y| asi que |X| = |Y|.
- (observar que estamos usando  $\Delta \neq 0$ . Esto es asi porque la definición de "bipartito" que dimos el primer dia de clase era que  $\chi(G)=2$ , asi que esto implica que hay al menos un lado y  $\Delta \neq 0$ )
- Entonces, como |X| = |Y|, para probar que existe un matching perfecto basta probar que existe un matching completo sobre X.
- Para probar esto, usaremos el teorema de Hall.

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar match maximales a fluj

## Ejemplo Rohaciando al

Rehaciendo ejemplo con matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud

Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König

Teorema de Kônig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Sea entonces  $S \subseteq X$ .

## Matchings

Teorema del

Matrimonio de Kőnig

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

## Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .
- Entonces existe  $x \in S$ ,  $y \in Y$  tal que  $\ell$  es de la forma  $\ell = xy$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición v

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo ejemplo con matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .
- Entonces existe  $x \in S$ ,  $y \in Y$  tal que  $\ell$  es de la forma  $\ell = xy$ .
- Por lo tanto  $y \in \Gamma(x) \subseteq \Gamma(S)$  (pues  $x \in S$ ).

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hal

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .
- Entonces existe  $x \in S$ ,  $y \in Y$  tal que  $\ell$  es de la forma  $\ell = xy$ .
- Por lo tanto  $y \in \Gamma(x) \subseteq \Gamma(S)$  (pues  $x \in S$ ).
- Entonces  $\ell$  es de la forma xy con  $y \in \Gamma(S)$ , lo cual implica que  $\ell \in E_{\Gamma(S)}$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hal Teorema del

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .
- Entonces existe  $x \in S$ ,  $y \in Y$  tal que  $\ell$  es de la forma  $\ell = xy$ .
- Por lo tanto  $y \in \Gamma(x) \subseteq \Gamma(S)$  (pues  $x \in S$ ).
- Entonces  $\ell$  es de la forma xy con  $y \in \Gamma(S)$ , lo cual implica que  $\ell \in E_{\Gamma(S)}$ .
- Como  $\ell$  era cualquier elemento de  $E_S$  esto dice que  $E_S \subseteq E_{\Gamma(S)}$ .

### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de K

Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Sea entonces  $S \subseteq X$ .
- Sea  $\ell \in E_S$ .
- Entonces existe  $x \in S$ ,  $y \in Y$  tal que  $\ell$  es de la forma  $\ell = xy$ .
- Por lo tanto  $y \in \Gamma(x) \subseteq \Gamma(S)$  (pues  $x \in S$ ).
- Entonces  $\ell$  es de la forma xy con  $y \in \Gamma(S)$ , lo cual implica que  $\ell \in E_{\Gamma(S)}$ .
- Como  $\ell$  era cualquier elemento de  $E_S$  esto dice que  $E_S \subseteq E_{\Gamma(S)}$ .
- Por lo tanto  $|E_S| \le |E_{\Gamma(S)}|$

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

#### Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera de grafos bipartitos ■ Como  $S \subseteq X$ , entonces lo que probamos al principio de la prueba dice que  $|E_S| = \Delta . |S|$ .

### Matchings

Daniel Penazz

## Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

#### Ejemplo Rehaciendo e ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de König

Teorema de Kőnig sobre coloreo latera

- Como  $S \subseteq X$ , entonces lo que probamos al principio de la prueba dice que  $|E_S| = \Delta . |S|$ .
- Como  $\Gamma(S) \subseteq Y$ , entonces  $|E_{\Gamma(S)}| = \Delta.|\Gamma(S)|$ .

### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo e ejemplo con matrices

## Teoremas de Hall y Kőnig

Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral

- Como  $S \subseteq X$ , entonces lo que probamos al principio de la prueba dice que  $|E_S| = \Delta . |S|$ .
- Como  $\Gamma(S) \subseteq Y$ , entonces  $|E_{\Gamma(S)}| = \Delta.|\Gamma(S)|$ .
- Como en la pagina anterior probamos que  $|E_S| \le |E_{\Gamma(S)}|$ , concluimos que  $\Delta . |S| \le \Delta . |\Gamma(S)|$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

- Como  $S \subseteq X$ , entonces lo que probamos al principio de la prueba dice que  $|E_S| = \Delta . |S|$ .
- Como  $\Gamma(S) \subseteq Y$ , entonces  $|E_{\Gamma(S)}| = \Delta.|\Gamma(S)|$ .
- Como en la pagina anterior probamos que  $|E_S| \le |E_{\Gamma(S)}|$ , concluimos que  $\Delta . |S| \le \Delta . |\Gamma(S)|$ .
- Por lo tanto  $|S| \le |\Gamma(S)|$  y como esto vale para cualquier  $S \subseteq X$ , Hall nos dice que existe un matching completo sobre X lo cual completa la prueba.

## Matchings

Daniel Penazz

#### Matching:

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo
ejemplo con
matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Kőnig fue un "peso pesado" en teoría de grafos.

## Matchings

Daniel Penazz

## Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

matrices Teoremas d

Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Köni

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Kőnig fue un "peso pesado" en teoría de grafos.
- Publicó el primer libro de texto sobre teoría de grafos y tiene varios teoremas en el area.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Kőnig fue un "peso pesado" en teoría de grafos.
- Publicó el primer libro de texto sobre teoría de grafos y tiene varios teoremas en el area.
- Uno de sus teoremas dice que el número de lados de un matching maximal es igual al número de vértices de una cobertura minimal de vértices. (i.e., un conjunto de vértices tal que todo lado tiene a uno de esos vértices como extremo).

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Hall y König
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Kőnig fue un "peso pesado" en teoría de grafos.
- Publicó el primer libro de texto sobre teoría de grafos y tiene varios teoremas en el area.
- Uno de sus teoremas dice que el número de lados de un matching maximal es igual al número de vértices de una cobertura minimal de vértices. (i.e., un conjunto de vértices tal que todo lado tiene a uno de esos vértices como extremo).
- Este teorema es equivalente al teorema de Hall.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

- Kőnig fue un "peso pesado" en teoría de grafos.
  - Publicó el primer libro de texto sobre teoría de grafos y tiene varios teoremas en el area.
- Uno de sus teoremas dice que el número de lados de un matching maximal es igual al número de vértices de una cobertura minimal de vértices. (i.e., un conjunto de vértices tal que todo lado tiene a uno de esos vértices como extremo).
- Este teorema es equivalente al teorema de Hall.
- En octubre de 1944, durante el exterminio del 75% de los judios de Hungria, Kőnig, que era judio, se suicidó para evitar caer en las garras de los nazis.

## Otro teorema de Kőnig

## Matchings

Daniel Penazz

## Matching:

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchi maximales a flujo

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas o

Completitud
Teorema de Hall

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ En honor de Kőnig, probaremos otro teorema tambien de el.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Teorema de Hall Teorema del

- Este teorema se puede probar de varias formas pero la mas fácil es usar el teorema del matrimonio.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Rehaciendo el ejemplo con matrices

Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del

- En honor de Kőnig, probaremos otro teorema tambien de el.
- Este teorema se puede probar de varias formas pero la mas fácil es usar el teorema del matrimonio.
- Y encaja bastante bien con otros temas del curso.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Köni

- En honor de Kőnig, probaremos otro teorema tambien de el.
- Este teorema se puede probar de varias formas pero la mas fácil es usar el teorema del matrimonio.
- Y encaja bastante bien con otros temas del curso.
- Hemos visto coloreo de vértices de un grafo, pero los lados tambien se pueden colorear.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema de König Teorema de König Teorema de König sobre coloreo latera

- En honor de Kőnig, probaremos otro teorema tambien de el.
- Este teorema se puede probar de varias formas pero la mas fácil es usar el teorema del matrimonio.
- Y encaja bastante bien con otros temas del curso.
- Hemos visto coloreo de vértices de un grafo, pero los lados tambien se pueden colorear.
- Un coloreo propio de los lados de un grafo es un coloreo de los lados tal que dos lados que tengan un extremo en común tengan colores distintos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Este teorema se puede probar de varias formas pero la mas fácil es usar el teorema del matrimonio.
- Y encaja bastante bien con otros temas del curso.
- Hemos visto coloreo de vértices de un grafo, pero los lados tambien se pueden colorear.
- Un coloreo propio de los lados de un grafo es un coloreo de los lados tal que dos lados que tengan un extremo en común tengan colores distintos.
- El índice cromático de un grafo es la menor cantidad de colores de un coloreo propio de los lados y se denota por  $\chi'(G)$ .

### Matchings

Daniel Penazzi

#### Matching:

petinicion y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .

### Matchings

Daniel Penazz

## Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matchin

maximales a flu Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

Teoremas o Hall y Kőnig

> Completitud Teorema de Hall Teorema del

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo
Rehariendo el

Teoremas de Hall v Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.
- Vizing probó en 1964 que una cota superior es....

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kan

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.
- Vizing probó en 1964 que una cota superior es....
- Δ + 1 (!!!!)

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.
- Vizing probó en 1964 que una cota superior es....
- $\Delta + 1$  (!!!!)
- Es decir  $\Delta \le \chi'(G) \le \Delta + 1$  para todo grafo G, asi que sólo hay dos opciones.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral

de grafos bipartitos

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.
- Vizing probó en 1964 que una cota superior es....
- $\Delta + 1$  (!!!!)
- Es decir  $\Delta \le \chi'(G) \le \Delta + 1$  para todo grafo G, asi que sólo hay dos opciones.
- Pero determinar en general si  $\chi'(G)$  es  $\Delta$  o  $\Delta+1$  es NP-completo!

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de König
Teorema de König
sobre coloreo lateral
de grafos bipartitos

- Una cota inferior obvia es  $\Delta \leq \chi'(G)$ .
- Pues si  $d(x) = \Delta$ , entonces existen  $\Delta$  lados con extremo x, todos los cuales deben llevar colores distintos.
- Vizing probó en 1964 que una cota superior es....
- $\Delta + 1$  (!!!!)
- Es decir  $\Delta \le \chi'(G) \le \Delta + 1$  para todo grafo G, asi que sólo hay dos opciones.
- Pero determinar en general si  $\chi'(G)$  es  $\Delta$  o  $\Delta+1$  es NP-completo!
- Para algunos grafos sin embargo, se puede determinar a que categoria pertenecen fácilmente

### Matchings

Penazz

#### Matching

problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall v Kőnio

Perfección y Completitud

Teorema del Matrimonio de Kön

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### Teorema (Kőnig)

### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo
Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Feoremas de

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### Teorema (Kőnig)

Si G es bipartito, entonces  $\chi'(G) = \Delta$ 

Prueba.

### Matchings

Daniel Penazz

### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos

maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el eiemplo con

Teoremas de

Hall y Kőnig

Perfección y

Completitud

Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de Kön

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### Teorema (Kőnig)

- Prueba.
- Supongamos primero que G es regular y probemoslo por inducción en Δ.

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Rehaciendo ejemplo con matrices

#### Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

### Teorema (Kőnig)

- Prueba.
- Supongamos primero que G es regular y probemoslo por inducción en Δ.
- Si  $\Delta = 1$ , entonces G es una colección de lados disjuntos, y podemos colorearlos a todos con el color 1.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema de König Teorema de König Teorema de König Teorema de König sobre coloreo latera de grafos bipartitos

### Teorema (Kőnig)

- Prueba.
- Supongamos primero que G es regular y probemoslo por inducción en Δ.
- Si  $\Delta = 1$ , entonces G es una colección de lados disjuntos, y podemos colorearlos a todos con el color 1.
- Supongamos ahora que  $\Delta(G) > 1$  y que el teorema vale para grafos bipartitos regulares con grado máximo  $\Delta(G) 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matchings

problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos

Ejemplo

Rehaciendo e
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall y Kőnic

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos Usando el teorema del matrimonio, tenemos un matching perfecto, pues G es bipartito regular.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas d Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del

- Usando el teorema del matrimonio, tenemos un matching perfecto, pues *G* es bipartito regular.
- Sean *E*<sub>1</sub> los lados de ese matching, y borremoslos de *G*, obteniendo un grafo *G*\*.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

- Usando el teorema del matrimonio, tenemos un matching perfecto, pues *G* es bipartito regular.
- Sean E₁ los lados de ese matching, y borremoslos de G, obteniendo un grafo G\*.
- Como son lados de un matching, el grado de cada vértice de *G* disminuye en 1.

#### Matchings

- Usando el teorema del matrimonio, tenemos un matching perfecto, pues G es bipartito regular.
- Sean E<sub>1</sub> los lados de ese matching, y borremoslos de G, obteniendo un grafo G\*.
- Como son lados de un matching, el grado de cada vértice de G disminuye en 1.
- Asi, G\* tambien es regular y  $\Delta(G*) = \Delta(G) 1$  y por hipotesis inductiva, sus lados se pueden colorear con  $\Delta(G^*)$  colores.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

Teoremas de Hall y Kőnig Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Usando el teorema del matrimonio, tenemos un matching perfecto, pues *G* es bipartito regular.
- Sean E₁ los lados de ese matching, y borremoslos de G, obteniendo un grafo G\*.
- Como son lados de un matching, el grado de cada vértice de G disminuye en 1.
- Asi, G\* tambien es regular y  $\Delta(G*) = \Delta(G) 1$  y por hipotesis inductiva, sus lados se pueden colorear con  $\Delta(G*)$  colores.
- Dandole a los lados de  $E_1$  un color distinto de esos  $\Delta(G*)$  colores, tenemos coloreados todos los lados de G con  $\Delta(G*) + 1 = \Delta(G)$  colores, lo cual prueba el paso inductivo.

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos
Ejemplo

Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

### Teoremas o

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

#### Teoremas d Hall y Kőnig

Perfección y Completitud Teorema de Hall

Teorema del Matrimonio de Köni

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H)$

### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

Teoremas d

### Hall y Kőnig

Teorema de Hall Teorema del

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \le \chi'(H)$  pues  $G \subseteq H$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas d Hall y Kőnig

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kôi

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H) = \Delta(H)$  pues H es bipartito regular y ya probamos el teorema para bipartitos regulares

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching Definición y

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con
matrices

### Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H) = \Delta(H) = \Delta(G)$

#### Matchings

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H) = \Delta(H) = \Delta(G)$
- Lo que quedaria es probar la existencia de H.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo

Teoremas de Hall y Kőnig
Perfección y Completitud
Teorema de Hall
Teorema del Matrimonio de König
Teorema de König

de grafos bipartitos

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H) = \Delta(H) = \Delta(G)$
- Lo que quedaria es probar la existencia de H.
- La idea es ir construyendo grafos cada vez mas grandes tal que el  $\delta$  crezca pero el  $\Delta$  se mantenga igual, terminando eventualmente con un grafo con  $\delta = \Delta$ , es decir, regular.

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig Perlección y Completitud Teorema de Hall Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos biparitios

- Para finalizar la prueba en el caso general, se puede probar que todo grafo bipartito G puede incluirse en un grafo bipartito H regular tal que  $\Delta(G) = \Delta(H)$ .
- Entonces  $\chi'(G) \leq \chi'(H) = \Delta(H) = \Delta(G)$
- Lo que quedaria es probar la existencia de H.
- La idea es ir construyendo grafos cada vez mas grandes tal que el  $\delta$  crezca pero el  $\Delta$  se mantenga igual, terminando eventualmente con un grafo con  $\delta = \Delta$ , es decir, regular.
- Asi que basta probar que existe  $\tilde{G}$  con  $G \subseteq \tilde{G}$  tal que  $\tilde{G}$  es bipartito con  $\Delta(G) = \Delta(\tilde{G})$  y  $\delta(\tilde{G}) = \delta(G) + 1$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas d

Perfeccion y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Si X e Y son las partes de G, definimos  $X^*$ ,  $Y^*$  copias de X, Y respectivamente. (pej, podriamos definir para cada x de X un elemento  $x^* = (x, 1)$ , y similar para y pero la forma exacta de definir  $x^*$  es irrelevante)

#### Matchings

Daniel Penazz

# Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el

ejemplo con matrices

### Hall y Kőnig

Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kan

- Si X e Y son las partes de G, definimos  $X^*$ ,  $Y^*$  copias de X, Y respectivamente. (pej, podriamos definir para cada x de X un elemento  $x^* = (x, 1)$ , y similar para y pero la forma exacta de definir  $x^*$  es irrelevante)
- Tomamos  $\tilde{X} = X \cup Y^*$ ,  $\tilde{Y} = Y \cup X^*$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el

Teoremas de Hall y Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Köni

- Si X e Y son las partes de G, definimos  $X^*$ ,  $Y^*$  copias de X, Y respectivamente. (pej, podriamos definir para cada x de X un elemento  $x^* = (x, 1)$ , y similar para y pero la forma exacta de definir  $x^*$  es irrelevante)
- Tomamos  $\tilde{X} = X \cup Y^*$ ,  $\tilde{Y} = Y \cup X^*$ .
- Sea Δ = Δ(G) y:

$$\tilde{E} = E \cup \{x^*y^* : xy \in E\} \cup \{xx^* : d(x) < \Delta\} \cup \{yy^* : d(y) < \Delta\}$$

#### Matchings

Daniel Penazz

Matchings
Definición y
problema
Reducción del
problema de
encontrar matching
maximales a flujos
Ejemplo
Rehaciendo el
ejemplo con

Hall y Kőnig
Perfección y
Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Kön

Teorema del Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Si X e Y son las partes de G, definimos  $X^*$ ,  $Y^*$  copias de X, Y respectivamente. (pej, podriamos definir para cada x de X un elemento  $x^* = (x, 1)$ , y similar para y pero la forma exacta de definir  $x^*$  es irrelevante)
- Tomamos  $\tilde{X} = X \cup Y^*$ ,  $\tilde{Y} = Y \cup X^*$ .
- Sea  $\Delta = \Delta(G)$  y:

$$\tilde{E} = E \cup \{x^*y^* : xy \in E\} \cup \{xx^* : d(x) < \Delta\} \cup \{yy^* : d(y) < \Delta\}$$

■ Queda claro que  $\tilde{G}$  es bipartito con partes  $\tilde{X}$ ,  $\tilde{Y}$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

#### Matching

Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con

#### Teoremas de Hall v Kőnig

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del

Teorema de Kőnig sobre coloreo lateral de grafos bipartitos ■ Ademas, el grado de cualquier vértice z con  $d(z) = \Delta$  no cambia, y el grado del  $z^*$  correspondiente tambien es  $\Delta$ .

#### Matchings

Daniel Penazz

### Matching Definición y

problema
Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo
Rehaciendo el ejemplo con matrices

### Hall y Kőn Perfección y

Completitud
Teorema de Hall
Teorema del
Matrimonio de Köni

- Ademas, el grado de cualquier vértice z con  $d(z) = \Delta$  no cambia, y el grado del  $z^*$  correspondiente tambien es  $\Delta$ .
- Mientras que para todos los otros vértices, el grado sube exactamente en uno, pues existe un lado extra zz\*.

#### Matchings

Daniel Penazz

## Matchings Definición y problema Reducción del problema de encontrar matching maximales a flujos Ejemplo

encontrar matchir maximales a flujo Ejemplo Rehaciendo el ejemplo con matrices

## Perfección y Completitud Teorema de Hall Teorema del

Matrimonio de König Teorema de König sobre coloreo lateral de grafos bipartitos

- Ademas, el grado de cualquier vértice z con  $d(z) = \Delta$  no cambia, y el grado del  $z^*$  correspondiente tambien es  $\Delta$ .
- Mientras que para todos los otros vértices, el grado sube exactamente en uno, pues existe un lado extra zz\*.
- Fin.