

ANALISI MATEMATICA 1 - LEZIONE 23

ESEMPI

$$\bullet \int \frac{1}{x(x^2+2x+2)} dx = ?$$

Sia

$$f(x) = \frac{1}{x(x^2+2x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}$$

allora

$$A(x^2+2x+2) + x(Bx+C) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 & x^2 \\ 2A+C=0 & x^1 \\ 2A=1 & x^0 \end{cases}$$

da cui $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = -1$. Così

$$\int \frac{1}{x(x^2+2x+2)} dx = \int \left(\frac{1/2}{x} - \frac{1/2x+1}{x^2+2x+2} \right) dx$$

$$x = t-1 \Rightarrow \frac{1}{2} \log|x| - \int \frac{1/2(t-1)+1}{(t-1)^2+2(t-1)+2} dt$$

$$t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 + 2$$

$$= \frac{1}{2} \log|x| - \frac{1}{2} \int \frac{t+1}{t^2+1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \log|x| - \frac{1}{2} \int \frac{t}{t^2+1} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \log|x| - \frac{1}{4} \int \frac{1}{t^2+1} d(t^2+1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \log|x| - \frac{1}{4} \log(t^2+1) - \frac{1}{2} \arctg(t) + c$$

$$= \frac{1}{2} \log|x| - \frac{1}{4} \log(x^2+2x+2) - \frac{1}{2} \arctg(x+1) + c$$

$$1 \left(\log|t-1| - \log|t+1| \right)$$

$$t^2+1=0 \Rightarrow t^2=-1$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sin(x)} dx = \int \frac{\sin(x)}{1 - \cos^2(x)} dx$$

funz. razionale

$$\begin{aligned} t = \cos(x) \\ dt = -\sin(x) dx \end{aligned} \rightarrow \int \frac{-dt}{1-t^2} = \int \left(\frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \log|t-1| - \frac{1}{2} \log|t+1| + c$$

$$= \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)} \right) + c.$$

$$\bullet \int \frac{1}{x \log^2(x) (\log^2(x) + 1)} dx$$

$$\begin{aligned} t = \log(x) \\ dt = \frac{dx}{x} \end{aligned} \rightarrow \int \frac{1}{t^2(t^2+1)} dt = \int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct+D}{t^2+1} \right) dt$$

$$= -\frac{1}{t} - \arctg(t) + c = -\frac{1}{\log(x)} - \arctg(\log(x)) + c$$

$$\bullet \int \frac{e^{2x} + 2e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx$$

$$\begin{aligned} t = e^x \\ x = \log(t) \\ dx = \frac{dt}{t} \end{aligned} \rightarrow \int \frac{t^2 + 2t^{-1}}{1 + t^{-1}} \cdot \frac{dt}{t} = \int \frac{t^3 + 2}{t(t+1)} dt$$

$$= \int \left(t - 1 + \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} \right) dt$$

$$= \frac{t^2}{2} - t + 2 \log|t| - \log|t+1| + c$$

$$= \frac{e^{2x}}{2} - e^x + 2x - \log(e^x + 1) + c$$

$$\bullet \int \frac{1+\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}+x} dx$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{x} \\ t^2 &= x \\ 2t dt &= dx \end{aligned} \quad \Rightarrow \int \frac{1+t}{1+t+t^2} 2t dt$$

$$= 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t+t^2} \right) dt$$

$$t = s - \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 2t - 2 \int \frac{1}{s^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} ds$$

$$= 2t - 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg\left(\frac{s}{\sqrt{3}/2}\right) + c$$

$$= 2\sqrt{x} - \frac{4}{\sqrt{3}} \arctg\left(\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{3}}\right) + c$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

$$t = e^x, dx = \frac{dt}{t}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{1+t}} \frac{dt}{t}$$

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{1+t} \\ s^2 &= 1+t \\ 2s ds &= dt \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{s} \cdot \frac{2s ds}{s^2-1} = \int \left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1} \right) ds$$

$$= \log|s-1| - \log|s+1| + c$$

$$= \log\left(\frac{|s-1|}{|s+1|}\right) + c$$

$$= \log\left(\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right) + c$$

$$\frac{1+t+t^2-1}{1+t+t^2}$$

$$= \frac{t+t^2}{1+t+t^2} = \frac{t(1+t)}{1+t+t^2}$$

$$= t \cdot \frac{1+t}{1+t+t^2}$$

$$x = \log(t)$$

$$\frac{2}{(s+1)(s-1)} ds$$

OSSERVAZIONE

Se g' è continua in $[a, b]$ e f è continua in $g([a, b])$ allora

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt.$$

$t = g(x)$
↓

ESEMPI

$$\begin{aligned} \bullet \int_0^{\pi/8} \sin^2(x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/8} (1 - \cos(2x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (1 - \cos(t)) \frac{dt}{2} \\ &= \frac{1}{4} \left[t - \sin(t) \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{16} - \frac{\sqrt{2}}{8} \end{aligned}$$

$t = 2x, dt = 2dx$
↓

Perché $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x)$

implica $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$.

$$\bullet \int_0^8 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x}} dx = \int_0^2 \frac{1}{1+t} 3t^2 dt$$

$$t = \sqrt[3]{x}, t^3 = x, 3t^2 dt, \sqrt[3]{0} = 0, \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\begin{aligned} &= 3 \int_0^2 \left(t - 1 + \frac{1}{1+t} \right) dt = 3 \left[\frac{t^2}{2} - t + \log|1+t| \right]_0^2 \\ &= 3 \log(3) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 & \bullet \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin(2x) \log(1 - \cos(x)) dx = -2 \int_0^{-1} t \log(1-t) dt \\
 & \quad \leftarrow 2 \sin(x) \cos(x) \quad \uparrow \\
 & \quad t = \cos(x), dt = -\sin(x) dx, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \cos(\pi) = -1 \\
 & = \int_{-1}^0 \log(1-t) d(t^2) = \left[t^2 \log(1-t) \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \frac{t^2}{1-t} dt \\
 & = -\log(2) - \int_{-1}^0 \left(t+1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\
 & = -\log(2) - \left[\frac{t^2}{2} + t + \log|t-1| \right]_{-1}^0 \\
 & = -\cancel{\log(2)} + \frac{1}{2} - 1 + \cancel{\log(2)} = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \int_0^1 \sqrt{x} \arcsin(2x-1) dx = \int_0^1 \arcsin(2x-1) d\left(\frac{2}{3} x^{3/2}\right) \\
 & = \frac{2}{3} \left[x^{3/2} \arcsin(2x-1) \right]_0^1 - \frac{2}{3} \int_0^1 x^{3/2} \frac{2}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} dx \\
 & \quad \leftarrow \text{derivative} \\
 & \quad \sqrt{1-(2x-1)^2} = \sqrt{1-4x^2+4x+1} = \sqrt{4x(1-x)} \\
 & = \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx \\
 & \quad \begin{aligned} & t = \sqrt{1-x} \\ & t^2 = 1-x \\ & 2t dt = -dx \end{aligned} \rightarrow \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \int_1^0 \frac{1-t^2}{t} (-2t dt) \\
 & \quad \sqrt{1-0} = 1, \sqrt{1-1} = 0 \\
 & = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{3} \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} - \frac{8}{9}
 \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE


Se f è pari in $[-a, a]$ allora

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



Se f è dispari in $[-a, a]$ allora

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



$$\begin{aligned} \bullet \int_{-1}^1 e^{-x^2} (|x| + \sin(x)) dx &= \int_{-1}^1 \underbrace{e^{-x^2}}_{\text{pari}} |x| dx + \int_{-1}^1 \underbrace{e^{-x^2}}_{\text{pari}} \underbrace{\sin(x)}_{\text{dispari}} dx \\ &= 2 \int_0^1 \underbrace{e^{-x^2}}_{\text{pari}} \underbrace{|x|}_{\text{pari}} dx + 0 = \left[-e^{-x^2} \right]_0^1 = 1 - e^{-1} \end{aligned}$$

$$\bullet \int_{-3}^3 [x] dx = (1+2) - (1+2+3) = -3$$

