

ANALISI MATEMATICA 1 - LEZIONE 25

OSSERVAZIONE

Se $f(x) \geq 0$ in $[a, b)$ allora la funzione integrale

$F(t) = \int_a^t f(x) dx$ è crescente in $[a, b)$ purché

$$a \leq t_1 < t_2 < b \Rightarrow F(t_2) - F(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} f(x) dx \geq 0$$

La crescenza di F implica l'esistenza del limite

$$\lim_{t \rightarrow b^-} F(t) = \int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

l'int. improprio non può essere indeterminato

convergente divergente

TEOREMA (DEL CONFRONTO PER GLI INT. IMPROPRI)

Siano f, g funzioni definite in $[a, b)$ con

$b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tali che siano integrabili in $[a, t]$

$\forall t \in (a, b)$ e $\forall x \in [a, b)$ $0 \leq f(x) \leq g(x)$.

1) Se $\int_a^b g(x) dx$ converge allora $\int_a^b f(x) dx$ converge.

2) Se $\int_a^b f(x) dx = +\infty$ allora $\int_a^b g(x) dx = +\infty$.

dim. Consideriamo le funzioni integrali:

$$F(t) = \int_a^t f(x) dx \quad \text{e} \quad G(t) = \int_a^t g(x) dx.$$

Allora

$$a \leq t < b \Rightarrow G(t) - F(t) = \int_a^t (g(x) - f(x)) dx \geq 0.$$

Quindi:

$$\int_a^b g(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} G(t) \geq \lim_{t \rightarrow b^-} F(t) = \int_a^b f(x) dx$$

esistono per l'osservazione precedente

da cui seguono 1) e 2). □

ESEMPIO

$$\bullet \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log(x))^\beta} dx = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \alpha > 1 \text{ e } \forall \beta \in \mathbb{R} \quad (1) \\ +\infty & \text{se } \alpha < 1 \text{ e } \forall \beta \in \mathbb{R} \quad (2) \end{cases}$$

Se $\alpha > 1$ allora per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}{x^\alpha (\log(x))^\beta} = \frac{x^{\frac{1-\alpha}{2}}}{(\log(x))^\beta} \rightarrow 0$$

$\frac{1-\alpha}{2} < 0$

Per definizione di limite, per $\varepsilon = 1 \exists r > 2$ tale che

$$\forall x > r \quad \frac{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}{x^\alpha (\log(x))^\beta} \leq 1 \quad \text{ossia} \quad \frac{1}{x^\alpha (\log(x))^\beta} \leq \frac{1}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$$

Dato che $\frac{\alpha+1}{2} > 1$, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}} dx$ è convergente e per il tuo. del confronto vale (1).

Se $\alpha < 1$ allora per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}{x^\alpha (\log(x))^\beta} = \frac{x^{\frac{1-\alpha}{2}}}{(\log(x))^\beta} \rightarrow +\infty$$

$\frac{1-\alpha}{2} > 0$

Per definizione di limite, per $M = 1 \exists r > 2$ tale che

$$\forall x > 2 \quad \frac{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}{x^\alpha (\log(x))^\beta} \geq 1 \quad \text{ossia} \quad \frac{1}{x^\alpha (\log(x))^\beta} \geq \frac{1}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}.$$

Dato che $\frac{\alpha+1}{2} < 1$, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}} dx = +\infty$ e per il tuo. del confronto vale (2).

OSSERVAZIONE

Dai vari casi visti abbiamo che

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log(x))^\beta} dx \text{ converge} \iff \begin{array}{l} \alpha > 1 \\ \text{oppure} \\ \alpha = 1 \text{ e } \beta > 1 \end{array}$$

In modo simile si verifica che

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^\alpha |\log(x)|^\beta} dx \text{ converge} \iff \begin{array}{l} \alpha < 1 \\ \text{oppure} \\ \alpha = 1 \text{ e } \beta > 1 \end{array}$$

TEOREMA (DEL CONFRONTO ASINTOTICO)

Siano f, g funzioni definite in $[a, b)$ con $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tali che siano integrabili in $[a, t]$ $\forall t \in (a, b)$ e $\forall x \in [a, b)$ $f(x) \geq 0, g(x) > 0$.

Se $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, +\infty)$ ossia $f(x) \sim Lg(x)$ per $x \rightarrow b^-$

EQUIVALENZA ASINTOTICA

allora

$$\int_a^b f(x) dx \text{ converge} \iff \int_a^b g(x) dx \text{ converge}$$

ESEMPI

- $\int_0^{+\infty} \left(\frac{3x^2+1}{4x^3+x+1} \right) dx$ è convergente? NO
 $\hookrightarrow 0$ e continua in $(0, +\infty)$

Per $x \rightarrow +\infty$,

$$\frac{3x^2+1}{4x^3+x+1} = \frac{\cancel{x^2}}{\cancel{x^3}} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{4 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} \sim \frac{3/4}{x} \quad \begin{array}{l} \alpha=1 \\ \text{int. in } [1, +\infty) \\ \text{è divergente} \end{array}$$

- $\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} \right) dx$ è convergente? SÌ
 $\hookrightarrow 0$ e continua in $(0, +\infty)$

I punti da indagare per la convergenza sono: 0^+ e $+\infty$.

Per $x \rightarrow 0^+$ $\frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} \sim \frac{1}{x^{1/2}} \quad \begin{array}{l} \alpha=1/2 < 1 \\ \text{int. in } (0, 1] \\ \text{è convergente} \end{array}$

Per $x \rightarrow +\infty$ $\frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} \sim \frac{1}{x^3} \quad \begin{array}{l} \alpha=3 > 1 \\ \text{int. in } [1, +\infty) \\ \text{è convergente} \end{array}$

Quindi l'integrale in $(0, +\infty)$ è convergente.

- Per quali $a > 0$ l'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x^2-1)^a} \right) dx \text{ è convergente?}$$

$\hookrightarrow 0$ e continua in $(1, +\infty)$

I punti da indagare sono: 1^+ e $+\infty$.

Per $x \rightarrow 1^+$

$$\frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x^2-1)^a} \sim \frac{1 \cdot (x-1)}{2^a (x-1)^a} \sim \frac{c}{(x-1)^{a-1}}$$

$\log(1+(x-1)) \sim (x-1)$
 $(x^2-1) = (x+1)(x-1)$

e l'int. in $(1, 2]$ è convergente se $a-1 < 1$
ossia se $a < 2$.

Per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x^2-1)^a} \sim \frac{\sqrt{x} \log(x)}{x^{2a}} \sim \frac{1}{x^{2a-\frac{1}{2}} \log^{-1}(x)}$$

e l'int. in $[2, +\infty)$ è convergente se

$2a - \frac{1}{2} > 1$ oppure $2a - \frac{1}{2} = 1$ e $-1 > 1$
ossia se $a > \frac{3}{4}$. impossibile

Quindi l'integrale in $(1, +\infty)$ è convergente
se e solo se valgono entrambe le condizioni

$$\frac{3}{4} < a < 2$$

- Per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio

$$\int_{1/2}^{3/2} \left(\frac{e^x}{\sqrt{x} |\sin(\pi x)|^a} \right) dx \text{ è convergente?}$$

$\leftarrow > 0$ e continua in $[1/2, 1) \cup (1, 3/2]$

Il punto da indagare per la convergenza
è: 1^\pm . Per $x \rightarrow 1^\pm$,

$$\frac{e^x}{\sqrt{x} |\sin(\pi x)|^a} \sim \frac{C}{|x-1|^a}$$



$\leftarrow \sin(\pi x) = -\sin(\pi(x-1)) \sim -\pi(x-1)$

e gli integrali in $[1/2, 1)$ e in $(1, 3/2]$ sono
convergenti se e solo se $a < 1$.

OSSERVAZIONE

Il caso in cui la funzione da integrare cambi segno infinite volte nell'intervallo di integrazione è in generale più difficile da analizzare. Si dimostra che

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ converge } \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ converge}$$



ESEMPIO

$$\begin{aligned} \bullet \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^{\alpha}} dx &= \int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} d(-\cos(x)) \\ &= \left[\frac{-\cos(x)}{x^{\alpha}} \right]_{\pi}^{+\infty} - \int_{\pi}^{+\infty} (-\cos(x)) d\left(\frac{1}{x^{\alpha}}\right) \\ &= -\frac{1}{\pi^{\alpha}} - \alpha \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^{\alpha+1}} dx \text{ è convergente } \forall \alpha > 0 \end{aligned}$$

Infatti:

$$\int_{\pi}^{+\infty} \left| \frac{\cos(x)}{x^{\alpha+1}} \right| dx \leq \int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx$$

$|\cos(x)| \leq 1$ $\alpha > 0 \Rightarrow \alpha+1 > 1$
convergente

e per (*) anche $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^{\alpha+1}} dx$ è convergente.

