

Lista 9 - Teorema Fundamental das Integrais de Linha

Determine se \mathbf{F} é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determine uma função f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

1. $\mathbf{F}(x, y) = (xy + y^2)\mathbf{i} + (x^2 + 2xy)\mathbf{j}$ Resposta: $\nexists f$

2. $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - 2x)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$ Resposta: **FAZER**

3. $\mathbf{F}(x, y) = y^2 e^{xy}\mathbf{i} + (1 + xy)e^{xy}\mathbf{j}$ Resposta: $f(x, y) = ye^{xy} + C$

4. $\mathbf{F}(x, y) = ye^x\mathbf{i} + (e^x + e^y)\mathbf{j}$ Resposta: **FAZER**

5. $\mathbf{F}(x, y) = (ye^x + \sin y)\mathbf{i} + (e^x + x \cos y)\mathbf{j}$ Resposta: $f(x, y) = ye^x + x \sin y + C$

6. $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2 - 2y^2)\mathbf{i} + (4xy + 3)\mathbf{j}$ Resposta: **FAZER**

7. $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 \cos x + \cos y)\mathbf{i} + (2y \sin x - x \sin y)\mathbf{j}$ Resposta: $f(x, y) = y^2 \sin x + x \cos y + C$

8. $\mathbf{F}(x, y) = \left(\ln y + \frac{y}{x}\right)\mathbf{i} + \left(\ln x + \frac{x}{y}\right)\mathbf{j}$ Resposta: $f(x, y) = x \ln y + y \ln x + C$

Determine uma função f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$ e use esse resultado para calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ sobre a curva C dada.

9. $\mathbf{F}(x, y) = (3 + 2xy^2)\mathbf{i} + 2x^2y\mathbf{j}$,
 C é o arco da hipérbole $y = \frac{1}{x}$ de $(1, 1)$ a $(4, \frac{1}{4})$ Resposta: $f(x, y) = 3x + x^2y^2 + C$; 9

10. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y^3\mathbf{i} + x^3y^2\mathbf{j}$,
 $C : \mathbf{r}(t) = \langle t^3 - 2t, t^3 + 2t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1$ Resposta: $f(x, y) = \frac{x^3y^3}{3} + C$; -9

11. $\mathbf{F}(x, y) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j}$,
 C é o arco da parábola $y = 2x^2$ de $(-1, 2)$ a $(2, 8)$ Resposta: **FAZER**

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + (xy + 2z)\mathbf{k}$,
 C é o segmento de reta de $(1, 0, -2)$ a $(4, 6, 3)$ Resposta: $f(x, y, z) = xyz + z^2 + C$; 77

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2z + 2xz^2)\mathbf{i} + 2xyz\mathbf{j} + (xy^2 + 2x^2z)\mathbf{k}$,
 $C : x = \sqrt{t}, \quad y = t + 1, \quad z = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$ Resposta: $f(x, y, z) = xy^2z + x^2z^2 + C$; 5

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = yze^{xz}\mathbf{i} + e^{xz}\mathbf{j} + xye^{xz}\mathbf{k}$,
 $C : \mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + (t^2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$ Resposta: $f(x, y, z) = ye^{xz} + C$; 4

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin y\mathbf{i} + (x \cos y + \cos z)\mathbf{j} - y \sin z\mathbf{k}$,
 $C : \mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ Resposta: $f(x, y, z) = x \sin y + y \cos z + C$; $1 - \frac{\pi}{2}$

Mostre que a integral de linha é independente do caminho e calcule-a.

16. $\int_C \tan y \, dx + x \sec^2 y \, dy, \quad C$ é qualquer caminho de $(1, 0)$ a $(2, \frac{\pi}{4})$ Resposta: **FAZER**

17. $\int_C (1 - ye^{-x}) dx + e^{-x} dy$, C é qualquer caminho de $(0, 1)$ a $(1, 2)$

Resposta: **FAZER**

Referência

STEWART, James. Cálculo: volume 2. 8ª ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. ISBN 9788522125845.