LIDIA NAILS

Gel Tip: guida all'applicazione

Metodo passo passo – uso interno

1. Cosa sono le Gel Tip

- Estensioni preformate in soft gel che coprono tutta l'unghia naturale: dalla cuticola al bordo libero e su entrambi i laterali (incapsulano l'unghia).
- Si applicano con il gel, non con la colla.
- Vantaggi: tempi dimezzati, forme e lunghezze identiche su tutte le dita, più controllo e più durata.
- Nessun punto di stress scoperto: l'unghia naturale è protetta per intero e il rischio di rottura netta cala molto.

2. Non confondere: tip classiche, press-on, dual form

- Tip classiche (anni 2000): estensioni parziali in plastica rigida incollate sul bordo libero, poi serve la struttura sopra.
- Gel Tip moderne: copertura totale in soft gel, applicate con gel.
- Press-on: unghie finte in ABS con colla, pensate per l'uso occasionale, non per il professionista. Mai applicarle con base gel: si formano bolle d'aria, umidità e rischio batteri.
- Dual form: tecnica manuale di ricostruzione con supporto in plastica da rimuovere. Non è una tip.

3. Gel vs plastica: come riconoscere la qualità

- La tip in gel è flessibile ma resistente: accompagna l'urto e torna in posizione. La plastica ABS è rigida e cede di colpo.
- Segnali d'allarme: prezzo molto basso (scatole da centinaia di pezzi a pochi euro; indicazione del corso: i marchi seri stanno sopra circa 30 € a scatola), materiale ABS, struttura sbagliata.
- Test pratico: limare un bordo di una tip. Odore di plastica bruciata = plastica. Il tipico odore di gel limato = gel.
- Non fidarsi del nome dell'azienda: un marchio può cambiare qualità nel tempo. Si impara a valutare la tip, non il brand.

4. Struttura corretta di una tip professionale

- Spessore distribuito, non uniforme: sottile al giro cuticola (si fonde con la cuticola), più spesso al bordo libero (regge gli urti).
- Giro cuticola tondo, a mezzaluna, senza angoli: l'unghia naturale non è squadrata.
- Profilo laterale morbido e armonioso, che copre bene i laterali e il punto di stress.
- Da evitare: apice troppo alto, discesa dritta 'a becco di pappagallo', angoli squadrati.
- Acquistare solo da schede che mostrano la tip da più angolazioni, anche di profilo.

5. Quale tip scegliere

- Trasparente (la preferita): si vede il gel camminare sotto la tip, quindi si capisce la quantità e dove arriva; la polimerizzazione lampo è rapida (circa 7-8 secondi) perché la luce penetra.
- Colorata: non si vede il gel, la luce penetra con più fatica (tempo più lungo, rischio che la cliente si muova), meno flessibile al giro cuticola. Meglio una passata di colore sopra.
- Semi-opaca di fabbrica: di solito opacizzata solo otticamente, resta liscia dentro e già più sottile. Va riopacizzata, quindi si scarta.

6. Lunghezze, forme e misure

- Lunghezze: XS, S, M, L, XL (esistono anche XXL).
- In Italia spesso si trova una sola lunghezza: scegliere fornitori con gamma completa evita di accorciare o raddoppiare le tip.
- Le misure ideali sono 14 (0–9 con le mezze misure): ogni numero è una larghezza precisa.
- Orientamento: 0–1 pollice (a volte 00 per pollici larghi), 2–6,5 le tre dita centrali, 7–9 mignolo.
- La numerazione cambia anche tra forme dello stesso brand, e tra mano destra e sinistra può variare di una misura.

7. Preparare l'unghia naturale

- Unghia naturale corta, pari al polpastrello, e stondata (mai angoli).
- Se resta lunga: la tip la fa sporgere, si tende ad appoggiarla inclinata 'a pappagallo', si tira dal giro cuticola e si formano tasche d'aria.
- Con l'unghia corta, se la tip si rompe cede solo il bordo libero della tip: l'unghia sotto resta protetta.
- Rimuovere tutto il vecchio prodotto (semipermanente, gel, acrilico): sotto la tip serve una superficie liscia. Solo se si rifà un set di tip si può lasciare un velo sottile di base.
- Dry manicure e pulizia cuticole come sempre.

8. Scegliere la misura sull'unghia

- Appoggiare la tip al centro e farla scorrere verso il basso, senza forzare sulla pelle.
- Deve combaciare con il punto di crescita e coprire entrambi i laterali, senza spazi e senza invadere la pelle.
- Se una è troppo piccola e l'altra un po' grande, scegliere la più grande: la tip in gel si flette leggermente.
- Una tip troppo piccola non si può allargare. Una troppo grande si può restringere con una passata leggera di lima sui laterali (pochi secondi).
- Se il problema si ripete su tutte le misure, è la forma della tip a essere sbagliata, non la tecnica.

9. Preparare la tip (interno)

- Mandrino con cilindro abrasivo (meglio se già usato; se nuovo, ammorbidirlo su una lima).
- Velocità 15.000–18.000 giri. Sotto i 15.000 la tip ballonzola, troppo alta la assottiglia.
- Opacizzare l'interno fino a dove arriva il letto ungueale: l'interno deve risultare ruvido e poroso.
- Movimento avanti-indietro al centro e sui laterali. Nel giro cuticola, all'inizio, solo in uscita; con l'esperienza anche avanti-indietro con micro movimenti.
- Fresa sempre parallela alla tip, mai di punta (rovina i laterali o buca).
- Mignolo: punta conica in ceramica, circa 15.000 giri.

10. Applicazione passo passo

- 1. Dry manicure e unghia corta e stondata.
- 2. Opacizzare l'interno della tip e spolverare tip e unghia.
- 3. Deidratante, poi primer acid-free (anche dentro la tip).
- 4. Base/extension gel sulla tip: una passata sottile 'a smalto' solo dove è opacizzata + una goccia scaricata nella tip.
- 5. Appoggiare già con l'inclinazione giusta (niente colpo a vuoto), premere al centro e scendere lentamente, il gel cammina fino a fine letto ungueale.
- 6. Polimerizzazione lampo 7-8 secondi per bloccare, poi 60 secondi in lampada.

11. Errori di inclinazione e quantità

- Movimento troppo veloce o troppo lento: il gel esce dai lati e sporca il giro cuticola.
- Colpo a vuoto o tip troppo vicina alla cuticola: scalino, bolle, pelle sporca.
- Il gel che 'cammina' indica la quantità giusta: né troppo né poco.
- Gel sbrodolato = rimozione lunga. Meglio prevenire con l'inclinazione corretta.

12. Rifinitura e colore

- Rimuovere il piccolo scalino al giro cuticola con punta dedicata, circa 18.000 giri: partire dal centro, mano leggera, stessa inclinazione del mandrino.
- Con la lima a grana fine solo una passata nel giro cuticola e intorno per togliere schegge.
- Pulire la punta sul buffer (i fori servono a liberare il gel) e riportare a velocità alta.
- Deidratante prima del colore. La tip è già lucida: non serve altro prima del colore.
- Colore: non partire dalla cuticola, un po' alla volta. Per i decori vicino alla cuticola, trattenere il respiro aiuta la precisione.

13. Rimozione e rifacimento

- Non esiste il refill: dopo 3–6 settimane si rimuove la tip e se ne applica una nuova.
- Tagliare la tip, poi rimuovere lucido e colore con la fresa: il remover non scioglie colore e top.
- Ammollo in remover per semipermanente per circa 5 minuti (oppure cotone + alluminio).
- Spingere via il gel con il pusher, una passata leggera di fresa per i residui, poi preparazione normale e nuova tip.
- Mentre una mano è in ammollo si lavora sull'altra: zero tempi morti.
- Vantaggio: la cliente può cambiare forma e lunghezza ad ogni appuntamento senza ricostruire nulla.

14. Messaggi chiave per la cliente

- Unghia naturale corta = unghia protetta: se prendi un colpo, si rompe solo la tip.
- Risultato più sottile e naturale, senza bordi spessi.
- Appuntamento ogni 3–6 settimane per rimozione e nuova applicazione.
- Mai staccare la tip da sola.

15. Anomalie: quando agire e quando inviare al medico

- Regola d'oro: noi curiamo l'estetica, non la salute. Mai prescrivere farmaci o antimicotici. Se qualcosa non ci è chiaro o non è normale: cliente dal medico o dermatologo.
- Criterio pratico: un trauma colpisce 1-3 unghie. Se l'anomalia è su molte o tutte le dita, ragionare come patologia e inviare dal medico.
- Onicolisi (distacco dell'unghia dal letto ungueale): da trauma parte dal bordo libero o dai laterali. Con sangue o dolore: accorciare, disinfettare, rimandare. Si lavora solo sulla parte ancora salda; se il distacco è circa metà unghia o più, non si ricostruisce.
- Distacco lieve (circa un terzo): tagliare la parte sollevata lasciando un bordo di sicurezza, applicare una copertura leggera. Evitare che il prodotto tocchi la pelle. Con la gel tip il gel va solo sulla zona salda; controllo dopo circa 2 settimane.
- Leuconichia (macchie bianche): di solito traumi o limature troppo aggressive. Su una o poche unghie si può lavorare con mano leggera; su tutte e dieci, medico.
- Emorragia a scheggia (linee sottili rosso scuro o bluastre sotto l'unghia): spesso un urto. Si può lavorare senza limare a fondo. Se è una linea lunga fino alla matrice o su più dita, medico.
- Onicomicosi (fungo): macchia bianca o gialla che parte dal bordo libero, unghia spessa o fragile. Non si lavora. Cliente dal medico, strumenti disinfettati o buttati (lime), mascherina, mai usare lo stesso strumento sulle altre dita.
- Pseudomonas (verde): nasce con umidità tra gel e unghia (sollevamenti, gel non polimerizzato, cuticole non sigillate). Giallino = inizio. Smontare, cambiare/sterilizzare gli strumenti, lasciare l'unghia scoperta circa 15 giorni (minimo una settimana). Verde scuro avanzato: farmacista o medico.
- Paronichia (infiammazione attorno all'unghia, rossore, calore, dolore): non lavorare, medico. Cause: errori tecnici (cuticole forate), onicofagia, tagli. Evitare di spingere strumenti sotto la cuticola.
- Allergie (rossore, prurito, bollicine, pelle che si screpola): quasi sempre contatto del prodotto con la pelle o gel non polimerizzato. Possono comparire anche dopo mesi. Rimuovere tutto, inviare al medico; si riprende solo con certificato. Valutare prodotti senza ingredienti sensibilizzanti noti.
- Prevenzione: prodotto mai sulla pelle (anche primer e colore), guanti e mani pulite, lampada e polimerizzazione corrette. Meglio perdere un appuntamento che la fiducia della cliente.

16. Materiali da avere

- Gel Tip trasparenti in gamma completa di misure e forme.
- Base/extension gel (anche rubber), deidratante, primer acid-free.
- Mandrino con cilindro abrasivo, punta conica in ceramica, punta per rimuovere lo scalino, buffer.
- Lampada/torcia per il blocco rapido.
- Rimozione: remover per semipermanente, vaschetta o ciotola, pusher, eventuale alluminio e pad.