Wo die Flusstheorie in der Ebene ohne Rotation versagt: ein Test mit dem Chaoskriterium der Literatur

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen die Flusstheorie dreier Körper mit der gemessenen Absorptivität in ebenen freien Fällen mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls und verlangen, wie in der Literatur, drei bis vier Durchmischungszustände vor der Flucht sowie dieselbe Schwelle bei Absorption und Emission. Mit 95 % Konfidenz und Holm-Korrektur besteht die Theorie in den Massenensembles 3-3-1 und 1-2-3 bei den Fluchtanteilen und bei der Endexzentrizität des Paares, versagt aber bei der Endexzentrizität des Ensembles 1-1-3. Dort wächst das Versagen mit der Tiefe des Chaos: Die Kolmogorov-Smirnov-Statistik steigt von 0,082 auf 0,126, und die gemessene mittlere Exzentrizität sinkt von 0,758 auf 0,735, gegenüber 0,784 und 0,779 vorhergesagt, durch einen Überschuss an Paaren mittlerer Exzentrizität in dem Kanal, in dem das Paar der Massen 3 und 1 übrig bleibt. Das Versagen stammt weder von den Rändern des Absorptivitätsgitters, die wir auch für nahezu radiale Paare gemessen haben, noch vom Maßstab des Chaos: Ein alternativer Maßstab, der demokratische Konfigurationen zählt, ergibt dasselbe Muster. Indem wir die Fluchten mit aufgezeichneter Geometrie neu berechnen, zeigen wir, dass nur im Ensemble 1-1-3 das Regime der letzten Episode die Endform des Paares stark verändert: Die mittlere Exzentrizität steigt von 0,70 in den am stärksten durchmischten Episoden auf 0,87 in den am stärksten hierarchischen. Zwei Erklärungen (mehr hierarchische Zeit und mehr Gedächtnis als im Ensemble 1-2-3) wurden geprüft und verworfen. Eine Replik mit neuen Startwerten bestätigt das Versagen. Eine Massenleiter 1-1-M von M = 2 bis 5 zeigt, dass es keine schmale Spitze ist: Mit Holm-Korrektur versagt bei der vollständigen Form nur die Replik von M = 3, die Nachbarn M = 2,75 und 3,25 bestehen, und die gemessene mittlere Exzentrizität liegt auf mehreren Stufen leicht unter der vorhergesagten, ein noch exploratives Muster. Der Mechanismus bleibt offen.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Flusstheorie; chaotische Absorptivität; Ergodizität; ebenes Problem; verschwindender Drehimpuls.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Kontakt: profwistuba01@gmail.com

Veröffentlicht: 5. November 2026. Version 1. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 15 von 15. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/onde-a-teoria-falha/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

In der Flusstheorie von Kol ist die Wahrscheinlichkeit jedes Ausgangs eines Dreikörpersystems das Produkt aus dem in geschlossener Form bekannten Fluss des Phasenvolumens und einer Absorptivität, die durch Simulation gemessen werden muss [1–3]. Die Theorie gilt für Fluchten, die aus chaotischer Bewegung hervorgehen, und deshalb berücksichtigen die Tests in der Literatur nur Fluchten, denen mindestens drei oder vier Durchmischungszustände vorausgehen [2, 4]. Ein neuerer Test im ebenen Fall fand Abweichungen und weckte den Verdacht, dass das Chaos in der Ebene den Phasenraum nicht vollständig durchmischt [5]. Dieser Test verwendete einen hohen Gesamtdrehimpuls und ließ das Regime geringer Rotation offen.

Die Notizen FR-TC-13 und FR-TC-14 haben die Theorie in der Ebene mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls geprüft, jedoch mit einem milderen Chaoskriterium von zwei Durchmischungen [6, 7]. Diese Notiz wiederholt den Test mit dem Kriterium der Literatur, untersucht zwei technische Ursachen für das gefundene Versagen und sucht seinen Mechanismus in der Geometrie der letzten chaotischen Episode.

II. METHODE

Die Simulationen sind die der vorherigen Notizen: eben, mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls und dem Kettenintegrator mit algorithmischer Regularisierung [8]. Wir verwenden drei Datensätze.

- **Freie Fälle:** 12.000 pro Massenensemble (1-1-3, 3-3-1, 1-2-3 und die Kontrolle 1-1-1), aus der Ruhe, mit der Zahl der Durchmischungen jeder Episode und der Exzentrizität des Endpaares [6].
- **Gemessene Absorptivität:** 26.400 Läufe pro Kanal (132 Zellen aus relativer Energie $x = E_B/E_0$ und Exzentrizität e bis 0,995, mit je 200 Läufen) sowie weitere 15.400 pro Kanal am Rand der nahezu radialen Paare (77 Zellen mit $j = \sqrt{1-e^2}$ von 0,09 bis 0,005, also e von 0,996 bis 0,99999), wobei die Durchmischungen vor der ersten Exkursion gezählt werden.
- **Geometrie:** die Fluchten mit tiefem Chaos, aus denselben Startwerten neu berechnet, wobei bei jedem Schritt das am stärksten gebundene Paar und die Position des dritten Körpers aufgezeichnet werden.
- **Replik und Massenleiter:** 12.000 neue freie Fälle des Ensembles 1-1-3 mit anderen Startwerten und eine Leiter

1-1-M mit M = 2; 2,5; 2,75; 3,25; 3,5; 4 und 5, jede Stufe mit 12.000 freien Fällen, einer eigenen, in beiden Kanälen gemessenen Absorptivität (einschließlich des Randes nahezu radialer Paare) und der Geometrie der letzten Episode.

Wir verwenden zwei Maßstäbe für das Chaos. Der erste zählt **Durchmischungen**, Abschnitte, in denen kein Paar den dritten Körper jenseits des Doppelten seiner großen Halbachse hat. Der zweite zählt **demokratische Konfigurationen**, die Maxima des Homologieradius oberhalb von 0,33, nach der Definition von Stone und Leigh [4]. In unseren Daten gehen beide Hand in Hand (Korrelation von 0,90 bis 0,95), und auf eine Durchmischung kommen im Mittel drei demokratische Konfigurationen.

Der Test ist einheitlich: Dieselbe Schwelle k gilt auf beiden Seiten. Bei der Absorption zählen wir mindestens k Ereignisse vor der ersten Exkursion; bei der Emission mindestens k in der letzten Episode vor der Flucht. Die Vorhersage ist der ebene Fluss mit dem Gewicht $x^{-2}e/\sqrt{1-e^2}$, multipliziert mit der gemessenen Absorptivität, interpoliert in $(\ln x, j)$ [5, 6]. In dieser Variablen ist das Gewicht des Flusses in der Exzentrizität gleichförmig, was dem Rand $e \to 1$ dieselbe Auflösung gibt wie dem übrigen Gitter. Die Endexzentrizität wird mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) verglichen, die Fluchtanteile mit dem χ^2-Test. Der kritische Wert des KS stammt aus 10.000 Neuziehungen der gemessenen Absorptivität und schließt damit die Unsicherheit der Vorhersage selbst ein. In den sechs Vergleichen jeder Familie (vollständige Form, Form bis $e = 0{,}995$ und Fluchtanteile) wird die Holm-Korrektur angewandt [9]. In der Leiter gilt die Korrektur für die 16 Tests mit neuen Daten jeder Familie (sieben Stufen und die Replik, mit k = 3 und 4), mit 500 Neustichproben. Die Analysen der Geometrie und der Sensitivität sind explorativ; der Zwillingstest wurde mit einer neuen Stichprobe bestätigt, getrennt von der in der Exploration verwendeten.

III. ERGEBNISSE

A. Die Theorie mit dem Kriterium der Literatur

Mit drei und vier Durchmischungen besteht die Theorie beide Fragen in den Ensembles 3-3-1 und 1-2-3 und fällt bei der Endexzentrizität des Ensembles 1-1-3 durch (Tabelle I). Mit zwei Durchmischungen fiel das Ensemble 3-3-1 durch [7]. Diese Ablehnung verschwindet bei tieferem Chaos, wie von einem Gedächtnis kurzer Reichweite zu erwarten. Die des Ensembles 1-1-3 wächst dagegen: KS steigt von 0,082 auf 0,126, und die gemessene mittlere Exzentrizität sinkt von 0,758 auf 0,735, gegenüber 0,784 und 0,779 vorhergesagt. Die Abweichung zeigt sich auch, wenn der Test auf die Paare mit $e \leq 0{,}995$ beschränkt wird, und stammt daher nicht vom Rand der nahezu radialen Paare. Die Fluchtanteile bestehen in allen Fällen (p von 0,13 bis 0,75 vor der Korrektur).

B. Zwei ausgeschlossene technische Ursachen

Ränder des Absorptivitätsgitters. In der Energie wurde die Absorptivität bis $x = 20$ gemessen, und darüber verwenden wir den letzten gemessenen Wert. Nur 0,2 % bis 0,6 % der vorhergesagten Fluchten fallen in diesen Bereich, und ersetzt man die Absorptivität dort durch null oder durch das Doppelte, ändert sich der KS des Ensembles 1-1-3 um höchstens 0,002. In der Exzentrizität wiegt der Rand schwerer: Der ebene Fluss legt etwa 10 % des Gewichts oberhalb von $e = 0{,}995$. Deshalb haben wir diesen Bereich direkt gemessen. Die Absorptivität ist dort kleiner als die der letzten Zelle des ursprünglichen Gitters, und der vorhergesagte Anteil der Paare oberhalb von 0,995 im Ensemble 1-1-3 mit vier Durchmischungen beträgt 7,6 %, nahe an den gemessenen 7,1 %. Der Rand erklärt etwa ein Viertel des Unterschieds in der mittleren Exzentrizität. Der Rest bleibt bestehen, auch im auf $e \leq 0{,}995$ beschränkten Test.

Wo die Abweichung liegt. Im Ensemble 1-1-3 macht die Flucht eines leichten Körpers, die das Paar der Massen 3 und 1 zurücklässt, 97 % der Fluchten aus, mit der vorhergesagten Häufigkeit (97,0 % gegenüber 97,3 % mit vier Durchmischungen). Innerhalb dieses Kanals enden 62,8 % der Paare mit $e \leq 0{,}872$, gegenüber 49,9 % vorhergesagt (548 Fluchten; mit drei Durchmischungen 58,3 % gegenüber 50,2 % bei 1.153 Fluchten). Es gibt einen Überschuss an Paaren mittlerer Exzentrizität innerhalb desselben Kanals.

Maßstab des Chaos. Mit dem Maßstab der demokratischen Konfigurationen wiederholt sich das Muster (Tabelle II). Mit sechs Konfigurationen, also flachem Chaos, fällt das Ensemble 3-3-1 durch und das Ensemble 1-1-3 besteht. Mit acht und zehn, was etwa drei Durchmischungen entspricht, bestehen die Ensembles 3-3-1 und 1-2-3, und das Ensemble 1-1-3 fällt durch, mit einer gemessenen mittleren Exzentrizität unterhalb der vorhergesagten. Das Versagen im Ensemble 1-1-3 hängt also nicht vom gewählten Maßstab ab.

C. Zwei Regime in der letzten Episode

Wir haben die Fluchten mit mindestens drei Durchmischungen in der letzten Episode neu berechnet: 1.181 im Ensemble 1-1-3, 1.159 im Ensemble 1-2-3, 1.223 im Ensemble 3-3-1 und 1.275 im Ensemble 1-1-1. In allen entkam derselbe Körper, und die Endexzentrizität stimmte mit der ursprünglichen überein. Wir teilen die Zeit der letzten Episode in zwei Arten. Im **hierarchischen** Regime ist das am stärksten gebundene Paar klar bestimmt, und der dritte Körper befindet sich jenseits des Doppelten seiner großen Halbachse. In den übrigen Abschnitten ist der dritte Körper nah, und die Paare wechseln sich ab.

Im Ensemble 1-1-3 hängt die Endexzentrizität stark vom hierarchischen Anteil der letzten Episode ab: Die Spearman-Korrelation beträgt +0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$), und die mittlere Exzentrizität steigt von 0,70 im Viertel mit der wenigsten hierarchischen Zeit auf 0,87 im Viertel mit der meisten (Abb. 1). In den anderen drei Ensembles ist der Zusammenhang schwach, zwischen +0,06 und +0,10 (Tabelle III). Paare, die nach einer stärker durchmischten Episode enden, kommen kreisförmiger heraus. Das passt zum Rückgang der mittleren Exzentrizität,

Tabelle I. Einheitlicher Test der Flusstheorie mit der gemessenen Absorptivität und dem Durchmischungsmaßstab. KS der Endexzentrizität, mit dem durch 10.000 Neuziehungen gewonnenen kritischen 95-%-Wert, und p vor der Korrektur, für alle Fluchten und nur für die mit $e \leq 0{,}995$. Gemessene und vorhergesagte mittlere Exzentrizität. Mit der Holm-Korrektur fällt nur das Ensemble 1-1-3 durch, in beiden Formtests.

k	Ensemble (n)	KS (kritisch)	p	KS bis 0,995 (kritisch)	p	mittleres e
3	1-1-3 (1.181)	0,082 (0,060)	0,004	0,101 (0,065)	0,0005	0,758 / 0,784
3	3-3-1 (1.223)	0,045 (0,064)	0,25	0,060 (0,071)	0,12	0,840 / 0,850
3	1-2-3 (1.159)	0,021 (0,058)	0,90	0,031 (0,063)	0,64	0,794 / 0,793
4	1-1-3 (565)	0,126 (0,088)	0,002	0,133 (0,093)	0,002	0,735 / 0,779
4	3-3-1 (604)	0,055 (0,093)	0,43	0,053 (0,104)	0,56	0,843 / 0,838
4	1-2-3 (552)	0,043 (0,084)	0,62	0,046 (0,091)	0,61	0,810 / 0,801

Tabelle II. Derselbe Test mit dem Maßstab der demokratischen Konfigurationen (Homologieradius oberhalb von 0,33), mit 100 Neuziehungen, ohne Korrektur für Mehrfachvergleiche und mit dem Absorptivitätsgitter bis $e = 0{,}995$, wobei darüber der letzte Wert wiederholt wird (explorativ). KS, mit dem kritischen 95-%-Wert in Klammern, und p; in eckigen Klammern die Zahl der Fluchten.

k	1-1-3	3-3-1	1-2-3
6	0,031 (0,040), $p = 0{,}29$ [2.556]	0,085 (0,044), $p < 0{,}01$ [2.963]	0,018 (0,044), $p = 0{,}83$ [2.463]
8	0,085 (0,056), $p < 0{,}01$ [1.517]	0,038 (0,065), $p = 0{,}49$ [1.408]	0,026 (0,054), $p = 0{,}79$ [1.371]
10	0,113 (0,075), $p < 0{,}01$ [988]	0,057 (0,082), $p = 0{,}34$ [989]	0,038 (0,075), $p = 0{,}65$ [909]




Abb. 1. Mittlere Endexzentrizität pro Viertel des hierarchischen Anteils der letzten Episode (1 = wenigste hierarchische Zeit, 4 = meiste), in den Fluchten mit mindestens drei Durchmischungen in der letzten Episode. Nur im Ensemble 1-1-3 verändert das Regime der letzten Episode die Form des Endpaares stark.

wenn tieferes Chaos verlangt wird.

Eine erste Hypothese, nach der das Ensemble 1-1-3 mehr Zeit im hierarchischen Regime verbringen würde, wurde vor der Messung in den Ensembles 1-1-1 und 3-3-1 festgehalten und bestätigte sich nicht: Das Ensemble 1-1-1 verbringt mehr Zeit hierarchisch (Median 0,55) und zeigt den Effekt nicht. Was das Ensemble 1-1-3 auszeichnet, ist nicht der Anteil jedes Regimes, sondern wie stark die beiden Regime zu unterschiedlichen Paaren führen.

D. Zwillingstest

Um das Gedächtnis direkt zu messen, halten wir jede Flucht zu Beginn ihrer letzten Episode an und starten von dort 20 Kopien, deren Positionen um einen Bruchteil δ der Systemskala gestört sind. Mit $\delta = 10^{-6}$ wiederholen die Kopien das Original praktisch (Streuung zwischen den Kopien von 0,06 bis 0,09, gegenüber 0,20 bis 0,23 im Ensemble), weil die Episode zu kurz ist, als dass das Chaos die Störung verstärken könnte, und der Test ist nicht aussagekräftig. Mit $\delta = 10^{-2}$, in einer neuen Stichprobe von 800 Fluchten pro Ensemble, beträgt die Korrelation zwischen der Endexzentrizität des Originals und dem Mittel der Kopien mit mindestens drei Durchmischungen 0,31 im Ensemble 1-1-3 (579 Originale; 95-%-Intervall von 0,23 bis 0,38) und 0,21 im Ensemble 1-2-3 (589 Originale; von 0,14 bis 0,29). Der Unterschied ist nicht signifikant ($p = 0{,}08$). Beide Ensembles bewahren ein ähnliches Gedächtnis, und das Ensemble 1-2-3 besteht den Test der Theorie trotzdem, sodass dieses Gedächtnis das Versagen im Ensemble 1-1-3 nicht erklärt. Ein gegenteiliges Ergebnis, das in einer Exploration mit 200 Fluchten auftrat, bestätigte sich nicht.

E. Replik und Massenleiter

Replik. Mit 12.000 neuen freien Fällen des Ensembles 1-1-3 wiederholt sich das Versagen (Tabelle IV). Der KS-Wert beträgt 0,101 mit drei und 0,126 mit vier Durchmischungen, und die gemessene mittlere Exzentrizität beträgt 0,750 und 0,738, gegenüber 0,784 und 0,779 vorhergesagt. In dem Kanal, in dem das Paar der Massen 3 und 1 übrig bleibt, enden 60,5 % der Paare mit $e \leq 0{,}872$, gegenüber 50,3 % vorhergesagt. Mit drei Durchmischungen versagt die Replik auch

Tabelle III. Anteil der letzten Episode im hierarchischen Regime (Median und Quartile) und Spearman-Korrelation zwischen diesem Anteil und der Endexzentrizität, in den Fluchten mit mindestens drei Durchmischungen in der letzten Episode.

Ensemble (n)	Hierarchischer Anteil: Median (Quartile)	Korrelation mit dem End-e
1-1-1 (1.275)	0,55 (0,44 bis 0,63)	+0,090 ($p = 0{,}001$)
1-1-3 (1.181)	0,41 (0,28 bis 0,53)	+0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$)
1-2-3 (1.159)	0,25 (0,14 bis 0,36)	+0,061 ($p = 0{,}04$)
3-3-1 (1.223)	0,16 (0,06 bis 0,27)	+0,095 ($p = 0{,}001$)

beim Anteil der Fluchten des schweren Körpers (3,95 % gemessen gegenüber 2,55 % vorhergesagt, $p = 0{,}003$), was in der ursprünglichen Stichprobe nicht der Fall war (2,37 %). Fasst man beide Stichproben zusammen, beträgt der Anteil 3,15 %, und der Unterschied ist nicht signifikant ($p = 0{,}07$). Mit vier Durchmischungen besteht der Fluchtanteil ($p = 0{,}38$).

Leiter. Um zu prüfen, ob das Versagen eine Spitze bei $M = 3$ ist, haben wir den Test im Ensemble 1-1-M mit sieben weiteren Werten der zentralen Masse wiederholt (Tabelle IV). Mit Holm-Korrektur versagt bei der vollständigen Form nur die Replik von $M = 3$, mit k = 3 und 4, und im auf $e \leq 0{,}995$ beschränkten Test die Replik und die Stufe $M = 2{,}5$ mit $k = 3$. Die Nachbarn M = 2,75 und 3,25 bestehen, mit einer Differenz der mittleren Exzentrizität nahe null; das Versagen ist also keine schmale Resonanz. Die Differenz zwischen gemessener und vorhergesagter mittlerer Exzentrizität ist ab 2,5 in den meisten Stufen negativ, und ihr 95-%-Intervall schließt die Null bei $M = 2{,}5$ (von $-0{,}047$ bis $-0{,}012$ mit $k = 3$) und bei $M = 5$ (von $-0{,}054$ bis $-0{,}007$) aus. Einen signifikanten Trend mit der Masse gibt es nicht: Die Steigung gegen $\ln M$ hat $p = 0{,}15$ mit $k = 3$ und $p = 0{,}59$ mit $k = 4$. Dieses kleine, breite Defizit wurde erst nach Sichtung der Daten bemerkt und ist explorativ.

Geometrie auf der Leiter. Die Verbindung zwischen dem hierarchischen Anteil der letzten Episode und der Endexzentrizität besteht auf jeder Stufe und ist nahe $M = 3$ am stärksten. Die Spearman-Korrelation beträgt +0,12 bei $M = 2$, +0,15 bei 2,5, +0,21 bei 2,75, +0,30 bei 3, +0,26 bei 3,25, +0,25 bei 3,5, +0,20 bei 4 und +0,16 bei 5. Sie ist auch bei M = 3,25 und 3,5 stark, wo die Theorie besteht, und reicht daher nicht aus, um das Versagen zu erklären.

Die Geometrie zeigt, wo zu suchen ist. Nur im Ensemble 1-1-3 verändert die Art der Bewegung in der letzten Episode die Endform: Stärker hierarchische Episoden ergeben exzentrische Paare, stärker durchmischte Episoden ergeben kreisförmige Paare. Das ist eine Korrelation, kein Beweis einer Ursache. Die Grenze zwischen den Regimen (das Doppelte der großen Halbachse) ist unsere Wahl. Die Massenleiter zeigt, dass diese Verbindung nahe $M = 3$, wo das Versagen am größten ist, am stärksten ist, aber auf benachbarten Stufen, auf denen die Theorie besteht, stark bleibt. Das nun replizierte Versagen des Ensembles 1-1-3 scheint der sichtbare Teil eines kleinen Exzentrizitätsdefizits zu sein, das auf mehreren Stufen auftritt; dieses Defizit zu bestätigen, erfordert neue Stichproben mit vorab festgelegter Toleranz.

Einschränkungen:

- alles gilt für ebene Simulationen mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls und vier Massenensembles;
- mit vier Durchmischungen bleiben 552 bis 683 Fluchten pro Ensemble;
- die Leiter verwendet 500 Neustichproben, und das breite Exzentrizitätsdefizit darin ist explorativ;
- die Analysen der Geometrie und Tabelle II sind explorativ;
- der Durchmischungsmaßstab ist nicht identisch mit dem der Referenzgruppen, obwohl der Maßstab der demokratischen Konfigurationen dasselbe Muster ergibt.

IV. DISKUSSION

Mit dem Chaoskriterium der Literatur beschreibt die Flusstheorie mit der gemessenen Absorptivität die Ebene ohne Gesamtrotation in zwei der drei geprüften Ensembles und versagt robust im Ensemble 1-1-3. Das Versagen stammt weder von den Rändern des Absorptivitätsgitters noch vom Maßstab des Chaos, es zeigt sich schon allein unter den Paaren mit $e \leq 0{,}995$, und es nimmt zu, wenn tieferes Chaos verlangt wird, im Gegensatz zu einem Gedächtniseffekt kurzer Reichweite. Das ist vereinbar mit dem Verdacht, dass die Durchmischung des Phasenraums in der Ebene unvollständig sein kann [5], nun im Regime verschwindender Rotation, und mit der in der Literatur beschriebenen Koexistenz regulärer und chaotischer Bereiche [10, 11].

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

- Mit drei und vier Durchmischungen, dem Kriterium der Literatur, besteht die Flusstheorie mit gemessener Absorptivität mit 95 % Konfidenz und Holm-Korrektur in den Ensembles 3-3-1 und 1-2-3, bei den Fluchtanteilen und bei der Endexzentrizität.
- Im Ensemble 1-1-3 versagt sie bei der Endexzentrizität, und das Versagen wächst mit der Tiefe des Chaos (KS von 0,082 auf 0,126; gemessene mittlere Exzentrizität von 0,758 auf 0,735, gegenüber 0,784 und 0,779 vorhergesagt). Die Abweichung ist ein Überschuss an Paaren mittlerer Exzentrizität in dem Kanal, in dem das Paar der Massen 3 und 1 übrig bleibt.

Tabelle IV. Kohärenter Test auf der Leiter 1-1-M, mit 500 Neustichproben. KS-Wert der Endexzentrizität, mit dem kritischen 95-%-Wert in Klammern; p vor der Korrektur, mit dem p des auf $e \leq 0{,}995$ beschränkten Tests in Klammern (0,002 ist der kleinstmögliche Wert bei 500 Neustichproben); Δe ist die gemessene minus die vorhergesagte mittlere Exzentrizität. Pro Stufe gibt es 1.138 bis 1.279 Fluchten mit $k = 3$ und 558 bis 683 mit $k = 4$.

M	KS, $k = 3$	p	Δe	KS, $k = 4$	p	Δe
2	0,053 (0,058)	0,092 (0,062)	+0,004	0,052 (0,085)	0,41 (0,37)	−0,006
2,5	0,075 (0,061)	0,016 (0,002)	−0,030	0,080 (0,088)	0,080 (0,042)	−0,028
2,75	0,036 (0,060)	0,43 (0,40)	−0,007	0,043 (0,089)	0,63 (0,66)	−0,008
3, ursprünglich	0,081 (0,059)	0,006 (0,002)	−0,026	0,125 (0,086)	0,004 (0,004)	−0,044
3, Replik	0,101 (0,060)	0,002 (0,002)	−0,035	0,126 (0,086)	0,002 (0,004)	−0,041
3,25	0,040 (0,060)	0,35 (0,47)	−0,018	0,035 (0,087)	0,83 (0,77)	−0,005
3,5	0,074 (0,066)	0,020 (0,006)	−0,019	0,085 (0,090)	0,078 (0,11)	−0,023
4	0,054 (0,060)	0,12 (0,060)	−0,019	0,041 (0,090)	0,73 (0,76)	+0,010
5	0,065 (0,066)	0,058 (0,072)	−0,030	0,082 (0,096)	0,11 (0,13)	−0,040

- Das Versagen stammt weder von den Rändern des Absorptivitätsgitters, die auch für nahezu radiale Paare gemessen wurden, noch vom Maßstab des Chaos.
- Nur im Ensemble 1-1-3 verändert das Regime der letzten Episode die Endform des Paares stark (von 0,70 bis 0,87 zwischen den Vierteln hierarchischer Zeit). Die Hypothesen „mehr hierarchische Zeit“ und „mehr Gedächtnis als das Ensemble 1-2-3“ wurden geprüft und verworfen.
- Eine Replik mit neuen Startwerten bestätigt das Versagen bei der Form. Auf der Leiter 1-1-M, von $M = 2$ bis 5, ist das Versagen keine schmale Spitze: Die Nachbarn 2,75 und 3,25 bestehen, und die gemessene Exzentrizität liegt auf mehreren Stufen leicht unter der vorhergesagten, ein noch exploratives Muster.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Wo die Flusstheorie in der Ebene ohne Rotation versagt: ein Test mit dem Chaoskriterium der Literatur“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-15 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/onde-a-teoria-falha/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[5] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-14 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[10] A. A. Trani, N. W. C. Leigh, T. C. N. Boekholt, and S. Portegies Zwart, Isles of regularity in a sea of chaos amid the gravitational three-body problem, arXiv:2403.03247 (2024). arxiv.org/abs/2403.03247

[11] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem: the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335