Onde a teoria de fluxo falha no plano sem rotação: um teste com o critério de caos da literatura

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos a teoria de fluxo de três corpos, com a absortividade medida, em quedas livres planas com momento angular total nulo, exigindo de três a quatro estados de embaralhamento antes da fuga, como na literatura, e o mesmo limiar na absorção e na emissão. Com 95% de confiança e correção de Holm, a teoria passa nos conjuntos de massas 3-3-1 e 1-2-3, nas frações de escape e na excentricidade final do par, mas falha na excentricidade final do conjunto 1-1-3. Ali, a falha cresce com a profundidade do caos: a estatística de Kolmogorov-Smirnov vai de 0,082 para 0,126, e a excentricidade média medida cai de 0,758 para 0,735, contra 0,784 e 0,779 previstas, por um excesso de pares de excentricidade moderada no canal em que sobra o par de massas 3 e 1. A falha não vem das bordas da grade de absortividade, que medimos também para pares quase radiais, nem da régua de caos: uma régua alternativa, de configurações democráticas, dá o mesmo padrão. Refazendo as fugas com a geometria gravada, mostramos que só no 1-1-3 o regime do último episódio muda fortemente o formato final do par: a excentricidade média vai de 0,70, nos episódios mais misturados, a 0,87, nos mais hierárquicos. Duas explicações (mais tempo hierárquico e mais memória que no 1-2-3) foram testadas e descartadas. Uma réplica com sementes novas confirma a falha. Uma escada de massas 1-1-M, de M = 2 a 5, mostra que ela não é um pico estreito: com a correção de Holm, só a réplica de M = 3 reprova no formato completo, os vizinhos M = 2,75 e 3,25 passam, e a excentricidade média medida fica levemente abaixo da prevista em vários degraus, padrão ainda exploratório. O mecanismo segue em aberto.

Palavras-chave: problema dos três corpos; teoria de fluxo; absortividade caótica; ergodicidade; problema plano; momento angular nulo.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Contato: profwistuba01@gmail.com

Publicado: 5 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 15 de 15. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a chance de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto do fluxo de volume de fase, conhecido em forma fechada, por uma absortividade, que precisa ser medida por simulação [1–3]. A teoria vale para escapes que vêm de movimento caótico, e por isso os testes da literatura só consideram escapes precedidos de pelo menos três ou quatro estados de embaralhamento [2, 4]. Um teste recente no caso plano encontrou discrepâncias e levantou a suspeita de que, no plano, o caos não chegue a misturar o espaço de fase [5]. Esse teste usou momento angular total alto e deixou em aberto o regime de rotação baixa.

As notas FR-TC-13 e FR-TC-14 testaram a teoria no plano com momento angular total nulo, mas com um critério de caos mais brando, de dois embaralhamentos [6, 7]. Esta nota refaz o teste com o critério da literatura, examina duas causas técnicas para a falha encontrada e procura o mecanismo dela na geometria do último episódio caótico.

II. MÉTODO

As simulações são as das notas anteriores: planas, com momento angular total nulo e o integrador de cadeia com regularização algorítmica [8]. Usamos três conjuntos de dados.

- **Quedas livres:** 12.000 por conjunto de massas (1-1-3, 3-3-1, 1-2-3 e o controle 1-1-1), a partir do repouso, com o número de embaralhamentos de cada episódio e a excentricidade do par final [6].
- **Absortividade medida:** 26.400 corridas por canal (132 células de energia relativa $x = E_B/E_0$ e excentricidade e até 0,995, com 200 corridas cada) e mais 15.400 por canal na borda dos pares quase radiais (77 células com $j = \sqrt{1-e^2}$ de 0,09 a 0,005, ou seja, e de 0,996 a 0,99999), contando os embaralhamentos antes da primeira excursão.
- **Geometria:** as fugas com caos profundo refeitas a partir das mesmas sementes, gravando a cada passo o par mais ligado e a posição do terceiro corpo.
- **Réplica e escada de massas:** 12.000 quedas livres novas do 1-1-3, com outras sementes, e uma escada 1-1-M com M = 2; 2,5; 2,75; 3,25; 3,5; 4 e 5, cada degrau com 12.000 quedas livres, a sua própria absortividade medida nos dois canais (com a borda dos pares quase radiais) e a geometria do último episódio.

Usamos duas réguas de caos. A primeira conta **embaralhamentos**, trechos em que nenhum par tem o terceiro corpo além de duas vezes o seu semieixo. A segunda conta **configurações democráticas**, os picos do raio de homologia acima de 0,33, que é a definição de Stone e Leigh [4]. Nos nossos dados, as duas andam juntas (correlação de 0,90 a 0,95), e há em média três configurações democráticas por embaralhamento.

O teste é coerente: o mesmo limiar k vale dos dois lados. Na absorção, contamos pelo menos k eventos antes da primeira

excursão; na emissão, pelo menos k no último episódio antes da fuga. A previsão é o fluxo plano, com peso $x^{-2}e/\sqrt{1-e^2}$, vezes a absortividade medida, interpolada em $(\ln x, j)$ [5, 6]. Nessa variável, o peso do fluxo em excentricidade é uniforme, o que dá à borda $e \to 1$ a mesma resolução do resto da grade. A excentricidade final é comparada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), e as frações de escape pelo teste χ^2. O valor crítico do KS vem de 10.000 reamostragens da absortividade medida, de modo que inclui a incerteza da própria previsão. Há correção de Holm nas seis comparações de cada família (formato completo, formato até $e = 0{,}995$ e frações de escape) [9]. Na escada, a correção vale para os 16 testes com dados novos de cada família (sete degraus e a réplica, com k = 3 e 4), com 500 reamostragens. As análises de geometria e as de sensibilidade são exploratórias; o teste dos gêmeos foi confirmado com uma amostra nova, separada da usada na exploração.

III. RESULTADOS

A. A teoria com o critério da literatura

Com três e quatro embaralhamentos, a teoria passa nas duas perguntas nos conjuntos 3-3-1 e 1-2-3 e falha na excentricidade final do 1-1-3 (Tabela I). Com dois embaralhamentos, o 3-3-1 reprovava [7]. Essa reprovação some com caos mais profundo, como esperado de uma memória de curto alcance. A do 1-1-3, ao contrário, cresce: o KS vai de 0,082 para 0,126, e a excentricidade média medida cai de 0,758 para 0,735, contra 0,784 e 0,779 previstas. O desvio aparece também quando o teste se restringe aos pares com $e \leq 0{,}995$, e por isso não vem da borda dos pares quase radiais. As frações de escape passam em todos os casos (p de 0,13 a 0,75 antes da correção).

B. Duas causas técnicas descartadas

Bordas da grade de absortividade. Em energia, a absortividade foi medida até $x = 20$, e acima disso usamos o último valor medido. Só de 0,2% a 0,6% das fugas previstas caem nessa faixa, e trocar a absortividade ali por zero ou pelo dobro muda o KS do 1-1-3 em no máximo 0,002. Em excentricidade, a borda pesa mais: o fluxo plano põe cerca de 10% do peso acima de $e = 0{,}995$. Por isso medimos essa faixa diretamente. A absortividade ali é menor que a da última célula da grade original, e a fração prevista de pares acima de 0,995 no 1-1-3 com quatro embaralhamentos é de 7,6%, próxima dos 7,1% medidos. A borda responde por cerca de um quarto da diferença na excentricidade média. O restante continua, inclusive no teste restrito a $e \leq 0{,}995$.

Onde está o desvio. No 1-1-3, a fuga de um corpo leve, que deixa o par de massas 3 e 1, responde por 97% das fugas, com frequência igual à prevista (97,0% contra 97,3% com quatro embaralhamentos). Dentro desse canal, 62,8% dos pares terminam com $e \leq 0{,}872$, contra 49,9% previstos (548 fugas; com três embaralhamentos, 58,3% contra 50,2% em 1.153 fugas). Há um excesso de pares de excentricidade moderada dentro do mesmo canal.




Fig. 1. Excentricidade final média por quarto da fração hierárquica do último episódio (1 = menos tempo hierárquico, 4 = mais), nas fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio. Só no 1-1-3 o regime do último episódio muda muito o formato do par final.

Régua de caos. Com a régua de configurações democráticas, o padrão se repete (Tabela II). Com seis configurações, caos raso, o 3-3-1 reprova e o 1-1-3 passa. Com oito e dez, equivalentes a cerca de três embaralhamentos, o 3-3-1 e o 1-2-3 passam e o 1-1-3 reprova, com a excentricidade média medida abaixo da prevista. A falha do 1-1-3 não depende, portanto, da régua escolhida.

C. Dois regimes no último episódio

Refizemos as fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio: 1.181 no 1-1-3, 1.159 no 1-2-3, 1.223 no 3-3-1 e 1.275 no 1-1-1. Em todas, o mesmo corpo escapou e a excentricidade final coincidiu com a original. Dividimos o tempo do último episódio em dois tipos. No **hierárquico**, o par mais ligado está bem definido e o terceiro corpo fica além de duas vezes o seu semieixo. Nos demais trechos, o terceiro está próximo e os pares se alternam.

No 1-1-3, a excentricidade final depende fortemente da fração hierárquica do último episódio: a correlação de Spearman é de +0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$), e a excentricidade média vai de 0,70 no quarto com menos tempo hierárquico a 0,87 no quarto com mais (Fig. 1). Nos outros três conjuntos, a relação é fraca, entre +0,06 e +0,10 (Tabela III). Pares que terminam após um episódio mais misturado saem mais circulares. Isso é coerente com a queda da excentricidade média quando se exige caos mais profundo.

Uma primeira hipótese, a de que o 1-1-3 passaria mais tempo no regime hierárquico, foi registrada antes da medida nos conjuntos 1-1-1 e 3-3-1 e não se confirmou: o 1-1-1 passa mais tempo hierárquico (mediana de 0,55) e não tem o efeito. O que distingue o 1-1-3 não é a proporção de cada regime, e sim o quanto os dois regimes levam a pares diferentes.

Tabela I. Teste coerente da teoria de fluxo com a absortividade medida e a régua de embaralhamentos. KS da excentricidade final, com o valor crítico de 95% obtido por 10.000 reamostragens, e p antes da correção, para todas as fugas e só para as com $e \leq 0{,}995$. Excentricidade média medida e prevista. Com a correção de Holm, só o 1-1-3 reprova, nos dois testes de formato.

k	Conjunto (n)	KS (crítico)	p	KS até 0,995 (crítico)	p	e médio
3	1-1-3 (1.181)	0,082 (0,060)	0,004	0,101 (0,065)	0,0005	0,758 / 0,784
3	3-3-1 (1.223)	0,045 (0,064)	0,25	0,060 (0,071)	0,12	0,840 / 0,850
3	1-2-3 (1.159)	0,021 (0,058)	0,90	0,031 (0,063)	0,64	0,794 / 0,793
4	1-1-3 (565)	0,126 (0,088)	0,002	0,133 (0,093)	0,002	0,735 / 0,779
4	3-3-1 (604)	0,055 (0,093)	0,43	0,053 (0,104)	0,56	0,843 / 0,838
4	1-2-3 (552)	0,043 (0,084)	0,62	0,046 (0,091)	0,61	0,810 / 0,801

Tabela II. O mesmo teste com a régua de configurações democráticas (raio de homologia acima de 0,33), com 100 reamostragens, sem correção para comparações múltiplas e com a grade de absortividade até $e = 0{,}995$, repetindo o último valor acima disso (exploratório). KS, com o valor crítico de 95% entre parênteses, e p; entre colchetes, o número de fugas.

k	1-1-3	3-3-1	1-2-3
6	0,031 (0,040), $p = 0{,}29$ [2.556]	0,085 (0,044), $p < 0{,}01$ [2.963]	0,018 (0,044), $p = 0{,}83$ [2.463]
8	0,085 (0,056), $p < 0{,}01$ [1.517]	0,038 (0,065), $p = 0{,}49$ [1.408]	0,026 (0,054), $p = 0{,}79$ [1.371]
10	0,113 (0,075), $p < 0{,}01$ [988]	0,057 (0,082), $p = 0{,}34$ [989]	0,038 (0,075), $p = 0{,}65$ [909]

D. Teste dos gêmeos

Para medir a memória diretamente, paramos cada fuga no início do seu último episódio e lançamos dali 20 cópias, com as posições perturbadas por uma fração δ da escala do sistema. Com $\delta = 10^{-6}$, as cópias praticamente repetem o original (desvio entre cópias de 0,06 a 0,09, contra 0,20 a 0,23 no conjunto), porque o episódio é curto demais para o caos ampliar a perturbação, e o teste não é informativo. Com $\delta = 10^{-2}$, numa amostra nova de 800 fugas por conjunto, a correlação entre a excentricidade final do original e a média das cópias com pelo menos três embaralhamentos é de 0,31 no 1-1-3 (579 originais; intervalo de 95% de 0,23 a 0,38) e de 0,21 no 1-2-3 (589 originais; de 0,14 a 0,29). A diferença não é significativa ($p = 0{,}08$). Os dois conjuntos guardam memória parecida, e o 1-2-3 passa no teste da teoria assim mesmo, de modo que essa memória não explica a falha do 1-1-3. Um resultado contrário, visto numa exploração com 200 fugas, não se confirmou.

E. Réplica e escada de massas

Réplica. Com 12.000 quedas livres novas do 1-1-3, a falha se repete (Tabela IV). O KS é de 0,101 com três embaralhamentos e de 0,126 com quatro, e a excentricidade média medida é de 0,750 e 0,738, contra 0,784 e 0,779 previstas. No canal em que sobra o par de massas 3 e 1, 60,5% dos pares terminam com $e \leq 0{,}872$, contra 50,3% previstos. Com três embaralhamentos, a réplica reprova também na fração de fugas do corpo pesado (3,95% medidos contra 2,55% previstos, $p = 0{,}003$), o que não ocorria na amostra original (2,37%). Somadas as duas amostras, a fração é de 3,15%, e a diferença não é significativa ($p = 0{,}07$). Com quatro embaralhamentos, a fração de escape passa ($p = 0{,}38$).

Escada. Para saber se a falha é um pico em $M = 3$, repetimos o teste no 1-1-M com sete outros valores da massa central (Tabela IV). Com a correção de Holm, reprovam no formato completo só a réplica de $M = 3$, com k = 3 e 4, e, no teste restrito a $e \leq 0{,}995$, a réplica e o degrau $M = 2{,}5$ com $k = 3$. Os vizinhos M = 2,75 e 3,25 passam, com diferença de excentricidade média perto de zero, e por isso a falha não é uma ressonância estreita. A diferença entre a excentricidade média medida e a prevista é negativa na maioria dos degraus a partir de 2,5, e o intervalo de 95% dela exclui o zero em $M = 2{,}5$ (de $-0{,}047$ a $-0{,}012$ com $k = 3$) e em $M = 5$ (de $-0{,}054$ a $-0{,}007$). Não há tendência significativa com a massa: a inclinação contra $\ln M$ tem $p = 0{,}15$ com $k = 3$ e $p = 0{,}59$ com $k = 4$. Esse déficit pequeno e amplo foi notado depois de ver os dados e é exploratório.

Geometria na escada. A ligação entre a fração hierárquica do último episódio e a excentricidade final existe em todos os degraus e é máxima perto de $M = 3$. A correlação de Spearman é de +0,12 em $M = 2$, +0,15 em 2,5, +0,21 em 2,75, +0,30 em 3, +0,26 em 3,25, +0,25 em 3,5, +0,20 em 4 e +0,16 em 5. Ela é forte também em M = 3,25 e 3,5, onde a teoria passa, e por isso não basta para explicar a falha.

IV. DISCUSSÃO

Com o critério de caos da literatura, a teoria de fluxo com a absortividade medida descreve o plano sem rotação total em dois dos três conjuntos testados e falha de forma robusta no 1-1-3. A falha não vem das bordas da grade de absortividade nem da régua de caos, aparece também quando se consideram só os pares com $e \leq 0{,}995$ e aumenta quando se exige caos mais profundo, ao contrário de um efeito de memória de curto

Tabela III. Fração do último episódio no regime hierárquico (mediana e quartis) e correlação de Spearman entre essa fração e a excentricidade final, nas fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio.

Conjunto (n)	Fração hierárquica: mediana (quartis)	Correlação com e final
1-1-1 (1.275)	0,55 (0,44 a 0,63)	+0,090 ($p = 0{,}001$)
1-1-3 (1.181)	0,41 (0,28 a 0,53)	+0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$)
1-2-3 (1.159)	0,25 (0,14 a 0,36)	+0,061 ($p = 0{,}04$)
3-3-1 (1.223)	0,16 (0,06 a 0,27)	+0,095 ($p = 0{,}001$)

Tabela IV. Teste coerente na escada 1-1-M, com 500 reamostragens. KS da excentricidade final, com o valor crítico de 95% entre parênteses; p antes da correção, com o p do teste restrito a $e \leq 0{,}995$ entre parênteses (0,002 é o menor valor possível com 500 reamostragens); Δe é a excentricidade média medida menos a prevista. Há de 1.138 a 1.279 fugas por degrau com $k = 3$ e de 558 a 683 com $k = 4$.

M	KS, $k = 3$	p	Δe	KS, $k = 4$	p	Δe
2	0,053 (0,058)	0,092 (0,062)	+0,004	0,052 (0,085)	0,41 (0,37)	−0,006
2,5	0,075 (0,061)	0,016 (0,002)	−0,030	0,080 (0,088)	0,080 (0,042)	−0,028
2,75	0,036 (0,060)	0,43 (0,40)	−0,007	0,043 (0,089)	0,63 (0,66)	−0,008
3, original	0,081 (0,059)	0,006 (0,002)	−0,026	0,125 (0,086)	0,004 (0,004)	−0,044
3, réplica	0,101 (0,060)	0,002 (0,002)	−0,035	0,126 (0,086)	0,002 (0,004)	−0,041
3,25	0,040 (0,060)	0,35 (0,47)	−0,018	0,035 (0,087)	0,83 (0,77)	−0,005
3,5	0,074 (0,066)	0,020 (0,006)	−0,019	0,085 (0,090)	0,078 (0,11)	−0,023
4	0,054 (0,060)	0,12 (0,060)	−0,019	0,041 (0,090)	0,73 (0,76)	+0,010
5	0,065 (0,066)	0,058 (0,072)	−0,030	0,082 (0,096)	0,11 (0,13)	−0,040

alcance. Isso é compatível com a suspeita de que, no plano, a mistura do espaço de fase pode ser incompleta [5], agora no regime de rotação nula, e com a coexistência de regiões regulares e caóticas descrita na literatura [10, 11].

A geometria indica onde procurar. Só no 1-1-3 o tipo de movimento do último episódio muda o formato final: episódios mais hierárquicos dão pares excêntricos, e episódios mais misturados dão pares circulares. Isso é uma correlação, não uma prova de causa. A fronteira entre os regimes (duas vezes o semieixo) é uma escolha nossa. A escada de massas mostra que essa ligação é máxima perto de $M = 3$, onde a falha é maior, mas que continua forte em degraus vizinhos em que a teoria passa. A falha do 1-1-3, replicada, parece ser a parte visível de um déficit pequeno de excentricidade que aparece em vários degraus; confirmar esse déficit exige amostras novas com a tolerância fixada antes.

Limitações:

- tudo vale para simulações planas com momento angular total nulo e quatro conjuntos de massas;
- com quatro embaralhamentos restam de 552 a 683 fugas por conjunto;
- a escada usa 500 reamostragens, e o déficit amplo de excentricidade nela é exploratório;
- as análises de geometria e a Tabela II são exploratórias;
- a régua de embaralhamentos não é idêntica à usada pelos grupos de referência, embora a régua de configurações democráticas dê o mesmo padrão.

V. CONCLUSÕES

- Com três e quatro embaralhamentos, o critério da literatura, a teoria de fluxo com absortividade medida passa, com 95% de confiança e correção de Holm, nos conjuntos 3-3-1 e 1-2-3, nas frações de escape e na excentricidade final.
- No conjunto 1-1-3, ela falha na excentricidade final, e a falha cresce com a profundidade do caos (KS de 0,082 para 0,126; excentricidade média medida de 0,758 para 0,735, contra 0,784 e 0,779 previstas). O desvio é um excesso de pares de excentricidade moderada no canal em que sobra o par de massas 3 e 1.
- A falha não vem das bordas da grade de absortividade, medidas também para pares quase radiais, nem da régua de caos.
- Só no 1-1-3 o regime do último episódio muda fortemente o formato final do par (de 0,70 a 0,87 entre quartos de tempo hierárquico). As hipóteses de “mais tempo hierárquico” e de “mais memória que o 1-2-3” foram testadas e descartadas.
- Uma réplica com sementes novas confirma a falha no formato. Na escada 1-1-M, de $M = 2$ a 5, a falha não é um pico estreito: os vizinhos 2,75 e 3,25 passam, e a excentricidade medida fica levemente abaixo da prevista em vários degraus, padrão ainda exploratório.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Onde a teoria de fluxo falha no plano sem rotação: um teste com o critério de caos da literatura. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-15, 5 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[5] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-14 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[10] A. A. Trani, N. W. C. Leigh, T. C. N. Boekholt, and S. Portegies Zwart, Isles of regularity in a sea of chaos amid the gravitational three-body problem, arXiv:2403.03247 (2024). arxiv.org/abs/2403.03247

[11] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem: the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335