

Willy Xiao and Kevin Eskici
 STAT 221
 Pset 4
 Nov 4, 2014

question 1. 1 $p(\lambda, \theta) \propto \lambda^{-1}$

$$\begin{bmatrix} N \\ \theta \end{bmatrix} = f \left(\begin{bmatrix} \lambda \\ \theta \end{bmatrix} \right)$$

$$p(N, \theta) = p(\lambda, \theta) * \left\| \begin{bmatrix} \frac{\partial \lambda}{\partial N} & \frac{\partial \theta}{\partial N} \\ \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} & \frac{\partial \theta}{\partial \theta} \end{bmatrix} \right\|$$

$$\text{Our Jacobian is } \begin{vmatrix} \theta & -\lambda N^{-2} \\ N & 1 \end{vmatrix}$$

and its determinant is $\theta + \frac{\lambda}{N}$

$$\begin{aligned} p(N, \theta) &\propto \frac{1}{\theta N} * \left(\theta + \frac{\lambda}{N} \right) \\ &= \frac{1}{\theta N} * \left(\theta + \frac{\theta N}{N} \right) \\ &= \frac{2}{N} \\ &\propto \frac{1}{N} \end{aligned}$$

2 It is an improper prior: $\int_0^\infty \int_0^1 \lambda^{-1} d\theta d\lambda \rightarrow \ln(\infty) - \ln(0)$. This cannot integrate to 1 with any constant factor.

3

4 See R code

5 Posterior for N

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \left(\prod_{i=1}^n \binom{N}{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{N-x_i} \right) * \frac{1}{N} d\theta \\ &= \int_0^1 \left(\prod_{i=1}^n \binom{N}{x_i} \right) \theta^{\sum x_i} (1-\theta)^{nN - \sum x_i} * \frac{1}{N} d\theta \\ &= \frac{1}{N} \int_0^1 \theta^{\sum x_i} (1-\theta)^{nN - \sum x_i} \prod_{i=1}^n \binom{N}{x_i} d\theta \\ &= \frac{1}{N} \prod_{i=1}^n \binom{N}{x_i} \int_0^1 \theta^{\sum x_i} (1-\theta)^{nN - \sum x_i} d\theta \end{aligned}$$

If we define $S = \sum x_i$, the integral above has the form of a

Beta($\alpha = S + 1, \beta = nN - S + 1$) pdf

Using this we get, $\frac{(S!)(nN-S)!}{(nN+1)!N}$, which when $n = 1$, $\rightarrow \frac{x_i}{N(N+1)}$