



SVM


Boosting , Stacking



Support Vector Machine , (*SVM*)


- 지도 학습 모델
- 분류, 회귀 문제
- 탄탄한 이론을 바탕으로 높은 성능을 보여
딥러닝 이전 인기가 많았던 모델

문제 상황




- Two Classification 문제
- 빨간점과 파란점을 나누는 수많은 경계면이 존재함

그렇다면, 최적의 경계면은 무엇일까?




"Wide street strategy"

- 마진의 넓이를 최대화 하는 경계면!



결정 경계 (Decision Boundary)	데이터의 분류 기준이 되는 경계
서포트 벡터 (Support Vector)	학습 데이터 중에서 결정 경계와 가장 가까이 있는 데이터들의 집합
마진 (Margin)	결정 경계에서 서포트 벡터까지의 거리



\vec{w} : 경계면에 직교하는 벡터

\vec{u} : 임의의 벡터

[문제]

\vec{u} 가 경계면을 기준으로 어디에 (+,-) 속하는가?


[해결]

\vec{w} 와 \vec{u} 를 내적인 값이 상수 C 보다 큰가?

크다면, '+' 작다면, '-'

$$\vec{w} \cdot \vec{u} \geq \underline{C}$$

$$\underline{\vec{w} \cdot \vec{u} + b \geq 0 \text{ then '+'}}$$



\vec{w} : 경계면에 직교하는 벡터
 x_+ : '+' 샘플
 x_- : '-' 샘플

1. 어떤 샘플에 대해

$$\vec{w} \cdot x_+ + b \geq 1$$

$$\vec{w} \cdot x_- + b \leq -1$$

2. 수학적 편리성을 위해 변수를 추가

$$y_i \begin{cases} 1 & \text{for '+'} \\ -1 & \text{for '-' } \end{cases}$$


3.1에 곱해서 수식을 하나로 정리

$$y_i(\vec{w} \cdot x_i + b) \geq 1$$

정리하면

$$y_i(\vec{w} \cdot x_i + b) - 1 \geq 0$$

* 등호가 성립할 때 : 샘플이 노란 선에 걸쳐질 때



\vec{w} : 경계면에 직교하는 벡터
 \vec{x}_+ : '+' 샘플
 \vec{x}_- : '-' 샘플

우리의 목적 : 마진의 폭을 최대로


마진의 폭 : 두 벡터 \vec{x}_+ , \vec{x}_- 사이의 폭

$$WIDTH = (\vec{x}_+ - \vec{x}_-) \cdot \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$$

이때, $\left\{ \begin{array}{l} \vec{w} \cdot x_+ + b \geq 1 \\ \vec{w} \cdot x_- + b \leq -1 \end{array} \right.$ 를 이용해서 정리

마진은

$$WIDTH = \frac{2}{\|\vec{w}\|}$$



마진의 넓이 : $WIDTH = \frac{2}{\|\vec{w}\|}$

제약식 : $y_i(\vec{w} \cdot x_i + b) - 1 \geq 0$

우리의 목적 : 마진의 폭을 최대로


$$\max \frac{1}{\|\vec{w}\|} \leftrightarrow \min \|\vec{w}\| \leftrightarrow \min \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2$$

라그랑주 승주법 적용

*제약 조건이 있는 최적화 문제를 제약 조건이 없는 문제로 바꾸기 위해

$$\mathcal{L}(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2 - \sum_{i=1}^N \alpha_i [y_i(\vec{w} \cdot \vec{x}_i + b) - 1]$$

minimize w.r.t. \vec{w} and b maximize w.r.t. $\alpha_i \geq 0 \quad \forall i$



마진의 넓이 : $WIDTH = \frac{2}{\|\vec{w}\|}$

제약식 : $y_i(\vec{w} \cdot x_i + b) - 1 \geq 0$

라그랑주 승주법 적용

*제약 조건이 있는 최적화 문제를 제약 조건이 없는 문제로 바꾸기 위해

$$\mathcal{L}(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2 - \sum_{i=1}^N \alpha_i [y_i (\vec{w} \cdot \vec{x}_i + b) - 1]$$

minimize w.r.t. \vec{w} and b maximize w.r.t. $\alpha_i \geq 0 \quad \forall i$

\vec{w} 와 b 에 대해 각각 편미분


$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{w}} \mathcal{L} &= \vec{w} - \sum_i \alpha_i y_i \vec{x}_i = 0 \\ \nabla_b \mathcal{L} &= - \sum_i \alpha_i y_i = 0 \end{aligned}$$

$$\vec{w} = \sum_i \alpha_i y_i \vec{x}_i$$



α 에 대한 maximization 문제로 정리

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \alpha_i + \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2 - \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i \vec{w}^T \vec{x}_i &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \alpha_i + \frac{1}{2} \vec{w}^T \vec{w} - \vec{w}^T \vec{w} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \vec{w}^T \vec{w} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j \vec{x}_i^T \vec{x}_j \\ &\Leftrightarrow \mathcal{L}(\alpha). \end{aligned}$$



마진의 넓이 : $WIDTH = \frac{2}{\|\vec{w}\|}$

제약식 : $y_i(\vec{w} \cdot \vec{x}_i + b) - 1 \geq 0$


1. α 를 구하면 \vec{w} 를 구할 수 있음

2. α 값이 0이 아니라는 것은 해당 \vec{x} 가 경계선을 정하는 샘플
즉, Support Vector 라는 뜻


3. $L(\alpha)$ 식의 성질에 의해

"SVM으로 구한 해는 항상 (현재 SVM)이 줄 수 있는 최적의 해"
임을 이론적으로 보장. -> local minima에 빠지지 않음

결론




support vector들로 정해진 decision boundary가 가장 최적의 boundary이며,
새로운 샘플이 들어왔을 때 일반화를 가장 잘 할 수 있는
decision rule을 찾을 수 있게 된 것



하드 마진 SVM (Hard Margin SVM)

- 오분류를 허용하지 않는 SVM
- 노이즈로 인해 최적의 결정 경계를 잘 못 구하거나, 못 찾을 수 있음



소프트 마진 SVM (Soft Margin SVM)


- 오분류를 허용하는 SVM
- 하드 마진 SVM은 적용하기가 어려우므로 어느 정도의 오류를 허용하는 소프트 마진 SVM을 주로 이용

Soft Margin SVM – 슬랙 변수




둘 중 최적의 경우는?

Hard



마진 ↓, 오분류 X


Soft



마진 ↑, 오분류 0

일반적으로 마진과 학습 오류의 개수는 Trade-Off 관계임


Soft Margin SVM – 슬랙 변수



슬랙 변수 (Slack Variables)

데이터의 완벽한 분리가 불가능 할 때, 선형적 분류를 위해 허용된 오차를 위한 변수

C - SVM



- Soft Margin SVM
- 엡실론만큼 패널티를 부과
- C의 크기로 마진의 폭을 조절

*중치



목적식 변화

$$\min \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$


데이터 분류가 비선형일 경우



not
linearly
separable



Kernel Trick (비선형일 경우)



" Kernel trick "

비선형인 경우 저차원 공간을 고차원 공간으로 매핑하는 방법
"커널 함수"를 이용하여 고차원 공간으로 매핑하는 경우에
증가하는 연산량의 문제를 해결하는 기법

주로 사용하는 커널 함수

Type of Kernel	Inner product kernel $K(\vec{x}, \vec{x}_i), i = 1, 2, \dots, N$	Comments
Polynomial Kernel	$K(\vec{x}, \vec{x}_i) = (\vec{x}^T \vec{x}_i + \theta)^d$	Power p and threshold θ is specified a priori by the user
Gaussian Kernel	$K(\vec{x}, \vec{x}_i) = e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \ \vec{x} - \vec{x}_i\ ^2}$	Width σ^2 is specified a priori by the user
Sigmoid Kernel	$K(\vec{x}, \vec{x}_i) = \tanh(\eta \vec{x}^T \vec{x}_i + \theta)$	Mercer's Theorem is satisfied only for some values of η and θ
Kernels for Sets	$K(\chi, \chi') = \sum_{i=1}^{N_\chi} \sum_{j=1}^{N_{\chi'}} k(x_i, x'_j)$	Where $k(x_i, x'_j)$ is a kernel on elements in the sets χ, χ'
Spectrum Kernel for strings	count number of substrings in common	It is a kernel, since it is a dot product between vectors of indicators of all the substrings.

이중, 가우시안 커널 을 가장 많이 사용함
가우시안 커널 (= RBF , Radial Basis Fuction)



Sklearn 라이브러리는 다양한 SVM 모델을 지원함

상황	모델	
분류 문제	SVC	Classification의 C
	LinearSVC	SVC의 linear kernel 특화 버전
회귀 문제	SVR	Regression의 R
	LinearSVR	SVR의 linear kernel 특화 버전




SVM의 매개변수

C, gamma




C : 소프트 마진 SVM의 슬랙변수



C가 너무 낮으면 과소 적합
C가 너무 높으면 과대 적합



gamma : 가우시안 함수의 표준편차와 관련 있는 매개변수



Gamma 는 RBF 커널에서
하나의 데이터 샘플이 영향력을 행사하는 거리를 나타냄

Gamma가 크면 데이터 포인트들이 영향력을 행사하는 거리가 짧아지고
Gamma가 낮으면 영향력을 행사하는 거리가 커짐


Gamma가 너무 낮으면 과소 적합
Gamma가 너무 크면 과대 적합



C 커짐



Gamma 커짐



Gamma가 동일한 경우
C가 커질 수록 오분류 인정 X

C가 동일한 경우
gamma가 커질 수록 곡률 높음



C, gamma

C 커짐 →

Gamma 커짐 ↓

$2^{-5}, 2^{-15}$	$2^{-3}, 2^{-15}$		$2^{11}, 2^{-15}$	$2^{13}, 2^{-15}$
$2^{-5}, 2^{-13}$	$2^{-3}, 2^{-13}$		$2^{11}, 2^{-13}$	$2^{13}, 2^{-13}$
$2^{-5}, 2^{-11}$	$2^{-3}, 2^{-11}$		$2^{11}, 2^{-11}$	$2^{13}, 2^{-11}$
$2^{-5}, 2^{-9}$	$2^{-3}, 2^{-9}$		$2^{11}, 2^{-9}$	$2^{13}, 2^{-9}$
$2^{-5}, 2^{-7}$	$2^{-3}, 2^{-7}$...	$2^{11}, 2^{-7}$	$2^{13}, 2^{-7}$
$2^{-5}, 2^{-5}$	$2^{-3}, 2^{-5}$		$2^{11}, 2^{-5}$	$2^{13}, 2^{-5}$
$2^{-5}, 2^{-3}$	$2^{-3}, 2^{-3}$		$2^{11}, 2^{-3}$	$2^{13}, 2^{-3}$
$2^{-5}, 2^{-1}$	$2^{-3}, 2^{-1}$		$2^{11}, 2^{-1}$	$2^{13}, 2^{-1}$
$2^{-5}, 2^1$	$2^{-3}, 2^1$		$2^{11}, 2^1$	$2^{13}, 2^1$
$2^{-5}, 2^3$	$2^{-3}, 2^3$		$2^{11}, 2^3$	$2^{13}, 2^3$

Grid search

매개변수들의 여러 조합들을 테스트
해서 가장 좋은 성능을 내는 매개변수
를 찾아내는 것



SVM 수식 이해 참고자료

Youtube - MIT OpenCourseWare ★★★★★

<https://www.youtube.com/watch?v=PwhiWxHK8o&t=6s>

Blog - JaeJun Yoon's Playground ★★★★★

<http://jaejunyoo.blogspot.com/2018/01/support-vector-machine-1.html>

SVM 종류

Blog - 라온피플 ★★★★★

<https://blog.naver.com/laonple/220847975603>

Blog - 귀통이 서재 ★★★★★

<https://bkshin.tistory.com/entry/%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-2%EC%84%9C%ED%8F%AC%ED%8A%B8-%EB%B2%A1%ED%84%B0-%EB%A8%B8%EC%8B%A0-SVM>

SVM 사용하기

Blog - bskyVision ★★★★★

<https://blueskyvision.tistory.com/163>

Blog - 코딩생활 커딩왕 ★★★★★

<https://chancoding.tistory.com/67>