

Diskrepansi Indeks Kardiometabolik: Perbedaan Karakteristik Kohort

Modifikasi anatomi plak (HRP) akibat penggunaan statin pada sampel kecil mengaburkan signifikansi prediksi lipid awal.

Won et al. (2018) (Ideal / Asimptomatik)	Jin et al. (2018) (CAD Stabil / Kohort Masif)	Kohort Saat Ini (Real-World / Anatomi HRP)
POPULASI N = 2.560 Subjek sehat berbasis komunitas tanpa riwayat CAD	POPULASI N = 3.745 Pasien penyakit arteri koroner (CAD) stabil	POPULASI N = 52 Pasien rujukan kardiologi berisiko tinggi
PENGUNAAN STATIN Tidak Ada / Sangat Rendah (Populasi sehat skrining)	PENGUNAAN STATIN Tinggi (~74,7%) Menggunakan obat penurun lipid	PENGUNAAN STATIN Sangat Intensif (71,2%) Mengaburkan patologi alamiah plak
FOKUS LUARAN (END-POINT) Kekakuan Arteri (Diukur melalui baPWV)	FOKUS LUARAN (END-POINT) Kejadian Kardiovaskular Keras (Mortalitas, MI, Stroke)	FOKUS LUARAN (END-POINT) Morfologi Plak (Status HRP) Paling rentan dimodifikasi statin
HASIL PREDIKSI TyG Signifikan (p < 0,001)	HASIL PREDIKSI TyG Signifikan (p = 0,005)	HASIL PREDIKSI Tidak Signifikan