
 RSPMC	PENANGGULANGAN PENDARAHAN PADA KEHAMILAN MUDA / ABORTUS		
	No. Dokumen 262/SPO/VK/RS PMC/XI-20	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03 November 2020	 Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center dr. Erythrina M. MMRS NIK. 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Tata cara dalam melakukan pertolongan pendarahan pada kehamilan muda atau berakhirnya kehamilan sebelum <i>viable</i> , disertai dengan atau tanpa pengeluaran hasil konsepsi untuk menentukan derajat abortus dan memberikan pertolongan sesuai dengan derajatnya	
TUJUAN	Sebagai pedoman dan acuan bagi Dokter, bidan / bidan dalam melakukan pertolongan perdarahan pada kehamilan muda / abortus sesuai prosedur	
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor : 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Panduan Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abortus Iminens <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat jalan. b. Tirah baring. c. Medikamentosa sesuai advice DPJP SpOG <div data-bbox="510 1433 1300 1579" style="border: 1px solid black; height: 65px; margin: 10px 0;"></div> <ol style="list-style-type: none"> d. Bila penyebab diketahui maka dilakukan terapi terhadap penyebab. e. Pada kasus tertentu seperti abortus habitualis dan post ifertilitas dilakukan rawat inap. 2. Abortus Insipiens <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaiki keadaan umum b. Umur kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan kuretase, lebih dari 12 minggu dilakukan oksitosin titrasi dan kuretase. c. Medikamentosa sesuai advice DPJP SpOG 	



RSPMC

**PENANGGULANGAN PENDARAHAN
PADA KEHAMILAN MUDA / ABORTUS**

No. Dokumen

262/SPO/VK/RS
PMC/XI-20

No. Revisi

00

Halaman

2 / 2

3. Abortus Inkomplit

- Perbaiki keadaan umum
- Kuretase dengan atau tanpa digital plasenta pre kuretase
- Medikamentosa sesuai advice DPJP SpOG

4. Missed Abortion

- Perbaiki keadaan umum
- Evaluasi terhadap umur kehamilan :
Umur kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan kuretase langsung.

- Umur kehamilan lebih dari 12 minggu diberikan :
- Estradiol benzoas 2 x 20 – 40 mg atau IM selama 3 – 5 hari.
- Rawat inap : dipasang *stiff* laminaria 12 – 24 jam dan titrasi oksitosin atau prostaglandin seperti protein E

5. Abortus Infeksious

- Perbaikan keadaan umum
- Nama obat
-
- Kuretase dilakukan dalam tempo 6 jam bebas panas atau dalam waktu 12 – 24 jam apabila panas tidak turun

UNIT TERKAIT

1. VK