

Quadratische Formen über \mathbb{Q}_p

[Platzhalter für Datum]

Vorbemerkung: Innerhalb dieses Vortrags sei $k = \mathbb{Q}_p$ mit p einer Primzahl. Alle quadratischen Formen seien nicht ausgeartet. Zuerst erinnern wir uns an das Hilbertsymbol aus §3:

Erinnerung (Hilbertsymbol). Sei $k \in \{\mathbb{Q}_p, \mathbb{R}\}$. Die Abbildung

$$k^\times / (k^\times)^2 \times k^\times / (k^\times)^2 \rightarrow \{0, 1\}$$

$$(a, b) \mapsto (a, b) := \begin{cases} 1, & Z^2 - aX^2 - bY^2 \text{ hat Lösung } \neq (0, 0, 0) \text{ in } k^3 \\ -1, & \text{sonst} \end{cases}$$

ist eine nicht ausgeartete Bilinearform. Der Ausdruck (a, b) heißt das Hilbertsymbol von a und b relativ zu k . Insbesondere haben wir

- $(a, b) = (b, a)$ und $(a, a^2) = 1$
- $(a, -a) = 1$ und $(a, 1 - a) = 1$
- $(a, b) = (a, -ab) = (a, (1 - a)b)$

der Ausdruck „nicht-ausgeartet“ soll in diesem Kontext heißen, dass $(a, b) = 1$ für alle $b \in k$ impliziert a ein Quadrat.

Die Invarianten quadratischer Formen

Sei (V, Q) ein quadratischer Modul und sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ die induzierte symmetrische Bilinearform, dann gibt es eine Orthogonalbasis von (V, Q) , etwa $e = (e_1, \dots, e_n)$ und $A = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j}$, dann ist

$$\text{disc}(Q) := \det A = a_1 \cdot \dots \cdot a_n$$

als Element von $k^\times / (k^\times)^2$ eindeutig bestimmt.