2.1.3.2. 부록 1. 신생아 진료지침 가이드라인

담당부서	신생아과, 신생아집중치료실				
제정일	2008.12.	개정일	2009.12.	최종검토일	2025.03.

신생아 진료지침 가이드라인

1. 활력징후; 체온, 심박수, 호흡, 혈압

1) 정상 체온: 36.0~36.5℃ (피부), 36.5~37.5℃ (직장)
2) 정상 혈압: 재태주령과 출생체중에 따른 혈압의 범주가 -2SD ~ +2SD 에 속하는 경우
3) 호흡수: 40~60회/분
4) 맥박수: 120~160회/분 (awake)

2. 무호흡의 정의

호흡이 20초 이상 정지하거나, 20초 미만이더라도 청색증 (SpO2 <85%)이나 서맥 (심박수<100회/분)을 동반하는 경우

3. 동맥혈 가스 검사의 정상 범주 [표 1]

재태 주령	PaO_2(mmHg)	$PaCO_2$(mmHg)	pH	HCO^{3-}(mEq/L)	BE
만삭아	80-95	35-45	7.32~7.38	24~26	±3.0
미숙아(30~36주)	60-80	35-45	7.30~7.35	22~25	±3.0
미숙아(30주미만)	45-60	38-50	7.27~7.32	19~22	±3.0

4. 핍뇨(Oliguira)

생후 24시간이 지나도 소변량이 0.5 ~ 1 mL/kg/h 에 해당되는 경우

5. 혈청 빌리루빈

[그림 1] 건강한 만삭아에서 생후 시간에 따른 위험 범주별 빌리루빈 수치



[그림 2] 재태주령 35주 이상 신생아에서 광선치료의 적응범위



[그림 3] 재태주령 35주 이상 신생아에서 교환수혈의 적응범위



[표 2] 미숙아에서 허용 가능한 최대 간접 빌리루빈 범위

(Suggested Maximal Indirect Serum Bilirubin Concentrations in Preterm Infants)

출생 체중(g)	UNCOMPLICATED(mg/dL)	COMPLICATED[*](mg/dL)
<1,000	12–13	10–12
1,000–1,250	12–14	10–12
1,251–1,499	14–16	12–14
1,500–1,999	16–20	15–17
2,000–2,500	20–22	18–20

* Complicated: 주산기 가사, 산혈증, 저체온, 저산소증, 저알부민혈증, 뇌막염, 뇌실내 출혈, 용혈, 저혈당증 혹은 핵황달의 징후