세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

COVID-19 및 유행성 감염증 의심시 기본심폐소생술 순서도(성인)

개인보호장비 착용 (KF94마스크, 장갑, 가운, 안면가리개)
필수 인력만 참여

↓

반응이 없는 환자 발견

↓

도움 요청(원내 113)
제세동기(AED/ Defibrillator) 요청

↓

맥박 확인 (의료인만 해당)
:경동맥 촉지

맥박과 무호흡 또는
비정상 호흡 동시 확인 (10초 이내)

호흡 없고
맥박있는 경우 →

- 필터가 있는 백마스크를 사용하고 단단히 밀착하여 인공호흡 시행
- 5~6초 또는 10~20회/ 분 인공호흡 제공
- 2분 마다 맥박 확인

호흡,맥박 없는경우 ↓

코와 입 덮기
(천과 옷 사용)

↓

심폐소생술 시행
가슴압박 30회 : 인공호흡 2회 (반복)
필터가 있는 백마스크를 사용하고 단단히 밀착하여 인공호흡 시행
또는
지속적인 가슴압박과 함께 안면마스크를 사용하여 산소공급

제세동기 도착 ↓

심전도 확인
제세동이 필요한가?

예 →

제세동 실시

아니요 →

2분간 심폐소생술 시행
심폐소생팀 도착 또는
환자 회복 시 까지 지속

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

COVID-19 및 유행성 감염증 의심시 기본심폐소생술 순서도(소아)

개인보호장비 착용 (KF94마스크, 장갑, 가운, 안면가리개)
필수 인력만 참여

↓

반응이 없는 환자 발견

↓

도움 요청(원내 113)
제세동기(AED/ Defibrillator) 요청

↓

맥박 확인 (의료인만 해당)
:경동맥 촉지

맥박과 무호흡 또는
비정상 호흡 동시 확인 (10초 이내)

호흡 없고
맥박있는 경우 →

- 필터가 있는 백마스크를 사용하고 단단히 밀착하여 인공호흡 시행
- 2~3초 또는 20~30회/ 분 인공호흡 제공
- 2분 마다 맥박 확인
- 순환부족 증상이 있고 맥박 <60(회/분) 이면 심폐소생술 시행

호흡,맥박 없는경우 ↓

코와 입 덮기
(천과 옷 사용)

↓

심폐소생술 시행
가슴압박 30회 : 인공호흡 2회 (반복)
필터가 있는 백마스크를 사용하고 단단히 밀착하여 인공호흡 시행
또는
지속적인 가슴압박과 함께 안면마스크를 사용하여 산소공급

제세동기 도착 ↓

심전도 확인
제세동이 필요한가?

예 → 제세동 실시

아니요 →

2분간 심폐소생술 시행
심폐소생팀 도착 또는
환자 회복 시 까지 지속

효과적인 심폐소생술

가슴압박 : 인공호흡 비율
- 1인 구조자 30 : 2
- 의료인 2인 구조자 15 : 2

가슴압박 요령
- 압박 깊이: 가슴두께 최소 1/3 이상
  소아 : 성인과 동일 위치, 약 5cm
  영아 : 유두선 바로 아래, 약 4cm
- 가슴압박 속도: 분당 100~120회
- 압박 직후 충분한 가슴이완 유지
- 가슴압박 중단의 최소화
- 과도한 환기 금지