세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

기본심폐소생술 순서도 (성인)



효과적인 심폐소생술

- 가슴압박 깊이: 5~6cm
- 가슴압박 속도: 분당 100~120회
- 압박 직후 충분한 가슴이완 유지
- 가슴압박 중단의 최소화
- 과도한 환기 금지

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

기본심폐소생술 순서도 (소아)

반응이 없는 환자 발견

↓

도움 요청(원내 113)
제세동기(AED/ Defibrillator) 요청

맥박 확인 (의료인만 해당)
- 소아: 경동맥
- 영아: 상완동맥

맥박과 무호흡 또는 비정상 호흡 동시 확인 (10초 이내)

호흡 없고 맥박있는 경우 →
- 매 2~3초마다 호흡 제공
- 2분마다 맥박 확인
- 순환부족 증상이 있고 맥박 <60(회/분) 이면 심폐소생술 시행

호흡,맥박 없는경우 ↓

심폐소생술 시행
가슴압박 30회 : 인공호흡 2회 (반복)

제세동기 도착 ↓

심전도 확인
제세동이 필요한가?

예 → **제세동 실시** → **2분간 심폐소생술 시행 심폐소생팀 도착 또는 환자 회복 시 까지 지속**

아니요 → **2분간 심폐소생술 시행 심폐소생팀 도착 또는 환자 회복 시 까지 지속**

효과적인 심폐소생술

가슴압박 : 인공호흡 비율
- 1인 구조자 30 : 2
- 의료인 2인 구조자 15 : 2

가슴압박 요령
- 압박 깊이: 가슴두께 최소 1/3 이상
  소아 : 성인과 동일 위치, 약 5cm
  영아 : 유두선 바로 아래, 약 4cm
- 가슴압박 속도: 분당 100~120회
- 압박 직후 충분한 가슴이완 유지
- 가슴압박 중단의 최소화
- 과도한 환기 금지