早期档案：数学组参考解答

本站整理。对应考试时间为 11 月 4 日的试卷；第 6 题按原卷恢复为偶数阶；第 8 题说明原条件的反例，并给出勘误后的证明。

1. 黎曼函数

极限为 0。对任意 $\varepsilon>0$，使 $R(x)\ge\varepsilon$ 的最简分母只能满足 $q\le 1/\varepsilon$，这样的有理数只有有限多个。在有理数的不重复枚举中，它们只占有限项，故充分大 n 有 $R(x_n)<\varepsilon$。

2. 极限

在零点展开至四次项：

$$\sin(\log(1+x))-\log(1+\sin x)=\frac{x^4}{12}+O(x^5),$$

$$\arcsin(e^x-1)-e^{\arcsin x}+1=\frac{x^4}{12}+O(x^5).$$

所以极限为 1。上述展开分别将 $\log(1+x)$、e^x-1 的四阶展开代入 $\sin u=u-u^3/6+O(u^5)$、$\arcsin u=u+u^3/6+O(u^5)$ 即得。

3. 沿整数倍收敛但不全局收敛

存在。令 f 为集合 $\{\sqrt{p}:p\text{ 为素数}\}$ 的示性函数。不同素数平方根的比是无理数，因此固定 $x>0$ 时，不可能有两个不同正整数 m,n 同时使 mx,nx 属于该集合。于是 $f(nx)$ 至多一项非零，必趋于零。但沿 $x=\sqrt{p}\to\infty$ 有 $f(x)=1$，故全局极限不为零。

4. 根式方程

记三个根式内的多项式为 $P=x^2+x+1$、$Q=2x^2+x+5$、$R=x^2-3x+13$，它们均为正。原方程等价于

$$R-P-Q\ge 0,\qquad (R-P-Q)^2=4PQ.$$

其中 $R-P-Q=-(x-1)(2x+7)$，而

$$(R-P-Q)^2-4PQ=-(2x^2-7x+29)(2x^2+3x-1).$$

第一因子恒正，故候选解为 $x=(-3\pm\sqrt{17})/4$。两者均满足 $-7/2<x<1$，所以符号条件成立，恰为全部解。

5. 大参数矩阵

前 n 列的行列式 $\det(tI+C)$ 是首项为 t^n 的多项式，故大 t 时非零。于是 A 的秩为 n，A^T 的 n 个列向量线性无关，齐次方程仅有零解。

6. 偶数阶斜对称矩阵

写 $n=2r$。对斜对称矩阵定义整数多项式

$$\mathrm{Pf}(A)=\sum_{\mathcal{P}}\operatorname{sgn}(i_1,j_1,\dots,i_r,j_r)\prod_{s=1}^{r}a_{i_sj_s},$$

其中求和遍历 $\{1,\dots,2r\}$ 的全部无序配对，每对写作 $i_s<j_s$，各对按 $i_1<\cdots<i_r$ 排列。我们说明 $\det A=\mathrm{Pf}(A)^2$。

令 $\omega=\sum_{i<j}a_{ij}e_i\wedge e_j$，展开外积即得 $\omega^r/r!=\mathrm{Pf}(A)e_1\wedge\cdots\wedge e_{2r}$，从而换基给出 $\mathrm{Pf}(P^TAP)=\det P\,\mathrm{Pf}(A)$。对实斜对称矩阵，通过同时的行列消元，可将其合同化为若干 $\begin{pmatrix}0&c\\-c&0\end{pmatrix}$ 块与零块：选取一个非零非对角元作为首块，用其两行、两列消去其余交叉元，再归纳。对这种块对角矩阵，行列式恰为 Pfaffian 的平方；利用换基公式，恒等式对 A 也成立。

原矩阵元素为整数，配对公式说明 $\mathrm{Pf}(A)$ 为整数，所以行列式是整数的完全平方。

7. 旋转单叶双曲面的直纹

经刚体运动，设曲面为 $(x^2+y^2)/a^2-z^2/c^2=1$，$a,c>0$。两族直纹可参数化为

$$p_\varphi=(a\cos\varphi,a\sin\varphi,0),\qquad v_{\varphi,\pm}=(-a\sin\varphi,a\cos\varphi,\pm c).$$

每条直纹到旋转轴的距离为 a，与轴夹角为 $\beta=\arctan(a/c)$。

异族方向的内积为 $a^2\cos(\varphi-\psi)-c^2$。若 $a\ge c$，可取到零内积，最大夹角为直角，与条件矛盾。故 $a<c$，异族直线夹角最大值为

$$\arccos\frac{c^2-a^2}{c^2+a^2}=2\arctan(a/c)=2\beta.$$

同族两条直纹，令参数差为 $2q$。由异面直线距离公式，距离为

$$\frac{2ac|\sin q|}{\sqrt{c^2+a^2\cos^2 q}},$$

其最大值为 $2a$，在参数差为 π 时取得。因此答案为夹角 $\theta/2$、距离 $d/2$。

8. 椭球内接长方体及勘误

原卷写“直平行六面体”，这只要求侧棱垂直于底面，不要求底面为矩形。在此条件下，原结论不成立。取八个顶点

$$(\pm a/\sqrt{2}, 0, \pm c/\sqrt{2}), \qquad (0, \pm b/\sqrt{2}, \pm c/\sqrt{2}),$$

其中每组的两个正负号独立选取。这些点都在椭球面上。在每个高度 $z = \pm c/\sqrt{2}$，四点依次组成菱形；连接上下对应顶点的侧棱垂直于底面。因此它是直平行六面体，但底面的棱同时有非零的 x, y 分量，并不平行于坐标轴。

网页将条件勘误为“长方体（三组棱两两垂直）”。下面证明这个修正后的命题。

设长方体中心为 p，三个半棱向量为两两垂直且非零的 u, v, w。八个顶点是 $p \pm u \pm v \pm w$。令 $Q = \operatorname{diag}(a^{-2}, b^{-2}, c^{-2})$。

把八个方程 $(p \pm u \pm v \pm w)^T Q (p \pm u \pm v \pm w) = 1$ 分别按各符号求和或相减，得到

$$p^T Q u = p^T Q v = p^T Q w = 0, \qquad u^T Q v = u^T Q w = v^T Q w = 0.$$

因 u, v, w 是基且 Q 可逆，前式给出 $p = 0$。将三个方向归一化后，它们同时为欧氏正交基并对角化 Q，所以都是 Q 的特征向量。三个特征值互异，故这些方向只能分别沿三条坐标轴。

9. 正十二面体体积

设 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$。一个正十二面体的二十个顶点可取为

$$(\pm 1, \pm 1, \pm 1), \quad (0, \pm \phi^{-1}, \pm \phi), \quad (\pm \phi^{-1}, \pm \phi, 0), \quad (\pm \phi, 0, \pm \phi^{-1}).$$

各面的五个顶点共面且边长均为 $2/\phi$；例如面 $x + \phi z = \phi^2$ 上的五点为 $(1, \pm 1, 1)$、$(0, \pm \phi^{-1}, \phi)$、$(\phi, 0, \phi^{-1})$，按邻接顺序可直接核验它们为正五边形。缩放 $\phi/2$ 后边长为 1，内切球半径为

$$r = \frac{\phi^3}{2\sqrt{1 + \phi^2}}.$$

一个面的面积为 $5 \cot(\pi/5)/4$。分成十二个以中心为顶点的五棱锥，得到

$$V = \frac{12}{3} \cdot \frac{5}{4} \cot\frac{\pi}{5} \cdot r = \frac{15 + 7\sqrt{5}}{4}.$$