

北京大学数学科学学院期末试题

2017 -2018 学年第 1 学期

考试科目 高等代数 I

考试时间 2018 年 1 月 2 日

一. (25 分) 设线性变换 A 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

- 1) 求 A 像空间的一组基 ; (5 分)
- 2) 求 A 核空间的一组基 ; (5 分)
- 3) 求 A 在基 $\beta_2, \beta_3, \beta_1 + \beta_2$ 下的矩阵 B ; (10 分)
- 4) 判断矩阵 A 能否对角化并说明理由. (5 分)

解: 1) 对矩阵 A 作行变换, 求得 A 的简化阶梯型

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此知 A 的前两个列向量构成 A 列向量组的极大无关组, 故

$\beta_1 + 2\beta_2 + 2\beta_3, \beta_1 + 3\beta_2 + 2\beta_3$ 构成 A 像空间的一组基 ;

2) 由 A 的简化阶梯型求出 A 解空间的一组基 : $[1 \ -1 \ -1]^T$.

故 A 核空间是 1 维子空间, 一组基为 $\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$;

3) 由 $(\beta_2 \ \beta_3 \ \beta_1 + \beta_2) = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 知基底

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\beta_2, \beta_3, \beta_1 + \beta_2$ 的过渡矩阵为 $U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

对矩阵 $[A \ I]$ 作行变换, 计算 U^{-1} :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \updownarrow & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \updownarrow & \\ 0 & 1 & 0 & \updownarrow & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \updownarrow & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \updownarrow & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \updownarrow & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \updownarrow & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \updownarrow & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \updownarrow & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } U^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A 在基 $\beta_2, \beta_3, \beta_1 + \beta_2$ 下的矩阵为

$$\begin{aligned} B = U^{-1} A U &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注: 以下推导过程不需要.

若线性变换 A 在基 β_1, \dots, β_n 下的矩阵为 A , 基 β_1, \dots, β_n 到

基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 U , 则有

$$\begin{aligned} A(\alpha_1 \cdots \alpha_n) &= A((\beta_1 \cdots \beta_n) U) \\ &= (A(\beta_1 \cdots \beta_n)) U \quad (\text{线性组合的像等于像作线性组合}) \\ &= ((\beta_1 \cdots \beta_n) A) U \quad (A \text{ 在基 } \beta_1, \dots, \beta_n \text{ 下的矩阵为 } A) \\ &= (\beta_1 \cdots \beta_n) (A U) \quad (\text{结合律}) \\ &= (\alpha_1 \cdots \alpha_n) U^{-1} (A U) \\ &= (\alpha_1 \cdots \alpha_n) (U^{-1} A U) \quad (\text{结合律}) \end{aligned}$$

故 A 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $U^{-1} A U$.

4) 计算 A 的特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -2 & \lambda-3 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -2 & \lambda-3 & 1 \\ 0 & -\lambda+1 & \lambda-1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -2 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)((\lambda-1)(\lambda-2)-2) = (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda-3)\lambda$$

得 A 的特征值 0, 1, 3. 由于 A 是 3 级矩阵且在数域上有三个不同的特征值, 故 A 可对角化.

二. (20 分) 已知实矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

1) 确定矩阵 A, B 的正负惯性指数并判断它们是否合同; (8 分)

2) 确定矩阵 A, B, C, D 的相似分类并说明理由. (12 分)

解: 1) 对 A 作成对的行列变换, 可将 A 化为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

由此看出 A 的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2.

对 B 作成对的行列变换, 可将 B 化为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

故 B 的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1.

由于 A, B 的正惯性指数不同, A, B 不合同.

2) 首先注意到 A, B 为实对称矩阵, 可在实数域上对角化.

C, D 的特征值为 3, -1 (代数 2 重), 但由于

$$C + I = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 的秩为 1, } C \text{ 的特征值 -1 的特征子空间}$$

的维数(几何重数) 也为 $3 - 1 = 2$. 故 C 也可对角化.

$$\text{另一方面, 由于 } D + I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ 的秩为 2, } D \text{ 的特征值 -1}$$

的几何重数为 1, D 不能对角化. 于是 D 与 A, B, C 都不相似.

又由 (1) 知, A 有一个正特征值, B 有两个正特征值(算代数重数),

故 A, B 不相似.

$$\text{最后, 由 } A + I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ 秩为 1 可看出 -1 是 } A \text{ 的特征值, 且几何}$$

重数为 2, 故 A 的另一个特征值为 $\text{tr}(A) - (-1) - (-1) = 3$.

A, C 都可对角化且有相同的特征值, 故 A, C 相似.

矩阵 A, B, C, D 的相似分类为 $\{A, C\}, \{B\}, \{D\}$.

三. (30 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 3x_2^2 - 4x_2x_3$.

(1) 将 f 写成 $X^T A X$ 的形式, 求实对称矩阵 A 的特征值与特征向量; (12 分)

(2) 求正交矩阵 P 及对角矩阵 D , 使得 $A = P D P^T$; 作正交替换将 f 化为标准型; (12 分)

(3) 求二次型 $f(X) = X^T A X$ 在单位球面 $\|X\| = 1$ 上能取到的最大值,

并确定在何处取到这个最大值. (6分)

$$\text{解: (1) } f = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 1 \\ -2 & \lambda - 3 & 2 \\ 1 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 2 + 2\lambda \\ 1 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 5 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 1 & 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda - 5) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

故 \mathbf{A} 的特征值为 $\lambda = -1$ (代数二重) 及 $\lambda = 5$.

对 $\lambda = -1$ 解齐次方程组 $(\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{X} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

求得通解 $x_1 = -2x_2 + x_3$, x_2 、 x_3 为自由变量. 解的向量形式为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 + x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{于是 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 构成 } \lambda = -1 \text{ 特征子空间的一组基.}$$

$$\text{解齐次方程组 } (\mathbf{A} - 5\mathbf{I})\mathbf{X} = \mathbf{0}, \text{ 求得 } \lambda = 5 \text{ 的特征子空间的基 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \text{ 将 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 正交化:}$$

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{-2}{5} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

再单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{将 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 也单位化: } \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{则 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 构成 } \mathbb{R}^3 \text{ 的标准正交基, } P = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3] = \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$\text{为正交矩阵, 且 } A = P D P^T = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \\ \gamma_3^T \end{bmatrix}.$$

做正交替换 $X = PY$, 二次型 f 化为

$$f(X) = X^T A X = Y^T P^T A P Y = Y^T D Y = -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2.$$

3) 由于 P 是正交矩阵, 我们有

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = X^T X = Y^T P^T P Y = Y^T Y = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$$

故当 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$ 时,

$$\begin{aligned} f(X) &= -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2 \\ &= 5(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) - 6(y_1^2 + y_2^2) \leq 5, \end{aligned}$$

且等号成立当且仅当 $y_1 = y_2 = 0$, 或等价地, $y_1 = \pm 1$, 即 X 当落在 A 的

最大特征值 $\lambda = 5$ 的特征子空间与单位球面的交 $X = \pm \gamma_3$ 时取到这个最大值.

四. (10 分) 设 A 是一个 n 级矩阵, $\alpha = [1 \dots 1]^T$ 是 n 维列向量.

已知 $|A| = a$, $|A - \alpha\alpha^T| = b$, 求 $|A + 2\alpha\alpha^T|$ 的值.

解: 设 $A = [a_{ij}]$. 注意到

$$\begin{aligned} f(x) = |A + x\alpha\alpha^T| &= \begin{vmatrix} x + a_{11} & x + a_{12} & \cdots & x + a_{1n} \\ x + a_{21} & x + a_{22} & \cdots & x + a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x + a_{n1} & x + a_{n2} & \cdots & x + a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x + a_{11} & x + a_{12} & \cdots & x + a_{1n} \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & \cdots & a_{2n} - a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} - a_{11} & a_{n2} - a_{12} & \cdots & a_{nn} - a_{1n} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

展开后是 x 的线性函数, 且 $f(0) = a$, $f(-1) = |A - \alpha\alpha^T| = b$,

故 $f(x) = a + (a - b)x$. 于是 $|A + 2\alpha\alpha^T| = f(2) = 3a - 2b$.

五. (8 分) 设矩阵 A 的列数与矩阵 B 的行数都等于 n . 证明:

A 秩 + B 秩 = AB 秩 + n 当且仅当 A 的解空间 $\subseteq B$ 的列空间.

证: 注意到 A 的解空间与 B 列空间的交集 W 是向量空间 K^n

的子空间, 且

$$\dim W \leq A \text{ 解空间维数} = n - A \text{ 秩},$$

等号成立 当且仅当 A 的解空间 = W , 即 A 解空间 $\subseteq B$ 列空间.

将 W 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ (写成列向量) 扩充成 B 列空间的基

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

显然向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$ 与 B 的列组均能相互线性表出

对方. 同理, $A[\alpha_1 \dots \alpha_s \beta_1 \dots \beta_t]$ 的列组与 AB 的列组等价. 故

$$AB \text{ 秩} = A[\alpha_1 \dots \alpha_s \beta_1 \dots \beta_t] \text{秩} = [A\beta_1 \dots A\beta_t] \text{秩}.$$

以下证明 $[A\beta_1 \dots A\beta_t]$ 的秩 $= t$, 即 $A\beta_1, \dots, A\beta_t$ 线性无关:

若有系数 $k_1 \in K$, 使得 $k_1 A\beta_1 + \dots + k_t A\beta_t = 0$, 即

$$A(k_1 \beta_1 + \dots + k_t \beta_t) = 0.$$

则 $k_1 \beta_1 + \dots + k_t \beta_t \in W$, 于是存在 $l_j \in K$, 使得

$$k_1 \beta_1 + \dots + k_t \beta_t = l_1 \alpha_1 + \dots + l_s \alpha_s.$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$ 是 B 列空间的基知 $k_1 = \dots = k_t = 0$.

故 $A\beta_1, \dots, A\beta_t$ 线性无关.

最后, 由 $[A\beta_1 \dots A\beta_t]$ 秩 $= t$ 推得

$$AB \text{ 秩} = t = B \text{ 秩} - \dim W \geq B \text{ 秩} - (n - A \text{ 秩}) = A \text{ 秩} + B \text{ 秩} - n,$$

等号成立 当且仅当 A 解空间 $\subseteq B$ 列空间.

六. (7分) 设 F 是一数域, $A, B, P \in M_n(F)$, 且满足 $P^3 = 0, P^2 \neq 0$,

$(A - B)P = P(A - B)$, $BP - PB = 2(A - B)$. 求 F 上的一个可逆

矩阵 Q , 满足 $AQ = QB$.

解: 令 $C = A - B$, 则有 $CP = PC$, $BP - PB = 2C$.

对 $BP - PB = 2C$ 分别右乘, 左乘 P , 得

$$BP^2 - PBP = 2CP, \quad PBP - P^2B = 2CP \quad (1)$$

相加, 得 $BP^2 - P^2B = 4CP$; (2)

类似地, 对 (1) 式再右乘, 左乘 P , 得

$$BP^3 - PBP^2 = 2CP^2, \quad PBP^2 - P^2BP = 2CP^2, \quad P^2BP - P^3B = 2CP^2,$$

相加, 得 $BP^3 - P^3B = 6CP^2$.

又由题设条件 $P^3 = 0$, 得 $CP^2 = 0$. (3)

以下用待定系数法构造 Q :

设 $Q = I + a_1P + a_2P^2$. 条件 $AQ = QB$ 等价于

$$A(I + a_1P + a_2P^2) = (I + a_1P + a_2P^2)B,$$

或 $C + a_1CP + a_1(BP - PB) + a_2CP^2 + a_2(BP^2 - P^2B) = 0$.

将题设条件 $BP - PB = 2C$ 及 (2) 带入, 得

$$C + a_1CP + 2a_1C + a_2CP^2 + 4a_2CP = 0,$$

或 $C((1 + 2a_1)I + (a_1 + 4a_2)P + a_2P^2) = 0$.

由(3), 欲使上式成立, 只需令

$$1 + 2a_1 = 0, \quad a_1 + 4a_2 = 0.$$

即 $a_1 = -1/2$, $a_2 = 1/8$, 或 $Q = I - 1/2P + 1/8P^2$.

最后, 容易验证我们构造的 Q 可逆且 $Q^{-1} = I + 1/2P + 1/8P^2$:

$$\begin{aligned} & (I - 1/2P + 1/8P^2)(I + 1/2P + 1/8P^2) \\ &= I - 1/2P + 1/2P - 1/4P^2 + 1/8P^2 + 1/8P^2 = I. \end{aligned}$$