

数学模型 期中考试 (1)

Exam Date: April 8. Time: 03:15 pm to 04:55 pm. (100 minutes)

答题时请注意:

- 计算题需要有完整的解题步骤, 证明题需要严密的论证过程。
- 没有出现在答题纸上的要点, 视为答题人不知道或者没有能力阐述清楚。
- 答题纸上不需要抄题目。但是请标好答题序号。
- 请大家严格遵守考试纪律。祝大家考试顺利!

1. 化学反应模型。考虑可逆反应 (reversible transform)



用 $A(t)$ $B(t)$ 分别表示物质A, B的浓度, 它们满足初值条件

$$A(0) = A_0 > 0, \quad B(0) = B_0 > 0.$$

(a) (10分) 写出 $A(t)$ $B(t)$ 满足的变化率模型, 并求出该系统的平衡解 $(\bar{A}, \bar{B}) \in \mathbb{R}^2$ 。

(b) (10分) 证明当 $x > 0$ 时, $\ln x + \frac{1}{x} - 1 \geq 0$, 并用它来证明, $t \geq 0$ 时

$$A \ln \left(\frac{A}{\bar{A}} \right) + B \ln \left(\frac{B}{\bar{B}} \right) \geq 0.$$

2. (20分) 稳定性分析的应用。对于依赖于参数 r 的一维系统,

$$\dot{x} = x - x^3 - r.$$

讨论不同参数取值的时候, 系统的平衡点的个数和稳定性 (不需要具体找到平衡点的位置, 只需要知道个数和稳定性)。 r 取什么值时, 会出现分岔现象 (平衡点的个数和性质会随着参数的变化而发生了改变)?

3. 一阶波方程和特征线法。

(a) (10分) 考虑一维的Burgers' equation

$$u_t + uu_x = 0.$$

如果已知

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ -\frac{x}{2}, & -2 < x < 0 \\ 1, & x < -2. \end{cases}$$

对于 $0 < t < 2$, 利用特征线法求方程的解, 并画出 $u(x, 2)$ 。

(b) (10分) 考虑信号传送问题。设 $\rho(x, t)$ ($x \geq 0, t \geq 0$) 为信号的强度, 它满足如下的初边值问题

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (x+4) \frac{\partial \rho}{\partial x} = -2\rho.$$

$$\rho(0, t) = 1, \quad \rho(x, 0) = 0.$$

也就是说, 在 $t=0$ 时刻, 右半轴 ($x \geq 0$) 没有任何信号, 当 $t \geq 0$ 时, 位于 $x=0$ 处的信号站开始释放信号。如果, 一个接收站的位置为 $\tilde{x}=12$, 请问什么时候这个接收站开始收到信号, 此时信号的强度是多少?

4. 输运模型。考虑空间一维的可压缩流体, $\rho(x, t)$ 表示它的密度。设一段流体的物质滴 (fluid/material blob) 在 $t=0$ 时刻占据了区间 $1 \leq x \leq 2$, 而且此时在这个区间上, $\rho(x, 0) = 1$ 。这个物质滴的密度的时间演化满足如下的质量守恒方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = 0.$$

这里, (Eulerian) 速度场 $v(x, t) = x^2 e^{-3t}$ 。

(a) (10分) 将方程改写成半线性波方程的形式, 设这个物质滴在 $t \geq 0$ 时占据的区间为 $x_1(t) \leq x \leq x_2(t)$, 求 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 。

(b) (10分) 这个物质滴的总质量可以表示为

$$m(t) = \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} \rho(x, t) dx.$$

推导此时 Reynolds Transport Theorem 的具体形式, 并用它来证明

$$\frac{d}{dt} m(t) = 0.$$

5. 变分法的应用。对于一个一维的概率密度函数 $\rho(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$, 假设 ρ 充分光滑, 并且在有界的区域内不为 0。它的能量泛函由下式给出

$$E = \int_{\mathbb{R}} H(\rho(x)) dx + \int_{\mathbb{R}} V(x) \rho(x) dx + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} W(|x-y|) \rho(x) \rho(y) dx dy.$$

这三项分别表示, 内能, 势能和相互作用能。 H, V, W 均充分光滑。

(a) (10分) 令 $\xi = \frac{\delta E}{\delta \rho}$, 利用泛函导数的定义求 ξ 。

(b) (10分) 现在考虑随时间演化的概率密度函数 $\rho(x, t) \geq 0, x \in \mathbb{R}, t \geq 0$, 仍假设 ρ 充分光滑, 并且当 $t \geq 0$ 时, 它在有界的区域内不为 0。它时间演化方程由下面的连续性方程给出

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \xi}{\partial x} \right).$$

这里的 ξ 由 (a) 中定义。这时, 能量泛函也变成了时间的一元函数

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} H(\rho(x, t)) dx + \int_{\mathbb{R}} V(x) \rho(x, t) dx + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} W(|x-y|) \rho(x, t) \rho(y, t) dx dy.$$

证明:

$$\frac{d}{dt} E(t) \leq 0, \quad \forall t \geq 0.$$