

1. (1) 设 $\Omega \subset \text{SL}_n(\mathbb{R})$ 为优美子集. 为说明 Ω 有限, 只需注意到:

- 任意 $A \in \Omega$ 在 \mathbb{C} 上可对角化: p_A 为 $x^{2022} - 1$ 的因式, 从而无重根;
- Ω 只与 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中有限多个相似等价类相交: 若 $A \in \Omega$ 相似于 $\text{diag}(c_1, \dots, c_n)$, 则 $c_i^{2022} = 1$.
- Ω 与 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中每个相似等价类至多交于两个元素: 设 $A_1, A_2, A_3 \in \Omega$ 在 \mathbb{C} 上相似, 则它们在 \mathbb{R} 上相似, 从而存在 $i \neq j \in \{1, 2, 3\}$ 满足: 存在 $P_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使 $\det(P_0) > 0$ 且 $A_j = P_0^{-1} A_i P_0$. 设 $P = \det(P_0)^{-\frac{1}{n}} P_0$. 则 $P \in \text{SL}_n(\mathbb{R})$ 且 $A_j = P^{-1} A_i P$, 矛盾.

(2) $k_2 = 2022$.

- $k_2 \leq 2022$: 设 $\Omega \subset \text{SL}_2(\mathbb{R})$ 为优美子集. 我们证明 $|\Omega| \leq 2022$. 对 $0 \leq k \leq 1011$, 记 $\text{diag}(e^{\frac{k\pi i}{1011}}, e^{-\frac{k\pi i}{1011}})$ 在 $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 中的相似等价类为 \mathcal{S}_k . 由 (1) 有 $\Omega = \bigcup_{k=0}^{1011} \Omega \cap \mathcal{S}_k$. 注意到 $|\mathcal{S}_0| = |\mathcal{S}_{1011}| = 1$. 所以

$$|\Omega| = \sum_{k=0}^{1011} |\Omega \cap \mathcal{S}_k| \leq 2 + \sum_{k=1}^{1010} |\Omega \cap \mathcal{S}_k| \leq 2 + 2 \cdot 1010 = 2022.$$

- $k_2 \geq 2022$: 对 $0 \leq k \leq 2021$, 记 $A_k = \begin{pmatrix} \cos \frac{k}{1011} \pi & -\sin \frac{k}{1011} \pi \\ \sin \frac{k}{1011} \pi & \cos \frac{k}{1011} \pi \end{pmatrix}$. 我们验证 $\{A_k : 0 \leq k \leq 2021\}$ 为 $\text{SL}_2(\mathbb{R})$ 的优美子集. 显然 $A_k^{2022} = I_2$. 假设该集中有不同的 A_k, A_l , 使得存在 $P \in \text{SL}_n(\mathbb{R})$ 满足 $A_l = P^{-1} A_k P$. 则 $\text{tr}(A_k) = \text{tr}(A_l)$, 从而 $k + l = 2022$. 不妨设 $1 \leq k \leq 1010$. 由 $P A_l = A_k P$ 计算可知, P 形如 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & -x \end{pmatrix}$. 从而 $\det(P) \leq 0$, 矛盾.

(3) $k_3 = 1012$.

- $k_3 \leq 1012$: 设 $\Omega \subset \text{SL}_3(\mathbb{R})$ 为优美子集. 我们证明 $|\Omega| \leq 1012$. 首先证明: Ω 中不同的矩阵 A, B 在 \mathbb{C} 上不相似. 否则, 它们在 \mathbb{R} 上相似, 从而存在可逆矩阵 $P_0 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 使得 $B = P_0^{-1} A P_0$. 设 $P = \det(P_0)^{-\frac{1}{3}} P_0$. 则 $P \in \text{SL}_3(\mathbb{R})$ 且 $B = P^{-1} A P$, 矛盾. 其次, 注意到: 如果 $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 为 $A \in \Omega$ 的特征值, 则 \bar{c} 也是 A 的特征值. 结合 (1), 这推出 A 相似于形如

$$\text{diag}(e^{\frac{k\pi i}{1011}}, e^{-\frac{k\pi i}{1011}}, 1), \quad 0 \leq k \leq 1011$$

的对角矩阵. 这里共有 1012 个对角矩阵. 所以 $|\Omega| \leq 1012$.

- $k_3 \geq 1012$: 集合 $\{\text{diag}(A_k, 1) : 0 \leq k \leq 1011\}$ 中的矩阵的 2022 次幂均为 I_3 且两两不相似, 从而为 $\text{SL}_3(\mathbb{R})$ 的优美子集. \square

2. 所求最大次数为 11. 下面证明.

- 最大次数 ≥ 11 : 取 $A = \sum_{i=1}^{10} E_{i+1,i}$. 则 $p_A = x^{11}$.
- 最大次数 ≤ 11 : 设 $A \in \Omega$ 中的集合. 记 $V = \mathbb{C}^{2022 \times 1}$, $T = L_A$, $W = \ker(T)$. 由于 $T_W = 0$, 所以 $p_{T_W} = x$. 由于 p_A 为 $p_{T_W} p_{T_{V/W}}$ 的因式, 因此为 $x f_{T_{V/W}}$ 的因式. 而 $\deg f_{T_{V/W}} = \dim V/W = \text{rank}(A) \leq 10$. 所以 $\deg p_A \leq 11$. \square

3. “(1) \implies (2)”: 假设 (1) 成立但 (2) 不成立. 注意到 $f_{T_{V/W}} = f_{T_Z}$. 设素多项式 p 为 f_{T_W} 和 f_{T_Z} 的公因式. 通过考虑 T_W 和 T_Z 的准素循环分解, 可知存在 T -不变分解 $W = W_0 \oplus R\alpha$, $Z = Z_0 \oplus R\beta$ 满足 $p_\alpha = p^r$, $p_\beta = p^s$, $r, s \geq 1$. 取 $\gamma = \beta + p^{r-1}\alpha$. 则

- $R\alpha \cap R\gamma = \{0\}$: 设 $\delta \in R\alpha \cap R\gamma$. 则存在 $f, g \in R$ 满足 $\delta = f\alpha = g\gamma = g\beta + gp^{r-1}\alpha$. 这推出 $(f - gp^{r-1})\alpha = g\beta \in R\alpha \cap R\beta = \{0\}$. 从而 $p^r | (f - gp^{r-1})$ 且 $p^s | g$. 所以 $p^r | f$. 因此 $\delta = f\alpha = 0$.

- $R\alpha \oplus R\gamma = R\alpha \oplus R\beta$: “ \subset ” 显然. “ \supset ”: 只需注意到 $\beta = \gamma - p^{r-1}\alpha \in R\alpha \oplus R\gamma$.

取 $Z' = Z_0 \oplus R\gamma$. 则 $V = W \oplus Z'$. 由于 $\gamma \in Z'$ 但 $\gamma \notin Z$, 所以 $Z' \neq Z$, 与 (1) 中唯一性矛盾.

“(2) \implies (1)”: 假设 (2) 成立. 则 p_{T_W} 与 $p_{T_{V/W}}$ 互素.

- 先证明 $W = \text{Ker}(p_{T_W}(T))$. “ \subset ” 显然. “ \supset ”: 设 $\alpha \in \text{Ker}(p_{T_W}(T))$. 则 p_{T_W} 零化 α , 从而零化 $\alpha + W \in V/W$, 即 $p_{\alpha+W} | p_{T_W}$. 另外还有 $p_{\alpha+W} | p_{T_{V/W}}$. 所以 $p_{\alpha+W} = 1$. 这推出 $\alpha + W$ 为 V/W 中的零元素, 即 $\alpha \in W$.

- 不变补空间的存在性: 记 $Z = \text{Ker}(p_{T_{V/W}}(T))$. 我们验证 $V = W \oplus Z$.

* $W \cap Z = \{0\}$: 设 $\alpha \in W \cap Z$. 则 $p_\alpha | p_{T_W}$ 且 $p_\alpha | p_{T_{V/W}}$. 这推出 $p_\alpha = 1$. 所以 $\alpha = 0$.

* $V = W + Z$: 设 $\alpha \in V$. 取 g, h 使 $gp_{T_W} + hp_{T_{V/W}} = 1$. 则 $\alpha = gp_{T_W}\alpha + hp_{T_{V/W}}\alpha$. 注意到 $gp_{T_W}\alpha \in Z$, $hp_{T_{V/W}}\alpha \in W$. 所以 $\alpha \in W + Z$.

- 不变补空间的唯一性: 设 $V = W \oplus Z'$ 为 T -不变分解. 对 $\gamma \in Z'$, 设 $\gamma = \alpha + \beta$, 其中 $\alpha \in W$, $\beta \in Z$. 则 $p_{T_{V/W}}\gamma = p_{T_{V/W}}\alpha \in W \cap Z' = \{0\}$. 这推出 $p_\alpha | p_{T_{V/W}}$. 又有 $p_\alpha | p_{T_W}$. 所以 $p_\alpha = 1$. 因此 $\alpha = 0$. 这推出 $Z' \subset Z$. 由 $\dim Z' = \dim Z$ 即得 $Z' = Z$. \square

4. 断言成立. 证明: 记 $V = \text{span}_{\mathbb{Q}}\{x_1, \dots, x_6\}$. 只需证明 $\dim V \geq 6$. 设 $c \in \mathbb{C}$ 为相应的特征值. 则对每个 x_i 有 $cx_i = \sum_{j=1}^6 A_{ij}x_j \in V$. 所以对任意 $x \in V$ 有 $cx \in V$. 取 $x_0 \in V \setminus \{0\}$. 则 $x_0, cx_0, \dots, c^5x_0 \in V$. 由于 $f_A(c) = 0$ 并且 f_A 在 \mathbb{Q} 上不可约, 所以 $1, c, \dots, c^5$ 在 \mathbb{Q} 上线性无关, 因此 x_0, cx_0, \dots, c^5x_0 在 \mathbb{Q} 上线性无关. 这推出 $\dim V \geq \dim \text{span}_{\mathbb{Q}}\{x_0, cx_0, \dots, c^5x_0\} = 6$. \square