

**2ª Lista de Exercícios – ZERO DE FUNÇÕES****1. Execução e Prazo de Entrega**

- 1.1 Execução usando MatLab ou Scilab.
- 1.2 Trabalho em Duplas.
- 1.3 Pode haver troca de experiência entre as duplas, porém cada uma deve desenvolver sua própria solução. Se detectadas soluções iguais ou simplesmente maquiadas, ambas as duplas sofrem penalidade de 50% e, no caso de reincidência a nota será zero.
- 1.4 A entrega após o prazo sofrerá uma penalidade de 5% no valor da nota por dia.
- 1.5 Data para entrega: **16/03/2015**

**2. Instruções para Submissão**

- 2.1 Os arquivos a serem submetidos com as respostas devem identificar, de forma clara, os componentes do grupo e o título do trabalho.
  - 2.2 Todos os arquivos gerados devem ser incluídos em apenas 01 arquivo comprimido (.RAR), cujo nome deve ser uma composição do número do grupo e o número da lista (ex.: G03\_Lista01).
  - 2.3 As respostas das questões que não envolvem a construção de programas devem ser resolvidas usando um processador de texto ou à mão e escaneadas. As que envolvem a construção de programas devem ter os respectivos programas “devidamente documentados” e enviados para testes de execução.
  - 2.4 O arquivo com o trabalho deve ser enviado via SIGAA.
3. Sabendo que encontrar a p-ésima raiz de um número positivo  $\alpha$  é equivalente a achar a raiz positiva da equação  $x = \sqrt[p]{\alpha}$  responda:
- 3.1 Encontre um intervalo que dependa do valor de  $\alpha$  e que contenha a raiz (Dica: considere o caso em que  $p = 2$  para depois pensar no caso geral)
  - 3.2 Verifique se a função  $\Phi(x) = \alpha / x^{p-1}$  é uma função de iteração válida.
  - 3.3 Se a função é válida, calcule a raiz da equação considerando  $\alpha = 8$  e  $p = 3$ . Justifique o resultado analisando os critérios para convergência.
  - 3.4 Sugira uma nova função de iteração que convirja considerando  $\alpha = 8$  e  $p = 3$ .
  - 3.5 Verifique (comprove) que a função de iteração pelo método de Newton-Raphson é dada pela fórmula a seguir e calcule a raiz considerando  $\alpha = 8$  e  $p = 3$ .

$$x_{n+1} = \frac{1}{p} \left[ (p-1)x_n + \frac{\alpha}{x_n^{p-1}} \right]$$

4. Construa um algoritmo que mostre graficamente as funções abaixo com o objetivo de isolar as raízes da equação.
- 4.1  $\ln(x) + 2x = 0$
  - 4.2  $x^2 + x - 6 = 0$
  - 4.3  $x \ln(x) - 1 = 0$
5. Implemente os métodos da bissecção, iterativo linear e Newton-Raphson que calcule qualquer raiz, dado um intervalo, para cada uma das funções do item 4. Use como critério de parada a



precisão de  $10^{-1}$  para o método da bissecção,  $10^{-2}$  para o iterativo linear e  $10^{-3}$  para o Newton-Raphson. Compare a velocidade de convergência dos 3 métodos considerando a precisão de  $10^{-1}$ . (Dica: funções TIC e TOC)

6. Considere a função  $f(x)$  abaixo. Esta função tem uma raiz no intervalo  $[0.8, 1.2]$ .

$$f(x) = x^3 - 3.5x^2 + 4x - 1.5$$

- 6.1 Ache a raiz usando o método de Newton-Raphson e uma precisão de  $10^{-6}$  (programa desenvolvido em 5).
- 6.2 Altere o programa para calcular agora a mesma raiz usando o método da secante, que é uma modificação do Newton-Raphson onde a derivada da função é substituída pela expressão abaixo. Compare os resultados obtidos.

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$