

1 求收敛域格式

1. 观察是否需要分类讨论，极限是否存在
(不存在也有收敛的情况)

如果不存在，则需要使用夹逼定理。

2. 写计算通式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \underline{\hspace{2cm}} < 1$$

3. 求取并写出【收敛半径 R】

4. 带入边界值，判断边界值是否可以被包含

当 $x = \text{左边界值}$ 时，原级数为.....收敛/发散

当 $x = \text{右边界值}$ 时，原级数为.....收敛/发散

5. 写出收敛域

所以收敛域为—— $x \in ([?, ?])$

#注意：收敛区间是开区间，而收敛域要考虑端点敛散性

2 级数求和

1. 化幂为函

☆把幂级数公式里面的 $a^n, (\frac{1}{a})^n$ 化为 x^n .

如果幂级数里面没有 x ，那就创造一个，然后带入 $x = 1$

2. 写出求和公式 $S(x)$ ，利用求和公式

$$\sum_{n=a}^{\infty} Cx^n = Cx^a \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$$

3. 设法将所给的幂级数系数消去

有 $\frac{1}{n}$ 因子就 **求导** 后积分

有 $n+1$ 因子就 **积分** 后求导

3 敛散性判别法

1. 正项级数

比值判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1?$

比较判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \xrightarrow{\text{等价无穷小}} z_n$

然后通过判别 z_n 的敛散性就可以推断 u_n 的敛散性

2. 交错级数

莱布尼兹 判别法：提取正项级数 u_n

① $u_{n+1} > u_n$ ② $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

注意：莱布尼兹判别法是充分条件，两个都满足就是收敛的，但是收敛不一定满足条件①。

同样也可以用比较判别法来等价无穷小

4 展开为幂级数

1. 确定是否为可展开的初等函数

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!};$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n;$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n;$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

2. 计算并写出收敛区间

3. 变化形式，代入公式

$$f(x) - f(0) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} [f']^{(n)}(x) dx \therefore f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x) + f(0)$$

#注意：如果要求导，【全部一起求导】和【单个求导】有区别，关键是看求导运算是否耦合，如果耦合则推荐需要求导的求导，如果不耦合，全部一起求导。

例： $f_1(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ $f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}, x \in (-1, 1)$

$f_2(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ $f_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, x \in (-1, 1)$

第一个函数耦合，第二个函数不耦合

5 求幂级数的和函数

1. 求【收敛半径 R】

2. 写出求和公式 $S(x)$ 和【收敛域】 $x \in ([?, ?])$

求幂级数的和函数需要对 x 按区间分类讨论

6 傅里叶级数 (【展开】)

1. 辨识 $f(x)$ 【定义域】 $[x_1, x_2]$ 【周期】 $2l = x_2 - x_1$

2. 写出傅里叶系数

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{x_1}^{x_2} f(x) \cos \frac{\pi}{l} nx dx;$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{x_1}^{x_2} f(x) \sin \frac{\pi}{l} nx dx$$

$a_0 = \frac{1}{l} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$ ， a_n 和 b_n 是需要化简的，如果原函数是分段函数，则还需要分段积分

$$\cos n\pi = (-1)^n \quad \cos \frac{n\pi}{2} = 0$$

$$\sin n\pi x = 0 \quad \sin \frac{n\pi}{2} = (-1)^{n-1}$$

3. 写出级数表达结果，及定义域

$$f(x) = \left[\frac{a_0}{2} \right] + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in ([x_1, x_2])$$

4. 写出级数在原函数边界处的值

其傅里叶级数在 $x = x_0$ 处收敛于 y_0

如果边界值和原函数边界值不同就需要进一步判断

1 n 的多项式幂级数

$$\begin{aligned}
 S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} [(C_0 + C_1 n + C_2 n^2 + \dots + C_k n^k) x^n] \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} [B_0 x^n + B_1 (x^{n+1})' + B_2 (x^{n+2})'' + \dots + B_k (x^{n+k})^{(k)}] \\
 &= B_0 \frac{1}{1-x} + B_1 \left(\frac{x}{1-x}\right)' + B_2 \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' + \dots + B_k \left(\frac{x^k}{1-x}\right)^{(k)} \\
 &= B_0 \frac{0!}{(1-x)^1} + B_1 \frac{1!}{(1-x)^2} + B_2 \frac{2!}{(1-x)^3} + \dots + B_k \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}
 \end{aligned}$$

计算过程中也可以择机提取 x , 简化过程

几个需要记忆后方便计算的求和公式:

以下求和公式需要小心收敛域 **边界值的失效**, 需要单独计算 n 的起始值是第一个非零项, 做题目时候保证 n 在**首项开始**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), 0 \text{ 项没有意义}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \text{ 这个从 } 0 \text{ 开始是因为 } n=0 \text{ 时项式不为 } 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}; \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, 0 \text{ 项为 } 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) n x^{n-1} = \left(\frac{x^2}{1-x}\right)' = \frac{2!}{(1-x)^3}$$

拓展:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \right) = x \left(\frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2} \right)$$

2 多项式分母分式

多项分式比较麻烦, 主要思想是**因式分解**, 然后**拆分**。若分母为等比求和数列, 则可以利用等比求和公式来化简。

方法二: 分母因式分解, 通过直接求导, 然后积分

3 分母含阶乘

$$\text{利用 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = e^{ix} = \cos x + i \sin x \right)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos x; \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x$$

若分子同时也含有 n 的多项式, 则通过对 n 的多项式的**阶乘分解**来化简式子。

$$\text{例: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n, \text{ 收敛半径为 } \infty, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} \left(\frac{n(n-1)}{n!} + \frac{n}{n!} + \frac{1}{n!} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \text{阶层分解: } &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{n!} \\
 &= \left(\frac{x}{2}\right)^2 e^{\frac{x}{2}} + \frac{x}{2} e^{\frac{x}{2}} + e^{\frac{x}{2}}
 \end{aligned}$$

4 傅里叶级数系数计算

1. **关键公式:** $\cos n\pi = \cos(-n\pi) = (-1)^n$; $\sin n\pi = 0$

带 n 次多项式 $P_n(x)$ 的分部积分方法

$$\begin{aligned}
 &\int_{x_1}^{x_2} P_n(x) g(x) dx \\
 &= P_n(x) \int g(x) dx - P_n'(x) \iint g(x) d^2 x + P_n''(x) \iiint g(x) d^3 x - \dots \\
 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k P_n^{(k)}(x) \cdot g^{-(k+1)}(x) \Big|_{x_2}^{x_1}
 \end{aligned}$$