

Article 템플릿

Master

June 23, 2026

Abstract

이 문서는 `article` 클래스용 기본 템플릿이다. 수식, 정리/정의 환경, TikZ 그림, 표 사용 예시를 포함한다.

Contents

1	서론	1
2	수식과 기호	1
3	TikZ 그림	2
4	표	2

1 서론

`preambles/preamble_documents.tex`를 공유 프리앰블로 사용한다. 새 글을 쓸 때는 이 폴더에 파일을 복사한 뒤 본문만 수정하면 된다.

2 수식과 기호

오일러 등식:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

정적분과 미분:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a), \quad \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) \, dt \right] = f(x). \quad (1)$$

집합과 벡터 표기: $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, $\mathcal{F}$ (필기체), $|x|, \|\mathbf{v}\|$.

정의 2.1 (연속함수). 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 점 $a \in \mathbb{R}$ 에서 연속이라 함은, 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $\delta > 0$ 가 존재하여 $|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 이 성립하는 것이다.

정리 2.2 (중간값 정리). 함수 f 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) < c < f(b)$ 이면, $f(\xi) = c$ 인 $\xi \in (a, b)$ 가 적어도 하나 존재한다.

Proof. 생략. 자세한 증명은 해석학 교재를 참고하라. □

예제 2.3. 식 (1)와 정리 2.2는 `cleverref`로도 참조할 수 있다: Theorem 2.2.

3 TikZ 그림




Figure 1: 간단한 함수 그래프 예시

4 표

항목	측정값	오차
A	12.30	0.05
B	9.87	0.02
C	15.40	0.10

Table 1: 예제 표 (`booktabs` 사용)