

Report 템플릿

Master

June 23, 2026

Contents

1	서론	2
2	수식과 기호	3
2.1	기본 표기	3
2.2	정의와 정리	3
3	TikZ 그림과 표	4
3.1	TikZ 그림	4
3.2	표	4
A	부록	5

Chapter 1

서론

이 문서는 `report` 클래스용 기본 템플릿이다. `article`과 달리 `\chapter`를 사용할 수 있고, 머리말에 현재 장(chapter) 제목이 표시된다.

Chapter 2

수식과 기호

2.1 기본 표기

선형대수에서 행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 전치는 A^T 로 쓰고, 프로베니우스 노름은 $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$ 로 정의한다.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \oint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV. \quad (2.1)$$

2.2 정의와 정리

정의 2.2.1 (노름 공간). 벡터공간 V 위의 함수 $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ 가 (i) $\|v\| \geq 0$, (ii) $\|v\| = 0 \iff v = 0$, (iii) $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$, (iv) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ 를 만족하면 노름이라 한다.

정리 2.2.2 (코시-슈바르츠 부등식). 내적공간 V 의 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Chapter 3

TikZ 그림과 표

3.1 TikZ 그림




Figure 3.1: 간단한 처리 흐름도

3.2 표

구분	설명	비고
1단계	자료 수집	-
2단계	자료 분석	통계 패키지 사용
3단계	결과 정리	표/그림 포함

Table 3.1: 진행 단계 예시

Appendix A

부록

부록 내용은 \appendix 이후 \chapter로 작성한다.