# Risperidone

약물학

제약공학과 2024012723 전시영

# 목차 Contents


01 **약물 소개 · 효능 · 효과** 성분 · 분류 · 제품 , 적응증

02 **작용기전** 조현병 배경 , D2 · 5-HT2A 차단 , 도파민 경로

03 **부작용** 추체외로 증상 · 고프로락틴혈증 · 대사 이상

# 1. 약물 소개 · 효능 · 효과

## 약물 정보

| | |
|---|---|
| *성분명* | 리스페리돈 (Risperidone) |
| *분류* | 비정형 (Atypical) 항정신병제<br>벤즈이속사졸 (Benzisoxazole) 유도체 |
| *ATC · 분자식* | N05AX08 · C23H27FN4O2 (410.5 g/mol) |
| *대표 제품* | 리스페달 (Risperdal, 한국얀센 ) 정 · 퀵릿정<br>( 퀵릿정 : 입안에서 녹는 구강붕해정 ) |

## 효능 · 효과 ( 적응증 )

**조현병** 주 적응증
양성 · 음성증상 개선 , 할로페리돌 (Haloperidol) 대비 추체외로 증상 ↓

**양극성 장애** 급성 조증
단독 또는 기분안정제와 병용

**자폐장애 관련 과민증** 소아 · 청소년
공격성 · 자해 · 짜증 감소

**치매 관련 공격성** 알츠하이머형 치매
지속적 공격성의 단기 치료

**한 줄 요약** 도파민을 막아 증상을 줄이고 , 세로토닌도 막아 부작용을 줄인 조현병 치료제


**참고문헌**

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr
Grant S, Fitton A. Drugs. 1994;48(2):253-273.
Marder SR, Meibach RC. Am J Psychiatry. 1994;151(6):825-835.
McCracken JT, et al. N Engl J Med. 2002;347(5):314-321.

# 2-1. 조현병과 도파민 가설


조현병 (Schizophrenia) 의 증상은 뇌 부위별 **도파민 (Dopamine) 불균형**으로 설명된다 .

| 양성증상 (Positive symptoms) | 음성증상 · 인지증상 (Negative · Cognitive) |
|---|---|
| 중뇌변연계 (Mesolimbic) 경로 | 중뇌피질 (Mesocortical) 경로 |
| 도파민 과다 ↑ | 도파민 부족 ↓ |
| 환청 · 망상 · 사고장애 | 무의욕 · 감정둔마 · 집중력 저하 |

→ 목표 : **변연계 도파민은 낮추고** , **피질 도파민은 유지 · 회복** 하는 약물

**참고문헌**
Howes OD, Kapur S. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.

# 2-2. 기전 1 · D2 수용체 차단




선조체 D2 점유율 **약 65% 이상**에서 항정신병 효과 , **80% 초과** 시 추체외로 증상 위험 증가



**참고문헌**

Kapur S, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(4):514-520.

Janssen PA, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;244(2):685-693.

# 2-3. 기전 2 · 5-HT2A 수용체 차단

세로토닌 (Serotonin) 은 5-HT2A 수용체를 통해 도파민 신경의 **도파민 유리를 억제**한다 .




**흑질선조체 (Nigrostriatal) 경로**
도파민 회복 → D2 차단 효과 일부 상쇄 → 추체외로 증상 감소


**중뇌피질 (Mesocortical) 경로**
전전두엽 도파민 증가 → 음성증상 · 인지기능 개선에 기여

5-HT2A 친화도가 D2 보다 높은 것이 **비정형 항정신병제**의 핵심 특징


**참고문헌**
Meltzer HY, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1989;251(1):238-246.
Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

# 2-4. 기전 3 · 수용체 결합 친화도

결합상수 (Ki) 가 **낮을수록** 수용체에 강하게 결합한다 .




막대 길이 : 결합력 ( 로그 척도 ), 숫자 : Ki 값

**해석**

· 5-HT2A 결합력이 D2 의 약 20 배
→ 저용량부터 세로토닌 차단

· α1 · H1 결합 → 기립성 저혈압 , 진정 , 체중 증가와 연관

· 무스카린 결합 거의 없음 → 항콜린 부작용 ( 입마름 , 변비 ) 적음


**참고문헌**

Leysen JE, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.

# 2-5. 기전 4 · 도파민 경로별 효과

| 경로 | 정상 역할 | 리스페리돈 작용 결과 |
|---|---|---|
| **중뇌변연계 (Mesolimbic)** | 감정 · 보상 | **D2 차단 → 양성증상 감소 ( 주된 치료 효과 )** |
| **중뇌피질 (Mesocortical)** | 인지 · 동기 | **5-HT2A 차단으로 도파민 회복 → 음성증상 개선** |
| **흑질선조체 (Nigrostriatal)** | 운동 조절 | 고용량에서 D2 과차단 → 추체외로 증상 |
| **결절누두 (Tuberoinfundibular)** | 프로락틴 억제 | D2 차단 → 프로락틴 상승 ( 리스페리돈에서 두드러짐 ) |

치료 효과는 **변연계 · 피질**에서 , 주요 부작용은 **선조체 · 결절누두** 경로에서 나타난다


**참고문헌**

Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

Howes OD, Kapur S. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.

# 2-6. 기전 5 · 기타 수용체와 대사체

| α1 아드레날린 수용체 차단 | H1 히스타민 수용체 차단 | 무스카린 수용체 |
|---|---|---|
| 혈관 수축 억제 | 각성 · 식욕 조절 억제 | 거의 결합하지 않음 |
| **기립성 저혈압 · 어지러움** | **진정 · 졸림 · 체중 증가** | **항콜린 부작용 적음** |

**체내 대사 ( 간 )**

**리스페리돈** → CYP2D6 효소 ( 수산화 반응 ) → **9- 하이드록시리스페리돈 ( 팔리페리돈 , Paliperidone)**


활성 대사체도 **리스페리돈과 비슷한 약효**를 가져 함께 치료 효과를 낸다


**참고문헌**

Grant S, Fitton A. Drugs. 1994;48(2):253-273.

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr

# 2-7. 작용기전 정리





**참고문헌**

Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

Leysen JE, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.

# 3. 부작용

| 흔함 | 주의 | 드물지만 중대 |
|---|---|---|
| 졸림 · 진정 | 고프로락틴혈증 → 유즙분비 · 월경이상 | 신경이완제 악성증후군 (NMS) |
| 불면 · 불안 · 두통 | 기립성 저혈압 · 어지러움 | 지연성 운동이상증 (Tardive dyskinesia) |
| 체중 증가 | 고혈당 · 이상지질혈증 | 고령 치매 환자 사망률 증가 ( 경고 ) |
| 추체외로 증상 ( 용량 의존적 ) | QT 간격 연장 | 과립구 감소증 |

부작용 대부분이 **수용체 차단 프로파일 (D2 · α1 · H1)** 로 설명된다 → 저용량 시작 , 정기적 체중 · 혈당 확인


**참고문헌**

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr

Haddad PM, Wieck A. Drugs. 2004;64(20):2291-2314.

Newcomer JW. CNS Drugs. 2005;19(Suppl 1):1-93.

# 참고문헌 References


1. 약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 (Risperidone) 의약품 상세정보 . https://www.health.kr
2. Leysen JE, Gommeren W, Eens A, et al. Biochemical profile of risperidone, a new antipsychotic. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.
3. Janssen PA, Niemegeers CJ, Awouters F, et al. Pharmacology of risperidone (R 64 766), a new antipsychotic with serotonin-S2 and dopamine-D2 antagonistic properties. J Pharmacol Exp Ther. 1988;244(2):685-693.
4. Grant S, Fitton A. Risperidone: a review of its pharmacology and therapeutic potential in the treatment of schizophrenia. Drugs. 1994;48(2):253-273.
5. Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.
6. Kapur S, Zipursky R, Jones C, et al. Relationship between dopamine D2 occupancy, clinical response, and side effects: a double-blind PET study of first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry. 2000;157(4):514-520.
7. Meltzer HY, Matsubara S, Lee JC. Classification of typical and atypical antipsychotic drugs on the basis of dopamine D-1, D-2 and serotonin2 pKi values. J Pharmacol Exp Ther. 1989;251(1):238-246.
8. Stahl SM. Describing an atypical antipsychotic: receptor binding and its role in pathophysiology. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.
9. Marder SR, Meibach RC. Risperidone in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry. 1994;151(6):825-835.
10. McCracken JT, McGough J, Shah B, et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. N Engl J Med. 2002;347(5):314-321.
11. Haddad PM, Wieck A. Antipsychotic-induced hyperprolactinaemia: mechanisms, clinical features and management. Drugs. 2004;64(20):2291-2314.
12. Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: a comprehensive literature review. CNS Drugs. 2005;19(Suppl 1):1-93.