

Sumário

Paracetamol	2
Nome Comercial:	2
Indicações de Uso:	2
Contraindicações:.....	2
Efeitos Colaterais Comuns:	2
Interações Medicamentosas:	2
Orientações para Uso Correto:	2
Loratadina.....	2
Nome Comercial:	2
Indicações de Uso:	2
Contraindicações:.....	3
Efeitos Colaterais Comuns:	3
Interações Medicamentosas:	3
Orientações para Uso Correto:	3
Omeprazol.....	3
Nome Comercial:	3
Indicações de Uso:	3
Contraindicações:.....	3
Efeitos Colaterais Comuns:	3
Interações Medicamentosas:	3
Orientações para Uso Correto:	3

Guia de Medicamentos para Atendentes de Farmácia

Elaborado por: [Seu Nome]

Data: 14 de agosto de 2024

Paracetamol

Nome Comercial:

Tylenol, Paracetamol

Indicações de Uso:

- Alívio de dores leves a moderadas (dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas).
- Redução da febre.

Contraindicações:

- Hipersensibilidade ao paracetamol.
- Insuficiência hepática grave.

Efeitos Colaterais Comuns:

- Reações alérgicas (raras).
- Elevação das enzimas hepáticas.

Interações Medicamentosas:

- Pode aumentar o risco de toxicidade hepática se combinado com álcool.
- Interação com medicamentos anticoagulantes, como varfarina.

Orientações para Uso Correto:

- Não ultrapassar a dose máxima recomendada de 4g por dia para adultos.
- Pode ser tomado com ou sem alimentos.

Loratadina

Nome Comercial:

Claritin, Loratadina

Indicações de Uso:

- Tratamento de alergias, como rinite alérgica e urticária.

Contraindicações:

- Hipersensibilidade à loratadina ou a qualquer componente da fórmula.

Efeitos Colaterais Comuns:

- Sonolência leve.
- Dor de cabeça.

Interações Medicamentosas:

- Não há interações medicamentosas significativas.

Orientações para Uso Correto:

- Tomar uma vez ao dia, preferencialmente no mesmo horário.
- Pode ser ingerido com ou sem alimentos.

Omeprazol

Nome Comercial:

Losec, Omeprazol

Indicações de Uso:

- Tratamento de úlceras gástricas e duodenais.
- Refluxo gastroesofágico (DRGE).
- Síndrome de Zollinger-Ellison.

Contraindicações:

- Hipersensibilidade ao omeprazol ou a qualquer benzimidazol.

Efeitos Colaterais Comuns:

- Dor de cabeça.
- Diarreia ou constipação.

Interações Medicamentosas:

- Pode diminuir a eficácia de medicamentos como o clopidogrel.
- Pode aumentar os níveis de diazepam, fenitoína e varfarina.

Orientações para Uso Correto:

- Tomar antes das refeições, preferencialmente pela manhã.
- Engolir a cápsula inteira, sem mastigar.