스포츠 물리치료학

Chapter 4 상해선수의 재활을 위한 심리적 고찰

Noh, Dong-koog P.T., PhD.

Department of Physical Therapy

학습목표

- 상해의 다양한 전조와 중재를 확인할 수 있다.
- 선수생활에서의 스트레스 인자를 설명할 수 있다.
- 스트레스 관리를 위한 완충제 개념을 이해할 수 있다.
- 재활기간에 따라 상해에 대한 반응의 진행을 설명할 수 있다.
- 재활의 4단계 시기를 위한 중재법을 통합할 수 있다.
- 비합리적인 사고와 그 해결책을 설명할 수 있다.
- 상해와 관련하여 선수가 자기의 행위에 대한 책임감과 중요성을 설명할 수 있다.
- 순응과 집착을 대조하고 비교할 수 있다.
- 재활에 대한 순응과 일탈(deviation)의 중요성을 분석할 수 있다.
- 임상적 우울과 자살기도에 대한 징후와 증상을 설명할 수 있다.
- 목표설정과 재활 승낙을 설명할 수 있다.
- 성공적인 재활에 필요한 대처 기술을 수행할 수 있다.
- 선수와 선수트레이너 관계의 중요성을 인식할 수 있다.

문화 적응

- 상해를 받은 선수가 익숙한 스포츠 문화에서 익숙하지 않은 재활 문화로 이동되는 것
- 스트레스 인자로 작용

상해받지 않은 선수	재활을 받는 상해선수
익숙한 활동(familiar activity)	익숙하지 않은 활동(unfamiliar activity)
익숙한 규칙(famlliar rules)	익숙하지 않은 규칙(unfamiliar rules)
익숙한 자리(familiar field)	익숙하지 않은 자리(unfamiliar area)
최고의 선수처럼(veteran player)	신인 선수처럼(rookie player)
익숙한 통증(familiar pain)	익숙하지 않은 통증(unfamiliar pain)
코치의 책임하에(coach in charge)	트레이너의 책임하에(ATC's in charge)
즉각적인 피드백(instant feedback)	늦춰진 피드백(feedback deferred)
자기 통제(Control)	자기 통제의 상실(loss of control)
성공이 측정됨(measure success)	측정이 다른 것으로(different measure)
활력적(vigorous)	활력 상실(loss of vigor)

그림 4-1 문화적응: 상해를 받은 선수는 스포츠 문화에서 상해 재활 문화로 바뀐다.[31]



그림 4-2 경기 복귀까지의 신체적 및 감정적 변화 측면.

상해의 전조

- 상해에 취약한 선수

- 위험을 즐기려는 사람
- 소심하고 의욕이 약하며 마음이 여리거나
- 걱정이 많고 과보호적이거나 방심을 잘하는 성격→ 스트레스 대응 능력 떨어짐
- 두려움을 없애기 위해 과도하게 공격적, 실패의 두려움, 과도한 목표설정

■ 스트레스와 상해의 위험

- 부정적인 스트레스(Andersen & William)

→ 주의 집중력 약화

→ 근육 긴장

→ 상해 유발 스트레스로 작용

a. 대학선수를 위한 생활사건 연구

(Life Events Survey for Collegiate Athletes, LESCA)

: Likert 식 8점척도

표 4-1 선수생활에서 가장 스트레스 반응으로 나타나는 사건 예

생활에서 스트레스가 되는 사건
가족의 죽음
억류와 감금
상해
가까운 친구의 죽음
새 코치와의 경기
새로운 팀과의 경기
개인적인 성취
생활 습관의 변화
사회 재적응
새로운 학교 전학
사회 활동의 변화

b. 기분상태측정(Profiles of Mood States, POMS)

(1) 긴장-두려움

(2) 우울

(3) 거부

(4) 분노와 적개심

(5) 피로-무력

(6) 혼돈-당황

- 재활 기간이 길어질 수록 더 심한 긴장, 우울, 분노가 나타남, 체력은 약해짐

스트레스 감소를 위한 중재

- 완충제(스트레스로 인한 증상완화 기술) 활용
  - 점진적인 이완 방법, 유산소운동, 식사 조절, 불면증 치료 및 시간 관리 프로그램
- 복식호흡(abdominal breathing)
  - 누운자세-앉은자세-선자세 순으로
- 이완기법(relaxation technique)

– 점진적 이완기법(10~15초 긴장, 15~20초 이완/ 3회 반복 실시)

- 상상(imagery); 마음속으로 경험 창조
  - 시각적 예행연습; 대응 예행연습(문제직면시), 지배예행연습(자신감, 동기유발), 초기연습에서 경기 상황까지
  - 감정 상상 예행연습; 성공, 칭찬 보상에 대한 시각화→ 자신감과 안정감
  - 몸짓 예행연습; 일상생활을 걸쳐 신체 내적 치유를 시각화, 치유기전에 대한 이해, 초음파 혈류 증가 시각화 → 회복 증진(levleva & Orlick)

그림 4-3 선수와 선수트레이너 사이의 밀접한 관계가 중요하다.

재활기간에 따른 점진적 반응들

재활기간	상해에 대한 반응	재활에 대한 반응	회복에 대한 반응
단기 (4주 미만)	충격 안심	조급 낙관	열정 기대
장기 (4주 이상)	두려움 분노	활력 상실 불합리한 사고 소외	용인
만성 (재발)	분노 좌절	독립성 또는 의존성 염려	자신감 또는 의구심
선수생활 종료	격리 슬픔의 과정	선수 정체성 상실	선수생활 마감과 새로운 시작

그림 4-4 상해의 정도와 재활의 기간에 따른 상해선수(injured athletes)의 점진적 반응.

그림 4-5 선수트레이너는 선수가 장기 상해에 대한 두려움을 떨칠 수 있도록 도와주어야 한다.

임상적 우울증의 일반적인 징후와 증상

1. 식사 습관과 수면 습관의 변화, 평상시보다 많거나 적어짐
2. 집중이 어려워짐
3. 전에 즐기던 활동에 흥미를 잃음
4. 스트레스성 상황에 부적절한 대처: 강박, 극단적인 흥분, 격분 또는 무반응, “난 모른다.”, “귀찮게 하지마.”, “어떻게 되든…….”
5. 담담한 감정표현—안면 표정의 정상적인 동요를 피하는 경우
6. 차를 마시거나, 친구와 가족을 만나 사회적인 지지를 받는 활동의 감소
7. 과거에 우울증을 앓은 적이 있거나 가족 중 우울증의 병력이 있는 경우

그림 4-6 임상적 우울증의 일반적 징후와 증상.

그림 4-9 환자와 선수트레이너는 존경과 신뢰의 관계를 만들어야 한다.

1. 임상적인 우울증의 증상이나 징후가 있는 경우

2. 도움을 받을 곳도 희망도 없어 보이는 느낌이 든 경우로 자살 외에는 스트레스를 극복할 길을 찾지 못하는 경우

3. 자살을 생각하거나 전에 자살을 시도한 경험이 있는 경우나 자살 경험이 있는 친구나 가족이 있는 경우

4. 자살을 시도하려는 돌이킬 수 없는 계획을 가진 경우(높은 빌딩에서 뛰어내리려는 계획 대신 약을 구입한 경우)

5. 자기 소유에 대하여 정리를 했거나, 유서를 썼거나, 마지막 의식을 갖고 친구에게 안녕이라고 말하는 등 주변정리를 시도한 경우

6. 자살할 것이라는 표현을 한 경우(여성들이 자살에 대해 남성보다 더 표현하나 남성들이 더 성공적이다)

그림 4-7 자살기도의 일반적 징후.

상해와 재활에 관한 불합리한 사고

과장: 상해의 정도(경, 중)와 상해의 의미에 관하여—"나는 좋은 체력을 가지고 있기에 그렇지 않은 사람보다 부러진 다리가 빠르게 나을 거야", "그저 삔 것인데 나빠지겠나?"

부주의: 재활치료에 대한 태만과 과욕—"몇 주 기다려보지. 그냥 좋아질 거야", "5가지를 한 번 반복하는 것이 좋다면 10가지를 두 번씩 반복하면 더 좋을 거야"

지나친 단순화: 재활을 좋은 것과 나쁜 것, 옳은 것과 틀린 것, 필요한 것과 불필요한 것으로 단순하게 생각—"전십자인대 수술 후 복귀한 사람은 없어.", "2주 내에 수술할 것인데 재활운동을 할 이유가 없지"

일반화: 한 선수의 상해를 모든 선수에게 적용하여 일반화하거나 한 선수의 재활의 결과를 모든 선수의 재활결과로 일반화—"모든 염좌는 2주 안에 낫는다", "네가 다시 경기를 하려고 계획할 때만 재활이 필요해"

타당성 없는 결론: 불건전한 생각이나 잘못된 정보에 기초한 결론—"한 선수는 하라는 대로 다 했는데도 그의 팔이 좋아지지 않았어", "뼈가 한 번 부러지면 다시는 빨리 달릴 수 없다더라"

그림 4-8 상해와 재활에 관하여 선수들이 갖는 사고의 패턴에 관한 예들.

선수생활을 종료해야 하는 상해에 대해 다루기

- 척수마비
- 광범위한 인공구조물(금속 나사, 금속 판 등) 이식 수술
- 악화되어 여러 곳을 수술한 경우
- 지속적인 쇠약과 선수생활이 불가능한 질병

재활에 대한 승낙과 고수

1. 승락과 고수의 정의

- 승낙(compliance)
  - 의사와 선수트레이너의 지시에 환자가 순종하는 것

- 고수(adherence)
  - 운동 분야에서 나온 용어
  - 치료계획을 수립함에 있어 상호성(mutuality)을 의미
  - 능동적인 선택

- 선 승낙-후 고수(comply now-adhere later) 접근법

2. 다른 분야에서의 승낙의 예

- 의학에서 승낙은 대략 50% 정도
- 1/3은 항상 승낙
- 1/3은 대체로 승낙
- 1/3은 절대로 받아들이지 않음

3. 승낙의 측정

- 자기보고서, 출석, 치료결과
- Hedgpeth/Gans-neder Athletic Rehabilitation Indicators; 치료법의 종류에 따라 시간 소요를 %로 나타냄

4. 승낙 여부에 영향을 미치는 요소

- 동료, 코치, 재활 스태프들의 지지
- 상해선수를 대함에 있어 태도(attitude)
- 선수 자신의 능력에 대한 인식의 정도

그림 4-10 지지적인 환경과 치료효과에 대한 믿음은 승낙 정도를 높여준다.

- 학생선수의 승낙정도의 상관관계
  - 정식 교육을 많이 받을수록 치료에 대한 승낙 정도가 높아진다.
  - 학기 평균 성적이 높을수록 치료의 승낙 정도가 높아진다.
  - 수업의 부담감과 승낙 정도 사이에는 반비례 관계가 나타난다.

승낙 정도의 제한요인으로서의 통증

- 통증의 분류
  - 경기 시 통증
  - 훈련 시 통증
  - 재활 시 통증
  - 급성 상해 시 통증
  - 과사용 만성 상해로 인한 통증

- 통증에 영향을 주는 요인
  - 스포츠 유형(접촉성, 비접촉성), 개인 또는 단체 경기

목표설정을 승낙 정도를 높이기 위한 동기부여 방법으로 사용

■ 목표 설정을 위한 지침

- 구체적이고 측정 가능할 것
- 부정적인 언어보다는 긍정적인 언어를 쓸 것
- 도전적이면서 현실적일 것
- 시간표가 있을 것
- 단기, 중기, 장기적 목표가 있을 것
- 결과를 과정에 연관시킬 것
- 내부화된 목표와 관련시킬 것
- 평가 목표가 경기 목표와 생활 목표가 연결되어 작성될 것

1~3주차	목표는 재활치료 전과 후에 이완기법을 사용하는 것 또는 복식호흡을 익히는 것이다. 이는 슬관절 신전, 균형운동 등을 시행할 때 강하고 많은 운동으로 인해 일어날 통증에 대한 두려움을 적게 한다.
4~7주차	이 기간은 지루하고 좌절하는 시기이다. 선수들은 재활에서 시행하는 운동들이 스포츠에서 사용된다는 상상으로 목표를 세워야 한다. 이러한 상상은 재활을 계속하는 동기부여가 된다.
8~11주차	통증 완화를 위해 분리를 사용하여 조깅, 줄넘기, 계단 뛰기 등을 실시할 때 근육들의 사용이 증가하며 발생되는 통증을 해결하려는 목표를 가진 기간이다.
12~15주차	이 시기는 실제적인 점검을 목표로 하는 시기이다. "경기에 복귀할 시기가 다가왔다" 또는 "터널이 끝나는 마지막이라 빛을 볼 수 있다."
15주~경기 복귀	이 시기는 긍정적인 것과 긍정적인 확신을 두는 것에 목표를 갖는다. "나는 거의 경기에 참가할 시기가 되었고, 매일 점점 강해지며, 경기할 준비가 다 되어 있다."

그림 4-11 재활의 진행에 따른 목표들.

■ 경기에 복귀

a. 선수트레이너의 역할

- 상해나 상해의 재발의 위험 없이 선수가 최대 기량으로 활동할 수 있을 때를 결정하는 것과 코치가 선수의 상태와 보조를 맞추도록 하는 것
- 선수에게 통증과 상해의 차이를 알려주는 것

요약

1. 선수가 상해에 반응하려 할 때 완전한 것은 없다. 그러나 재활기간에 따라 상해에 대한 반응이 진행되는 것에 따른 가이드라인이 있을 수 있다. 이 가이드라인은 선수 트레이너가 개인적인 스트레스 반응을 개념화하고 성공적인 재활의 촉진을 위한 심리적인 중재를 적용하도록 해준다.

2. 선수는 상해의 재활에 책임감을 가져야 하고, 선수와 스포츠의료 팀 간의 대인관계가 재활 과정에서의 긍정적인 적응을 도울 수 있다.

3. 통증관리에서 분리기법, 스트레스 완화를 위한 완충제 사용, 동기부여를 위한 목표설정 등과 같은 심리기법의 사용은 성공적인 재활의 관리와 조절에서 선수를 도울 수 있다.

4. 재활의 승낙 여부는 성공적인 재활에 있어 필수이다. 의료 분야에서의 진보는 10년 전에 선수생활을 마감시켰던 상해도 성공적으로 치료할 수 있게 한다. 재활에 대한 선수의 승낙 없이는 이러한 의료의 진보도 무색해진다.