

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklıklarında sırtı vurma tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkarılır.
- B) Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur.
- C) Kişi dik pozisyona getirilir.
- D) Kişi nefes aldığı anda sırtı vurma işlemi kesilir.
- E) Kişinin iki kürek kemiği arasına beş defaya kadar kuvvetlice vurulur.

Cevap Açıklama: (C)

2. Aşağıdakilerden hangisi kafa travması, felç olan hastayı/yaralıyı taşırken bireye verilmesi gereken pozisyonudur?

- A) Sırtüstü, düz olarak
- B) Düz, baş on derece kaldırılmış durumda
- C) Bacaklar kaldırılmış sırtüstü, düz olarak
- D) Sol yatmış durumda
- E) Yarı yüzüstü güvenli yan pozisyonda

Cevap Açıklama: (B)

3. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamaları için **yanlıştır**?

- A) Kanama bölgesinin üzeri kapatılmamalıdır.
- B) Turnike uygulamasında 15-30 dakikada bir 25-30 dakika ara verilip gevşetilir.
- C) Turnike 1.5 saatten fazla tutulmamalıdır.
- D) Turnike kol ve bacakta tek kemik üzerine uygulanmalıdır.
- E) Tansiyon aletinin manşonu turnike olarak kullanılabilir.

Cevap Açıklama: (İptal)

4. Yanık ve donma gibi durumlarda interstisyel aralıkta sıvı birikmesine ne ad verilir?

- A) Bül
- B) Papül
- C) Hematom
- D) Kontüzyon
- E) Nodül

Cevap Açıklama: (A) Bül: İnterstisyel aralıkta sıvı birikmesidir. Yanıklar, donmalar vb. durumlarda oluşabilirkurtarıcı var ise iki parmak tekniği meme başlarından geçtiği varsayılan hattın hemen altına yerleştirilmelidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi triyaj kartının arka yüzünde yer alan bilgi **değildir**?

- A) Hastaya verilen serumlar ve saatleri
- B) Hastaya verilen ilaç ve saatleri
- C) Müdahalede bulunan hekimin notu
- D) Hastanın sevk edildiği hastane bilgileri
- E) Olay yerindeki toplam hasta sayısı

Cevap Açıklama: (E) :Serumlar ve saatler, verilen ilaçlar ve saatleri,hekimin notu, hekimin kimliği, ikinci nakil ve birinci nakil bölümleri bulunmaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi travma yaşayan hastaya müdahale sırasında **doğru bir yaklaşımdır**?

- A) Hastanın yaşadığı travmayı basit görmek ve küçümsemek
- B) Travma yaşayan hastanın hemen toparlanmasını beklemek
- C) Travmayı atlatamayan hastayı eleştirmek ya da güçsüz görmek
- D) Hastaya yaşadığı olayı unutmasını ya da düşünmemesini söylemek
- E) Hastayı güvenli alana çıkarmak ve sakinleştirmek

Cevap Açıklama: (E)

7. Açık kırıklarda ilk yardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gerekmeyorsa yaraya dokunulmaz.
- B) Yaradan çıkan dokular içeri itilmez.
- C) Yara yıkanır.
- D) Temiz örtüyle yara kapatılır.
- E) Kırık sabitlenir.

Cevap Açıklama: (C) Açık kırıklarda ilk yardım: ☐ Gerekmeyorsa yaraya dokunulmaz. ☐ Yaradan çıkan dokular içeri itilmez. ☐ Yara yıkanmaz. ☐ Temiz örtüyle yara kapatılır ☐ Kırık sabitlenir.

8. Aşağıdakilerden hangisi bayılda yapılan ilk yardım uygulamalarından biri **değildir**?

- A) Solunum yolu açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.
- B) Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır.
- C) Olay yeri güvenliği sağlanır.
- D) Hastaya bol miktarda ağızdan sıvı verilir.
- E) Uyarı verilerek bilinç yönünden kontrol edilir.

Cevap Açıklama: (D)

9. Aşağıdakilerden hangisi yangının sınıflandırılmasında büyük yanıklar içerisinde **yer almaz**?

- A) Erişkinlerde %25'ten fazla 2. derece yanıklar
- B) Erişkin veya çocukta %2-10 arası 3. derece yanıklar
- C) Çocukta %20'den fazla 2. derece yanıklar
- D) Erişkinde veya çocukta %10'dan fazla 3. derece yanıklar
- E) İnhalasyon yanıkları

Cevap Açıklama: (B)

10. Aşağıdakilerden hangisi spontan solunumun olup olmadığını **değerlendirmede kullanılır**?

- A) Kolundan tansiyonu ölçülür.
- B) Hastaya "İyimisiniz?" diye sorulur.
- C) Her 5 dakikada vücut ısısı alınır.
- D) Ana arterden nabzına bakılır.
- E) Bak-dinle-hisset yöntemi ile 5-10 saniye dinlenir.

Cevap Açıklama: (E) Solunumun Değerlendirilmesi (B): Hava yolu uygun bir şekilde açıldıktan sonra, hava yolu açık tutularak çocuk veya bebeğin solunumu 5-10 sn. içinde kontrol edilir. Eğer çocuk veya bebekte solunumun olup olmadığına karar verilemedi ise solunum yokmuş gibi hareket edilir

11. Alkol zehirlenmeleri ve ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Etil alkol zehirlenmesi ani görme kayıplarına neden olur.
- B) Metil alkol beyindeki hücrelerin ölümüne neden olur.
- C) Etil alkol zehirlenmelerinde psikolojik bozukluklarda görülür.
- D) Metil alkolle gözle teması varsa en az 15 dakika süreyle göz yıkanır.
- E) Etil alkol zehirlenmelerinde kişi kusturulur, yoğurt ve süt verilir.

Cevap Açıklama: (A)

12. Aşağıdakilerden hangisi komaya neden olabilecek metabolik sorunlardan biri değildir?

- A) Diyabet
- B) Nörolojik sorunlar
- C) Epilepsi
- D) Üre artması
- E) Uyuşturucu

Cevap Açıklama: (E) Komaya neden olabilecek metabolik sorunlar; ☐ Diyabet (şeker) hastalığı ☐ Karaciğer yetmezlikleri ☐ Üre artması ☐ Ağır enfeksiyonlar ☐ Nörolojik sorunlar ☐ Sara (epilepsi) ☐ Havale

13. Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

- A) Kişi öncelikli olarak 20 derece civarında oda sıcaklığına alınmalı
- B) Kişiye hava akımı sağlanmalı
- C) Donmuş vücut kısmındaki elbiseler ve ayakkabı çıkarılmalı
- D) Kuru ısıtılmış giysiler giydirilmeli ve kuru, sıcak battaniyelerle örtülmeli
- E) Donmuş organ, alev, ateşe tutulmamalı

Cevap Açıklama: (B)

14. Yetişkin bir bireyde ani kan kaybı ne kadar olursa hayati tehlike söz konusu olur?

- A) %5
- B) %20
- C) %50
- D) %60
- E) %80

Cevap Açıklama: (B)

15. Aşağıdakilerden hangisi kan akımı ve oksijenlenmeyi azaltarak beyin ve beyin işlevlerini bozan metabolik nedenlerden biri değildir?

- A) Metabolik ansefalopatiler
- B) Alkol, ilaç zehirlenmeleri
- C) Enfeksiyonlar
- D) Histeri
- E) Nöron hastalıkları

Cevap Açıklama: (D)

16. Açık yaralarda ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.
- B) Yaralanmaya sebep olan cisim çıkarılır.
- C) Kanama varsa durdurulur.
- D) Ağız yolu ile yiyecek-içecek verilmez.
- E) Yaralının sağlık kuruluşuna sevkı sağlanır.

Cevap Açıklama: (B) Açık yaralarda ilk yardım; Çevre emniyetine dikkat edilir. Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (CAB). Yara bölgesi, oluş şekli, süresi, yarada yabancı cismin varlığı, kanama durumu, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu, fonksiyon kaybı yönünden değerlendirilir. Hemen 112 Acil Yardım Merkezinden tıbbi yardım istenir. Yaranın üzeri temiz bezle kapatılır. Kanama varsa durdurulur. Yaranın içerisinde toz, toprak vb. yabancı maddeler varsa bol temiz su ile yıkanarak uzaklaştırılır. Pamuk, kağıt mendil, peçete vb. yara üzerinde, lif bırakıp kolayca dağılıp enfeksiyon riski oluşturmaları nedeniyle konulmaz. Gerekirse sargı bezi ile sarılır. Yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur. Yara bölgesinin hareketi, ağrı ve kanamayı önlemek için engellenir. Yara içi kurcalanmaz. Ağız yolu ile yiyecek-içecek verilmez. Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür. Yaralı tetanos aşısı için yönlendirilir. Yaralının sağlık kuruluşuna sevkı sağlanır.

17. I. Geç zehirlenme yapan mantarlar daha az tehlikeli iken erken zehirlenme yapan mantarlar çoğu kez ölümlü sonuçlanır.

II. Amanita Phalloides, amanita muscaria ve amanita verna gibi mantar türleri çok zehirlidir.

III. Mantarların 100 kadar zehirli türü vardır ancak öldürücü zehirlenmeye neden olanların sayısı 10'u geçmez.

Mantar zehirlenmeleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

Cevap Açıklama: (A) Erken zehirlenme yapan mantarlar daha az tehlikeli iken geç zehirlenme yapan mantarlar çoğu kez ölümlü sonuçlanır.

18. Hastanın bilinç kontrolü aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

- A) Hastaya soğan koklatılır.
- B) Hastanın yüzüne su dökülür.
- C) Hasta, omuzlarından tutularak sıkıca sallanır.
- D) Hasta, burnu nefes almayacak şekilde sıkılır.
- E) Hastaya cevaplaması için soru sorulur.

Cevap Açıklama: (E) Çocuk hasta veya yaralıya hafifçe dokunulmalı "iyi misin?" diye yüksek sesle sorulmalı, adı biliniyorsa adıyla seslenilmelidir. Bebeğin ise ayak tabanına hafifçe vurularak bilinci kontrol edilmelidir. Çocuk veya bebek hareket eder, inler ya da cevap verirse hızla herhangi bir yaralanma ya da tıbbi yardım ihtiyacı olup olmadığına bakılmalı acil yardım sistemi aktive edilmelidir.

19. Aşağıdakilerden hangisi kanama ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

- A) Kanamanın hızı
- B) Kanama bölgesi
- C) Kanama miktarı
- D) Kişinin yaşı
- E) Cinsiyet

Cevap Açıklama: (E) Kanama ciddiyetini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları; • Kanamanın hızı: Arter kanamaları gibi kanama hızının fazla olduğu durumlarda, daha fazla miktarda kan kaybedildiği için kanamanın ciddiyeti artar. • Kanama bölgesi: Kafa ve göğüs yaralanmalarındaki kanamalar gibi kanamanın hayati organlarda olduğu durumlarda kanama ciddiyeti artar. • Kanama miktarı: Dolaşımdaki kanın %20'si akut olarak kaybedildiği zaman kalbin atım hacmi %20-40 oranında azalır. Bu nedenle kaybedilen kan miktarı arttıkça kanamanın ciddiyeti de artar. • Kişinin yaşı: Bebekler ve çocukların tolere edebileceği kan miktarı daha az olduğu için bu yaşlarda kanamanın ciddiyeti artar.

20. Aşağıdakilerden hangisi ön kol kırığı için tespit yöntemlerinden biri değildir?

- A) Gövde ile tespit
- B) Ceket ile tespit
- C) Tek atel ile tespit
- D) İki atel ile tespit
- E) Üç atel ile tespit

Cevap Açıklama: (E)

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. B 3. lptal 4. A 5. E 6. E 7. C 8. D 9. B 10. E 11. A 12. E 13. B 14. B 15. D 16. B 17. A 18. E 19. E 20. E