

Zadanie 1.

Zbadaj jednostajną ciągłość i lipschitzowskość funkcji zadanych wzorami:

- (a) $f(x) = 2^{\sqrt{x}}, \quad f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (b) $f(x) = \log x, \quad f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (c) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \quad f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (d) $f(x) = \arctg(x), \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- (e) $f(x) = \exp(\cos(x)), \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Rozwiązanie

- (a) Gdyby to było jednostajnie ciągłe, to istniałoby takie M , że dla $x \geq 1$ zachodziłoby $2^{\sqrt{x}} \leq Mx$, czyli podstawiając $\sqrt{x}$ za x dostajemy $2^x \leq Mx^2$, czyli $2^n \leq Mn^2$ dla $n \geq 1$, co przeczy hierarchii ciągów. Tak więc to też nie jest lipschitzowskie.
- (b) Gdyby to było jednostajnie ciągłe, to dla każdego ε istniałoby takie δ , że dla $|x - y| < \delta$ zachodziłoby $|\log x - \log y| < \varepsilon$. Weźmy dowolne $\varepsilon < 1$ i $\delta < 1$, $x = \delta$, $y = \delta^{-\frac{1}{\log \delta} + 1}$. Wtedy $|x - y| < x = \delta$, ale

$$|\log x - \log y| = |\log \delta^{-\frac{1}{\log \delta} + 1} - \log \delta| = 1 > \varepsilon$$

Tak więc to nie jest jednostajnie ciągłe ani lipschitzowskie.

Zadanie 4.

Założmy, że $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest jednostajnie ciągła. Wykaż zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)).$$

Rozwiązanie

Skoro f jest jednostajnie ciągłe, to istnieje takie M , że $|f(n)| \leq Mn$. Niech $A_N = \sum_{n=1}^N (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)) = f(n+2) - f(n+1)$. f jest lipschitzowskie, więc $|A_N| \leq L((n+2) - (n+1)) = L$ dla pewnego L . Obliczmy sumy częściowe szeregu za pomocą przekształcenia Abela:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)) = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{A_n}{n(n+1)} + \frac{A_N}{N}$$

Widzimy, że ciąg (S_N) jest sumą dwóch ciągów. Drugi jest zbieżny do 0, bo $|\frac{A_N}{N}| \leq \frac{L}{N} \rightarrow 0$, a pierwszy ciąg jest zbieżny, bo to sumy częściowe szeregu, który jest bezwzględnie zbieżny:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{A_n}{n(n+1)} \right| \leq L \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

Zatem ciąg (S_n) jest zbieżny, czyli badany szereg jest zbieżny.