

Zadanie 1.

Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

- (a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}$
- (b) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right), \quad a, b, c > 0$
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}}{n}$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}, \quad c \in \mathbb{R}$
- (e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})(\log n)^2}{n}$
- (f) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n^3 + n + 1}{3n^2 - 1} \rfloor} \frac{1}{n - \ln n}$
- (g) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha + \sin n}, \quad \alpha > 0$

Rozwiązanie

- (a) Rozbieżność bezwzględną można pokazać korzystając z I kryterium porównawczego i szacując szeregiem $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n} + 1$, a ten z kolei, z asymptotycznego kryterium porównawczego, jest zbieżny w.t.w. gdy $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n}$ jest zbieżny, bo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{\sqrt[3]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1$$

a ten z kolei jest rozbieżny, bo to szereg modelowy, który znamy. Aby wykazać zbieżność, pominiemy pierwszy składnik i przedstawimy jako różnicę dwóch szeregów, o których trzeba wykazać, że są zbieżne (w sensie wtedy przedstawienie jako różnica szeregów będzie uzasadnione). Korzystamy przy okazji z tw. o kontenerach, żeby pogrupować wyrazy (widać, że po pogrupowaniu składniki są nieujemne, czyli założenie tego twierdzenia jest spełnione):

$$\begin{aligned} & \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}} = \\ & \sum_{n>2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} \right) - \sum_{n>2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} - 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} - 1} \right) \end{aligned}$$

Pokażę zbieżność pierwszej sumy, bo druga wychodzi analogicznie. Możemy odwrócić znak i korzystając z I kryterium porównawczego, dorzucić wyrazy dla pozostałych n , czyli badamy zbieżność czegoś takiego:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)} = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)} \end{aligned}$$

To możemy porównać do szeregu modelowego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$, o którym wiadomo, że jest zbieżny:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)}{n^{\frac{4}{3}}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(1 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt[3]{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}\right) = 1$$

- (b) Zauważmy, że $|\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a| = |e^{\frac{1}{n} \log a} - 1 - \frac{1}{n} \log a| \leq |\frac{1}{n} \log a|^2$, czyli skoro szereg $\sum_{n=2}^{\infty} |\frac{1}{n} \log a|^2 = |\log a|^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny, to z I kryterium porównawczego szereg $\sum_{n=2}^{\infty} |\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a|$ jest zbieżny, czyli $\sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a)$ też. Podobnie dla b i c , czyli

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \log a - \frac{1 + \frac{1}{n} \log b + 1 + \frac{1}{n} \log c}{2} \right) +$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a - \frac{\sqrt[n]{b} - 1 - \frac{1}{n} \log b + \sqrt[n]{c} - 1 - \frac{1}{n} \log c}{2} \right)$$

i to jest zbieżne, gdy pierwszy człon jest zbieżny. Możemy uprościć pierwszy człon, jest on równy $(\log a - \frac{\log b + \log c}{2}) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ czyli to jest zbieżne w.t.w. gdy

$$\log a - \frac{\log b + \log c}{2} = 0$$

$\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2}$ różni się od $\frac{1}{n}(\log a - \frac{\log b + \log c}{2})$ o maksymalnie

$$\frac{1}{n^2} \left((\log a)^2 + \frac{(\log b)^2 + (\log c)^2}{2} \right)$$

a iloraz tych wyrażeń zbiega do 0 (tak jak $\frac{1}{n}$), czyli od pewnego momentu ciąg $\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2}$ ma ten sam znak, czyli zbieżność bezwzględna też zachodzi w.t.w. gdy $\log a - \frac{\log b + \log c}{2} = 0$.

- (c) Szereg jest bezwzględnie rozbieżny, bo $\sum_{n=1}^{\infty}$ jest rozbieżny. Sprawdźmy, czy warunek Cauchy'ego jest spełniony dla przedziału składników od e^m do e^{m+1} , gdzie m jest dowolnie duże. Te składniki mają ten sam wykładnik w $(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}$, czyli ten sam znak, więc wartość bezwzględna ich sumy jest równa $H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - H_{\lfloor e^m \rfloor - 1}$. Możemy obliczyć granicę tego wyrażenia:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - H_{\lfloor e^m \rfloor - 1}) = \lim_{m \rightarrow \infty} H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - \log(\lfloor e^{m+1} \rfloor) -$$

$$\log\left(\frac{e^{m+1}}{\lfloor e^{m+1} \rfloor}\right) - \gamma - (H_{\lfloor e^m \rfloor - 1} - \log(\lfloor e^m \rfloor - 1) - \gamma) + \log\left(\frac{e^m}{\lfloor e^m \rfloor - 1}\right) + 1 = 1$$

Suma składników na przedziale nie zbiega do 0, czyli szereg nie jest zbieżny.

(d) Gdy $c \notin [-2, 2]$, to co drugi składnik ma wartość bezwzględną równą:

$$\frac{(3a)^n}{n^2(3^n - n)} \geq \frac{(3)^n a^n}{n^2 3^n} = \frac{a^n}{n^2} \rightarrow \infty$$

gdzie $a > 1$, czyli wtedy nie jest spełniony warunek konieczny.

Gdy $c \in [-2, 2]$, to okazuje się, że szeregi składające się z co drugich wyrazów są zbieżne bezwzględnie, czyli ich suma też. Badamy $\sum \frac{|c+1|^n}{n^2(3^n-n)}$ oraz $\sum \frac{|c-1|^n}{n^2(3^n-n)}$. Zauważmy, że oba te szeregi są postaci $\sum \frac{(3d)^n}{n^2(3^n-n)}$, gdzie $d \leq 1$. Porównajmy to do szeregu modelowego $\sum \frac{1}{n^2}$ za pomocą asymptotycznego kryterium porównawczego:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2(3^n-n)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{3^n}} = 1$$

Skoro szereg modelowy jest zbieżny, to badane szeregi też. Zatem szereg wejściowy jest zbieżny bezwzględnie gdy $c \in (-2, 2)$.

(e) Ciąg sum częściowych $(-1)^{\lfloor n/13 \rfloor}$ jest ograniczony (przez 13) i ciągi $\frac{1}{\sqrt{n}}$ oraz $\frac{2(\sin \frac{\pi}{2n})^2}{\sqrt{n}}$ są monotoniczne i zbieżne do 0, czyli z kryterium Dirichleta zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{1}{\sqrt{n}} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{2 \left(\sin \frac{\pi}{2n} \right)^2}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})}{\sqrt{n}}$$

Wykażmy, że ciąg $\frac{(\log n)^2}{\sqrt{n}}$ jest malejący. Wystarczy wykazać nierówność pomiędzy kolejnymi elementami, albo równoważnie:

$$\left(\frac{\log(n+1)}{\log n} \right)^2 < \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

Z odwrotnej nierówności Bernoulliego:

$$\left(\frac{\log(n+1)}{\log n} \right)^4 = \left(1 + \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} \right)^4 < \left(1 + \frac{1}{n \log n} \right)^4 < \frac{1}{1 - \frac{4}{n \log n}} \dots < 1 + \frac{4}{n \log n}$$

Możemy więc znowu skorzystać z kryterium Dirichleta i wywnioskować zbieżność.

Zadanie 5.

(a) Niech $(a_n)_{n \geq 0}$ oraz $(b_n)_{n \geq 0}$ będą monotonicznymi ciągami zbieżnymi do 0. Wykaż, że iloczyn Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$a_n(b_0 + \dots + b_n) \rightarrow 0 \quad \text{oraz} \quad b_n(a_0 + \dots + a_n) \rightarrow 0$$

(b) Zbadaj zbieżność iloczynu Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^b}$, gdzie $a, b > 0$.

Rozwiązanie

(a) .

- (b) Wiemy, że iloczyn Cauchy'ego tych szeregów jest zbieżny w.t.w. gdy ciągi $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ oraz $\frac{1}{n^b} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^a}$. Skupmy się na razie na pierwszym z nich, bo drugi wychodzi analogicznie. Gdy $b > 1$, to $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^b} < \infty$, czyli $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ jest ograniczone, a $\frac{1}{n^a}$ jest dowolnie małe, czyli wtedy ciąg jest zbieżny. Gdy $b = 1$, to $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b} = H_n < \log n + 1$, czyli z hierarchii ciągów $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ zbiega do 0. Możemy oszacować od dołu i od góry metodą kondensacyjną:

$$\sum_{min}^{max}$$