

L6.3. 2 punkty Niech T_n ($n = 0, 1, \dots$) oznacza n -ty wielomian Czebyszewa.

(a) Podaj postać potęgową wielomianu T_5 .

(b) Jakimi wzorami wyrażają się współczynniki wielomianu T_n przy x^n i x^{n-1} ?

(a) Podaj postać potęgową wielomianu T_5 .

$$\begin{aligned} T_2(x) &= 2x \cdot x - 1 = 2x^2 - 1 \\ T_3(x) &= 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 2x - x = 4x^3 - 3x \\ T_4(x) &= 2x(4x^3 - 3x) - (2x^2 - 1) = \\ &= 8x^4 - 6x^2 - 2x^2 + 1 = 8x^4 - 8x^2 + 1 \\ T_5(x) &= 2x(8x^4 - 8x^2 + 1) - (4x^3 - 3x) = \\ &= 16x^5 - 16x^3 + 2x - 4x^3 + 3x = 16x^5 - 20x^3 + 5x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_k &= 2x T_{k-1}(x) - T_{k-2}(x), \quad k \geq 2 \\ T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= x \end{aligned}$$

(b) Jakimi wzorami wyrażają się współczynniki wielomianu T_n przy x^n i x^{n-1} ?

Możemy zaobserwować że jest to $0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$, a więc 2^{n-1} . Udowodnimy to indukcyjnie.

1) dla $n=1$ mamy $T_1(x) = x = 2^{1-1}x = x$ ✓

2) Założymy że zachodzi o n , udowodnimy dla $n+1$:

$$\begin{aligned} T_{n+1}(x) &= 2x T_n(x) - T_{n-1}(x) = \\ &= 2x(2^{n-1}x^{n-1} + \dots) - (2^{n-2}x^{n-2} + \dots) = \\ &= 2^n x^n + \dots \quad (\text{gdzie będą już tylko wyrazy niższego stopnia}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

• Dla x^{n-1} działa to analogicznie