

Lista nr 2 z matematyki dyskretnej



1. Na kartce w kratkę zaznaczono 5 punktów kratowych (czyli punktów o obu współrzędnych całkowitoliczbowych). Wykaż, że środek odcinka łączącego pewne dwa spośród tych punktów jest także punktem kratowym.

✓ 2. (+) Dany jest ciąg liczb naturalnych a_1, a_2, \dots, a_n . Pokaż, że istnieją takie i oraz j , $i \leq j$, że suma $a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$ jest podzielna przez n .

✓ 3. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n istnieje liczba podzielna przez n , której zapis dziesiętny złożony jest tylko z zer i jedynek.

✓ 4. Wybieramy 55 liczb naturalnych takich, że: $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_{55} \leq 100$. Pokaż, że jakkolwiek byśmy je nie wybrali, jakieś dwie będą różnić się o 9.

✓ 5. Pokaż, że spośród dowolnych trzech liczb całkowitych potrafimy wybrać dwie a i b takie, że $a^3b - ab^3$ jest podzielne przez 10.

✓ 6. (-) W ka e pole szachownicy $n \times n$ wpisujemy jedną z liczb: $-1, 0, 1$. Następnie dodajemy do siebie liczby stojące w tej samej kolumnie, w tym samym wierszu i na tej samej przekątnej. Udowodnij,  e wśród otrzymanych sum co najmniej dwie s y r one.

✓ 7. (-) Na okr gu zapisujemy w dowolnej kolejno ci liczby naturalne od 1 do 10. Pok z,  e zawsze znajd a si  trzy s siednie, których suma wynosi przynajmniej 18.

✓ 8. Podaj interpretacj e nast puj ej to samo ci w terminach zbiorów:

$$\binom{n}{k} \binom{k}{m} = \binom{n}{m} \binom{n-m}{k-m}$$

✓ 9. (+) Wyka  prawdziwo to samo ci Cauchy'ego:

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i}.$$

1

L	1	2	3/4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1?	1	1	2	1

Czy potrafisz udowodni  j  kombinatorycznie? ✓

✓ 10. Na ile sposob  3n dzieci mo e uformowa  trzy równoliczne koła g miste? (Dwie formacje s y r one jesli istnieje dziecko, kt re kogo innego trzyma lew  rek  w obu uk adach lub kogo innego praw  rek .)

✓ 11. Niesi  n b edzie liczb  naturaln . Na ile sposob  mo na pokolorowa  pola tablicy $n \times n$ na dwa kolory (ka de pole jednym kolorem) tak, by liczba p o jednego koloru nie przewy szala liczby p o drugiego koloru o wiecej ni  1?

✓ 12. Udowodnij przez indukcj ,  e dla ka dego naturalnego n zachodzi:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}.$$

✓ 13. (2p) (+) Oblicz liczb  funkcji niemalej cych postaci $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$

✓ 14. Na ile sposob  mo na wrzuci  2n kulek do k szuflad tak, by w ka dej szufladzie znalaz a si  parzysta liczba kulek? A na ile sposob  mo na wrzuci  2n + 1 kulek do 2k + 1 szuflad tak, by w ka dej szufladzie znalaz a si  nieparzysta liczba kulek?

20 2 pl

1. Na kartce w kratkę zaznaczono 5 punktów kratowych (czyli punktów o obu współrzędnych całkowitoliczbowych). Wykaż, że środek odcinka łączącego pewne dwa spośród tych punktów jest także punktem kratowym.

Mamy cztery możliwości wyboru
 (P,P) , (N,N) , (P,N) , (N,P)

Wybieramy więc punktów, w jednym „koszyku” będą więc
 co najmniej dwa punkty \Leftrightarrow dwa punkty będą miały też same porządkość
 obu współrzędnych.

porządko + porządko = całkowite
2

punktel (według porządkości).

nieporządko + nieporządko = całkowite
2

Musimy otrzymać więc min. jeden punkt kratowy

2. (+) Dany jest ciąg liczb naturalnych a_1, a_2, \dots, a_n . Pokaż, że istnieją takie i oraz j , $i \leq j$, że suma $a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$ jest podzielna przez n .

$$S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Istnieje n takich sum

Udowodnijmy problem nie w prost

Mamy dwie opcje:

I) Które z tych sum różni się modulo n :
- Mamy więc n różnych grup modulo $n \Rightarrow$ mamy grupy O , spezjalność

II) Dwie sumy z różnych samym modulo n

$S_i \equiv S_j \pmod{n} \Leftrightarrow S_j - S_i \equiv 0 \pmod{n}$

i równocześnie $S_j - S_i = a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_j$ spezjalność

Muszą więc istnieć takie i oraz j

*możliwe że będą z te razem

3. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n istnieje liczba podzielna przez n , której zapis dziesiętny składa się tylko z zer i jedynek.

Dla każdego n możemy wziąć $n+1$ liczb z sześciu jedynek
 $(1, 11, 111, \dots, 11\dots1)$

Liczymy modulo n każdego z tych liczb

Jesli którakolwiek $x \bmod n = 0$ konczymy dowód
 Przypuśćmy dwa reszty będące równe, liczby z których te reszty liczymy oznaczmy jako a i b
 (odejmując jedynki od jedynek dostajemy 0)

Wtedy $(b-a) \bmod n = 0$ (o ile odejmując jedynki od jedynek dostajemy 0)

$$\begin{array}{l} \text{n=3} \\ 1, 11, 111, 1111 \end{array}$$

$$111 \bmod 3 = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{ew. } 111 \% 3 = 111 \% 3$$

$$1111 - 1 = 1110$$

$$1110 \% 3 = 0 \quad \checkmark$$

4 (done)

15 October, 2023 09:18

4. Wybieramy 55 liczb naturalnych takich, że: $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_{55} \leq 100$. Pokaż, że jakkolwiek byśmy je nie wybrali, jakieś dwie będą różnić się o 9.

Dzięć grup modulo (0 - 8)

1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100
2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92

9, - - - - , - , 99

w kolidę z grupą mały ilość 12 elementów
(w 8 il., w 4 il.)

Do rozdzielenia 55 liczb $(55-1)/9 = 6$
w jednej 7, reszta 6

7 cyfr na 12 miejsc = przynajmniej dwie będą ze sobą graniczące
a więc będą oddalone o 9

(podzielność
przez 2 i 5)

5. Pokaż, że spośród dowolnych trzech liczb całkowitych potrafimy wybrać dwie a i b takie, że $a^3b - ab^3$ jest podzielne przez 10.

$$a^3b - ab^3 = ab(a^2 - b^2) = ab(a-b)(a+b)$$

Wów. $ab(a-b)(a+b) \equiv 0 \pmod{5}$

jeśli którakolwiek jest mod 0 lub są równe to wów. spełnione. Pozostałe opcje:

$$\{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$$

Dla każdego przypadku mamy $1+4$ lub $2+3 \equiv 0 \pmod{5}$

Jest więc podzielne przez 5

dla podz. przez 2 analogicznie

Podz. przez 2 i 5 \Rightarrow podz. przez 10 c.n.u.

6. (-) W każde pole szachownicy $n \times n$ wpisujemy jedną z liczb: $-1, 0, 1$.

Następnie dodajemy do siebie liczby stojące w tej samej kolumnie, w tym samym wierszu i na tej samej przekątnej. Udowodnij, że wśród otrzymanych sum co najmniej dwie są równe.

$\forall n \in \mathbb{N}$ mamy $2n+1$ sum (podteki)
(n w kolumnach i zero)


$\forall n \in \mathbb{N}$ mamy $2n+2$ sumy
(n kolumn, n wierszy, 2 przekątne)

wykazujemy $2n+2$ do $2n+1 \Rightarrow$ min. 1 podwójne (równe) c.n.u.

7. (-) Na okręgu zapisujemy w dowolnej kolejności liczby naturalne od 1 do 10. Pokaż, że zawsze znajdą się trzy sąsiednie, których suma wynosi przynajmniej 18.

wykresujemy jedynkę - zostają nam 3 grupy po trzy liczby
 $1+2+\dots+10 = 55$
 $55-1=54$
 $54/3=18$

jeśli podzielimy po równo, to mamy 3×18
 jeśli jakkolwiek grupa będzie mniejsza,
 to inna „przejmie nadmiar”



8 (done)

15 October, 2023 09:19

8. Podaj interpretację następującej tożsamości w terminach zbiorów:

$$\binom{n}{k} \binom{k}{m} = \binom{n}{m} \binom{n-m}{k-m}$$

no logilę + rysunek

$k \leq n, m \leq k$

$m \leq n, k-m$ wokół $m = n-m$

9. (+) Wykaż prawdziwość tożsamości Cauchy'ego:

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i}.$$

Czy potrafisz udowodnić ją kombinatorycznie? \downarrow

Każdy dowód indukcyjny:



$$(0) \quad \binom{m+n}{r} = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i}.$$

Indukcja względem m :

I $m=0$ dla $i \neq 0$ mamy $\binom{0}{i} = 0$, mamy więc

$$\binom{0}{r} = \binom{0}{0} \binom{n}{r-0} \quad (\text{oczywiście prawda})$$

II zauważmy dla pewnego m i dowolnych $n, k \in \mathbb{N}$,
położmy \forall :

$$\binom{m+n+l}{r} = \sum_{i=0}^r \binom{m+i}{i} \binom{n}{r-i}$$

Wybieramy tyle samo osób z takiej samej ilości osób - zbiory będą więc równe

rozbijamy $\binom{m+l}{r}$ na dwa symbole

$$P = \sum_{i=0}^r \binom{m+l}{i} \binom{n}{r-i} = \sum_{i=0}^r \left(\binom{m}{i} + \binom{m}{i-1} \right) \binom{n}{r-i} =$$

$$\sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i} + \sum_{i=0}^r \binom{m}{i-1} \binom{n}{r-i} =$$

rozłączamy sumę

$$\binom{m+n}{r} + \sum_{i=0}^{r-1} \binom{m}{i} \binom{n}{r-i-1} =$$

wyliczamy jedną sumę, przekształcamy drugą

$$\binom{m+n}{r} + \binom{m+n}{r-l} = \binom{m+n+l}{r} = \boxed{c. A. Q.}$$

wyliczamy drugą sumę i zwijamy

10. Na ile sposobów $3n$ dzieci może uformować trzy równoliczne kola gra-niste? (Dwie formacje są różne jeśli istnieje dziecko, które kogo innego trzyma lewą ręką w obu układach lub kogo innego prawą ręką.)

$$\frac{\binom{3n}{n} \cdot \binom{n}{2}! \cdot n!}{\binom{3n}{2}!} = \frac{(3n)!}{(2n)! \cdot n!} \cdot \frac{n!}{(n-2)!} = 3n!$$

Tak, czy git

Uproszczając do jednego ciągu $3n!$

Wybierając najpierw n z $3n$ dzieci uproszcza się do tego samego więc chyba git

jednak $(n-1)!$ bo różne ustawienia tego samego kota
 op. 1 2 3 2 3 4

11. Niech n będzie liczbą naturalną. Na ile sposobów można pokolorować pola tablicy $n \times n$ na dwa kolory (każde pole jednym kolorem) tak, by liczba pól jednego koloru nie przewyższała liczby pól drugiego koloru o więcej niż 1?

n	polar	opposite
1	1	2
2	4	
3	9	
4	16	

będę dla uproszczenie pisać
czętny / biały (C/B)

Zawierająca się dla: rozwiązywanie równości
- n porządkowych rozwiązywamy tylko
- n nieporządkowych tylko to zawsze o l

№ ile sposobów możemy wybrać?

$$\frac{\pi^2}{2} \rho_0 l \approx \pi^2 \rho_0 l$$

olla n porcystych

bo dwa
kolory

2. $\left(\begin{array}{c} r \\ r \\ \frac{r}{2} - l \end{array} \right)$ dla r nieparzystych

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

12. Udowodnij przez indukcję, że dla każdego naturalnego n zachodzi: $\binom{n}{k} = 1$ dla $k=0 \cup k=n$

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}.$$

$$\text{I } \sum_0^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} + \binom{n}{0} a^0 b^{n-0} = b + a = a + b = (a+b)^n \quad \checkmark$$

II zat. dla n ud. dla $n+1$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b) \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} = \text{wychodzimy od lewej i rozpisujemy}$$

$$a \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} + b \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} = \text{rozbijamy sumy na } a \text{ i } b$$

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{i+1} b^{n-i} + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i+1} = +1 \text{ do odpowiednich potęg}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} a^{i+1} b^{n-i} + \binom{n}{n} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i+1} + \binom{n}{0} b^{n+1} = \text{wyjmujemy po wiazie z Newtona i sum}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} a^{i+1} b^{n-i} + \binom{n}{n} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i+1} + \binom{n}{0} b^{n+1} = \text{przesuwamy pierwszą sumę o } b \text{ i symbole Newtona przy zmiennej}$$

$$\binom{n+1}{n+1} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \left[\binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} \right] a^i b^{n-i+1} + \binom{n+1}{0} b^{n+1} = \text{Łączymy sumy}$$

$$\binom{n+1}{n+1} a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n+1}{i} a^i b^{n-i+1} + \binom{n+1}{0} b^{n+1} = \text{zwijamy symbol Newtona przy sumie}$$

$$\sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} a^i b^{n+1-i} \text{ suma start o jeden w dół i odp. potęga przy } b$$

Doprowadzone do postaci c prawej strony. Dowód skończony

+13 (done)

15 October, 2023 09:19

13. (2p) (+) Oblicz liczbę funkcji niemalejących postaci
 $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$.

sticks and stars - rozpisane na papierze

tu ktoś też dobrze rozpisał.

<https://math.stackexchange.com/questions/2231965/count-number-of-increasing-functions-nondecreasing-functions-f-1-2-3-l>

14 (done)

15 October, 2023 09:19

- a) Na ile sposobów można wrzucić $2n$ kulek do k szuflad tak, by w każdej szufladzie znalazła się parzysta liczba kulek? A na ile sposobów można wrzucić $2n+1$ kulek do $2k+1$ szuflad tak, by w każdej szufladzie znalazła się nieparzysta liczba kulek?

$$\text{a)} \binom{1}{k} \quad \text{(rozważamy pary, zawsze po dwie rzucimy, no bo żadne)}$$

(końce kulek sole w tej samej ilości to żadna chyba)

b) Nieparzyste w każdej - wszędzie co najmniej jeden

Najmniej różnicę, np. pierw 2k+1 kul (po każdej)

$$2n+1 - 2k-1 = 2n-2k = 2(n-k)$$

resztę rozważamy ponownie jak w a)

$$\binom{2k+1}{n-k}$$

<https://math.stackexchange.com/questions/2231965/count-number-of-increasing-functions-nondecreasing-functions-f-1-2-3-ld>

frohe i noczej
ponyst dobrą olejicks
no koniec stors & ticks