

## Planches (mode muet)

### Le squelette du membre inférieur et ses articulations

slide 271



1. (où le sacrum rejoint l'ilium, en haut de la ceinture pelvienne)

2. (hanche ; acétabulum + tête fémorale)

3. (la patella, en avant du genou)


4. (genou ; entre les 2 os longs)

5. (juste sous le genou, côté fibula)

6. (cheville ; tibia + fibula + talus)

### L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties

slide 277



1. (partie supérieure, la plus large)


2. (anneau central ; reçoit la tête fémorale (coxo-fémorale))

3. (partie postéro-inférieure)

4. (partie antéro-inférieure)

**Le quadriceps  
fémoral : ses  
4 chefs, une  
terminaison  
commune**


slide 311



1. (seul chef dont l'origine est détachée du fémur, plus haut (os coxal))
2. (origine sur le bord latéral du fémur, côté gauche du schéma)
3. (seul chef dont l'origine arrive du côté droit du schéma)
4. (trait pointillé, tout contre le fémur : profond, caché sous le droit fémoral)
5. (terminaison commune des 4 chefs, sous la patella)

**Les ischio-  
jambiers : une  
origine  
commune, 3  
terminaisons**

slide 320



1. (origine commune des 3 muscles, en haut)
2. (le trajet le plus latéral (vers la droite))
3. (trajet médial, le plus long (le plus bas))
4. (trajet médial, le plus court (s'arrête au niveau du genou))
5. (terminaison latérale, du biceps fémoral)
6. (terminaison médiale superficielle, du semi-tendineux)
7. (terminaison médiale profonde, du semi-membraneux, au niveau du genou)

## Questions

**Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?**

slide 270

**Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt) et quelles articulations apparaissent ?**

slide 271

**Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?**

slide 273

---

**L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?**

slide 277

---

**Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?**

slide 278

---

**Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?**

slide 279

---

**Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?**

slide 282

---

**Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?**

slide 288

---

**Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?**

slide 290

---

**Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?**

slide 291

---

**Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?**

slide 294

---

**Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?**

slide 298

---

**L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?**

slide 299

---

**Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?**

slide 300

---

**Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?**

slide 302

---

**Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?**

slide 303

---

**Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?**

slide 306

---

**Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?**

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

---

**Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?**

PLAN SAGITTAL

slide 310

**Pourquoi le droit fémoral est-il le seul chef du quadriceps à être aussi fléchisseur de la cuisse ?**

PLAN SAGITTAL

slide 311

**Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?**

PLAN FRONTAL

slide 312

**Les 3 ischio-jambiers partagent origine et actions : quelle est la terminaison propre à chacun, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?**

slide 320

**Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?**

slide 320

**Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?**

slide 324

**Le triceps sural est composé de quels muscles, et pourquoi seul l'un d'eux est aussi fléchisseur de la jambe ?**

slide 327

**Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?**

- A. le droit fémoral
- B. le vaste latéral
- C. le vaste médial
- D. le vaste intermédiaire

PLAN SAGITTAL

slide 311

**Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?**

- A. la tête de la fibula
- B. la patte d'oie
- C. le plateau tibial
- D. le calcanéus

slide 320

**Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?**

- A. le semi-tendineux
- B. le semi-membraneux
- C. le biceps fémoral
- D. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula

slide 320

**La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?**

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux
- B. sartorius, gracile, semi-membraneux
- C. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

slide 320

**Pourquoi le gastrocnémien est-il fléchisseur de la jambe, alors que le soléaire ne l'est pas ?**

- A. il s'origine sur le fémur et franchit donc le genou
- B. il s'origine sur le tibia et la fibula
- C. il se termine plus haut que le soléaire
- D. il a 2 chefs alors que le soléaire n'en a qu'un

slide 328

**La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?**

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne
- B. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- C. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

slide 275

**Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?**

- A. ilium, ischium, pubis
- B. ilion, ischion, pubis
- C. ilium, ischion, pubis
- D. ilium, ischium, sacrum

slide 278

**Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?**

- A. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges
- B. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

slide 294

**Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?**

- A. l'articulation talo-crurale (la cheville)
- B. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- C. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- D. l'articulation sacro-iliaque

slide 295

**Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?**

- A. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral)
- B. la patte d'oie
- C. la tête de la fibula
- D. le grand trochanter du fémur

slide 303

**Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?**

- A. le long adducteur
- B. le court adducteur
- C. le grand adducteur
- D. le pectiné

PLAN FRONTAL

slide 314

**L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?**

- A. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. la fosse iliaque et la tête fémorale
- D. le foramen obturé et la tête fémorale

slide 277

## Table musculaire à compléter

Table musculaire

| Muscle                                        | Origine | Terminaison | Action |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| Ilio-psoas <span>slide 299</span>             |         |             |        |
| Petit glutéal <span>slide 300</span>          |         |             |        |
| Moyen glutéal <span>slide 301</span>          |         |             |        |
| Grand glutéal <span>slide 302</span>          |         |             |        |
| Tenseur du fascia lata <span>slide 303</span> |         |             |        |
| Sartorius <span>slide 309</span>              |         |             |        |
| Quadriceps fémoral <span>slide 311</span>     |         |             |        |
| Court adducteur <span>slide 313</span>        |         |             |        |

| Muscle                                  | Origine | Terminaison | Action |
|-----------------------------------------|---------|-------------|--------|
| Long adducteur <span>slide 314</span>   |         |             |        |
| Grand adducteur <span>slide 315</span>  |         |             |        |
| Gracile <span>slide 316</span>          |         |             |        |
| Biceps fémoral <span>slide 319</span>   |         |             |        |
| Semi-tendineux <span>slide 320</span>   |         |             |        |
| Semi-membraneux <span>slide 320</span>  |         |             |        |
| Tibial antérieur <span>slide 325</span> |         |             |        |
| Gastrocnémien <span>slide 328</span>    |         |             |        |
| Soléaire <span>slide 328</span>         |         |             |        |

## Pièges

### PIÈGE

#### Le quadriceps : seul le droit fémoral franchit la hanche

Les 4 chefs du quadriceps se terminent ensemble par le tendon commun de la patella puis le ligament patellaire, et sont TOUS extenseurs du genou. Mais un seul, le DROIT FÉMORAL, est aussi fléchisseur de la cuisse : son origine (épine iliaque antéro-inférieure) est sur l'os coxal, donc il franchit l'articulation coxo-fémorale (la hanche). Les 3 vastes (médial, latéral, intermédiaire) s'originent directement sur le fémur : ils ne franchissent que le genou, jamais la hanche, et ne peuvent donc agir que sur la jambe.

slide 311

**PIÈGE****Les ischio-jambiers ont 3 terminaisons différentes, pas une**

Biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux partagent la même origine (tubérosité ischiatique) et les mêmes actions (fléchisseurs de la jambe, extenseurs de la cuisse), mais PAS la même terminaison : le biceps fémoral se termine sur la tête de la FIBULA (côté latéral), le semi-tendineux à la PATTE D'OIE (médial, superficiel), le semi-membraneux sur le PLATEAU TIBIAL (médial, profond). Confondre leurs terminaisons est le piège le plus fréquent sur ce groupe.

slide 320

**PIÈGE****La patte d'oie réunit 3 muscles de 3 groupes différents**

Sartorius (groupe antérieur de la cuisse), gracile (groupe médial, les adducteurs) et semi-tendineux (groupe postérieur, les ischio-jambiers) se terminent TOUS les 3 à la patte d'oie, sur le bord médial du tibia. Trois muscles d'origine et de fonction différentes, un seul point d'arrivée : ne pas confondre avec le semi-membraneux (voisin du semi-tendineux) qui, lui, se termine plus profondément sur le plateau tibial et n'appartient PAS à la patte d'oie.

slide 320

**PIÈGE****Triceps sural : seul le gastrocnémien franchit le genou**

Gastrocnémien et soléaire se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen (d'Achille), et sont tous les deux fléchisseurs plantaires du pied. Mais seul le GASTROCNÉMIEN est aussi fléchisseur de la JAMBE : son origine (condyles médial et latéral du fémur) est sur le fémur, donc il franchit le genou. Le SOLÉAIRE s'origine sur le tibia et la fibula (épiphyses proximales) : il ne franchit que la cheville, jamais le genou.


slide 328

# Corrigé

## Planches


### Le squelette du membre inférieur et ses articulations

slide 271




### L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties

slide 277




### Le quadriceps fémoral : ses 4 chefs, une terminaison commune

slide 311



### Les ischio-jambiers : une origine commune, 3 terminaisons

slide 320



## Cartes

### Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?

La ceinture pelvienne, la cuisse, la jambe et le pied.

slide 270

## **Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt) et quelles articulations apparaissent ?**

Ceinture pelvienne : sacrum + os coxal ; articulations sacro-iliaque et coxo-fémorale (hanche). Cuisse : fémur ; articulations fémoro-patellaire et tibio-fémorale (genou). Jambe : tibia + fibula ; articulation talo-crurale (cheville). Pied : partie distale, en aval de la cheville.

slide 271

---

## **Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?**

Elle est constituée de 2 os coxaux + le sacrum + le coccyx (autres noms : bassin, pelvis). Ses 4 articulations : la symphyse pubienne, les 2 sacro-iliaques (une par côté), et la sacro-coccygienne.

slide 273

---

## **L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?**

Ilium (partie supérieure), ischium (partie postéro-inférieure), pubis (partie antéro-inférieure). Il s'articule médialement avec le sacrum (articulation sacro-iliaque) et latéralement avec le fémur, au niveau de la tête fémorale (articulation coxo-fémorale).

slide 277

---

## **Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?**

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle) correspondent à ilion, ischion et pubis dans l'ancienne nomenclature — seul le nom du pubis n'a pas changé.

slide 278

---

## **Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?**

La crête iliaque borde le sommet de l'ilium, la fosse iliaque en occupe la face interne. L'acétabulum et le foramen obturé sont à la jonction des 3 parties (l'acétabulum reçoit la tête fémorale).

slide 279

---

## **Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?**

Il s'articule en haut avec l'os coxal (acétabulum → coxo-fémorale), en bas avec le tibia (plateau tibial → tibio-fémorale) et avec la patella (→ fémoro-patellaire). Extrémité proximale : tête fémorale, grand trochanter, petit trochanter. Extrémité distale : épicondyle médial, condyle médial, condyle latéral, surface patellaire.

slide 282

---

## **Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?**

Le tibia est MÉDIAL (plateau tibial, tubérosité du tibia, malléole médiale) ; il s'articule avec le fémur (tibio-fémorale), le talus (talo-crurale médiale) et la fibula (tibio-fibulaire proximale et distale). La fibula est LATÉRALE (tête de la fibula, malléole latérale) ; elle s'articule avec le tibia (tibio-fibulaire proximale et distale) et le talus (talo-crurale latérale).

slide 288

---

## **Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?**

Os court, situé en avant de la base du fémur, sur le trajet du tendon du quadriceps. Elle s'articule avec le fémur pour former l'articulation fémoro-patellaire.

slide 290

---

### **Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?**

Ligament croisé antérieur (LCA) et ligament croisé postérieur (LCP) ; ménisque médial et ménisque latéral, sur le plateau tibial. Le ligament patellaire y arrive côté antérieur.

slide 291

---

### **Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?**

26 os en 3 groupes : le tarse (7 os, dont le talus et le calcaneus), le métatarse (5 métatarsiens), les phalanges (3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2). La cheville (articulation talo-crurale) unit le tibia et la fibula au talus : c'est l'articulation la plus sujette aux entorses.

slide 294

---

### **Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?**

Principaux : ilio-psoas, petit/moyen/grand glutéal, tenseur du fascia lata. Profonds, rotateurs latéraux de la cuisse : piriforme, obturateur interne et externe, jumeau supérieur et inférieur, carré fémoral.

slide 298

---

### **L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?**

Le grand psoas (muscle latéral du tronc) et l'iliaque (muscle de la hanche). Origine : face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque). Terminaison : petit trochanter du fémur. Il est fléchisseur de la cuisse.

slide 299

---

### **Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?**

Les 2 s'originent sur la face externe de l'ilium et se terminent sur le grand trochanter du fémur. Le petit glutéal est abducteur ET rotateur médial de la cuisse ; le moyen glutéal est abducteur de la cuisse et stabilisateur du bassin (pas rotateur).

slide 300

---

### **Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?**

Origine : face externe de l'ilium, crête iliaque, crête sacrale. Terminaison : face postérieure du fémur. Actions : extenseur et rotateur latéral de la cuisse, stabilisateur du bassin.

slide 302

---

### **Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?**

Il se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral. Actions : abducteur, rotateur médial et fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe.

slide 303

---

### **Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?**

Groupe antérieur : extenseur du genou. Groupe médial : adducteur de la cuisse. Groupe postérieur : fléchisseur du genou.

slide 306

---

### **Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?**

Origine : épine iliaque antéro-supérieure. Terminaison : patte d'oie. Actions : fléchisseur de la cuisse et de la jambe, rotateur latéral et abducteur de la cuisse.

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

---

### **Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?**

Droit fémoral, vaste latéral, vaste intermédiaire, vaste médial. Le tendon du droit fémoral passe par-dessus la patella pour rejoindre le ligament patellaire : c'est la terminaison commune des 4 chefs.

PLAN SAGITTAL

slide 310

### **Pourquoi le droit fémoral est-il le seul chef du quadriceps à être aussi fléchisseur de la cuisse ?**

Parce qu'il est le seul des 4 chefs à s'originer au-delà du fémur, sur l'épine iliaque antéro-inférieure (os coxal) : il franchit donc l'articulation coxo-fémorale (la hanche). Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur (bord médial, bord latéral, face antérieure) : ils ne franchissent que le genou, et ne sont donc extenseurs du genou que.

PLAN SAGITTAL

slide 311

### **Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?**

Pectiné, court adducteur, long adducteur, grand adducteur, gracile. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs de la cuisse ; le long adducteur est en plus fléchisseur et rotateur médial de la cuisse.

PLAN FRONTAL

slide 312

### **Les 3 ischio-jambiers partagent origine et actions : quelle est la terminaison propre à chacun, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?**

Tous les 3 s'originent (au moins en partie) sur la tubérosité ischiatique et sont fléchisseurs de la jambe, extenseurs de la cuisse. Terminaisons différentes : biceps fémoral → tête de la fibula ; semi-tendineux → patte d'oie ; semi-membraneux → plateau tibial. Nuance : seul le chef long du biceps fémoral (origine tubérosité ischiatique) est extenseur de la cuisse — son chef court s'origine sur la ligne âpre du fémur et ne franchit donc pas la hanche.

slide 320

### **Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?**

Le sartorius (groupe antérieur), le gracile (groupe médial, adducteurs) et le semi-tendineux (groupe postérieur, ischio-jambiers) : 3 muscles de 3 groupes différents, d'origines et de fonctions différentes, qui se terminent tous au même endroit, sur le bord médial du tibia.

slide 320

### **Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?**

Tibial antérieur, long extenseur de l'hallux, court/long/troisième fibulaire, long extenseur des orteils. Le tibial antérieur : origine bord latéral du tibia, terminaison bord médial du gros orteil, action fléchisseur dorsal du pied.

slide 324

### **Le triceps sural est composé de quels muscles, et pourquoi seul l'un d'eux est aussi fléchisseur de la jambe ?**

Du gastrocnémien et du soléaire (et du plantaire). Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du FÉMUR : il franchit le genou, donc il est fléchisseur de la jambe ET fléchisseur plantaire du pied. Le soléaire s'origine sur le tibia et la fibula : il ne franchit que la cheville, donc seulement fléchisseur plantaire du pied. Les deux se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen.

slide 327

## Quiz

**Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?**

- A. le droit fémoral — bonne réponse**
- B. le vaste latéral
- C. le vaste médial
- D. le vaste intermédiaire

Seul le droit fémoral s'origine sur l'os coxal (épine iliaque antéro-inférieure) : il franchit la hanche, donc il la fléchit aussi. Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur et n'agissent que sur le genou.

PLAN SAGITTAL

slide 311

---

**Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?**

- A. la tête de la fibula — bonne réponse**
- B. la patte d'oie
- C. le plateau tibial
- D. le calcaneus

Le biceps fémoral se termine sur la tête de la fibula (côté latéral) ; le semi-tendineux à la patte d'oie, le semi-membraneux sur le plateau tibial (tous deux médiaux).

slide 320

---

**Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?**

- A. le semi-tendineux — bonne réponse**
- B. le semi-membraneux
- C. le biceps fémoral
- D. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula

Semi-tendineux → patte d'oie. Semi-membraneux → plateau tibial. Biceps fémoral → tête de la fibula. Trois terminaisons différentes pour une même origine et les mêmes actions.

slide 320

---

**La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?**

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux — bonne réponse**
- B. sartorius, gracile, semi-membraneux
- C. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

Sartorius (groupe antérieur), gracile (groupe médial) et semi-tendineux (groupe postérieur) convergent tous à la patte d'oie — trois groupes différents, un seul point d'arrivée. Le semi-membraneux (souvent confondu) se termine plus profondément sur le plateau tibial.

slide 320

---

**Pourquoi le gastrocnémien est-il fléchisseur de la jambe, alors que le soléaire ne l'est pas ?**

- A. il s'origine sur le fémur et franchit donc le genou — bonne réponse**
- B. il s'origine sur le tibia et la fibula
- C. il se termine plus haut que le soléaire
- D. il a 2 chefs alors que le soléaire n'en a qu'un

Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du fémur : il franchit le genou, donc il le fléchit. Le soléaire s'origine sur le tibia et la fibula, sous le genou : il ne peut agir que sur la cheville.

slide 328

### La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne — bonne réponse**
- B. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- C. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

La symphyse pubienne (1), les 2 articulations sacro-iliaques (2), et la sacro-coccygienne (1) = 4. La coxo-fémorale (hanche) n'appartient PAS à la ceinture pelvienne : c'est l'articulation qui unit le membre inférieur libre à cette ceinture.

slide 275

---

### Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?

- A. ilium, ischium, pubis — bonne réponse**
- B. ilion, ischion, pubis
- C. ilium, ischion, pubis
- D. ilium, ischium, sacrum

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle). Ilion et ischion sont les anciens noms d'ilium et ischium — seul pubis n'a pas changé. Le sacrum n'est pas une partie de l'os coxal.

slide 278

---

### Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges — bonne réponse**
- B. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

7 (tarse) + 5 (métatarse) + 14 (phalanges : 3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2, soit  $3 \times 4 + 2 = 14$ ) = 26.

slide 294

---

### Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?

- A. l'articulation talo-crurale (la cheville) — bonne réponse**
- B. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- C. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- D. l'articulation sacro-iliaque

L'articulation de la cheville (talo-crurale), qui unit le tibia et la fibula au talus, est la plus sujette aux entorses du membre inférieur.

slide 295

---

### Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?

- A. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral) — bonne réponse**
- B. la patte d'oie
- C. la tête de la fibula
- D. le grand trochanter du fémur

Le tenseur du fascia lata se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral — à ne pas confondre avec la patte d'oie (sartorius, gracile, semi-tendineux), un point de terminaison différent et médial.

slide 303

**Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?**

- A. le long adducteur** — *bonne réponse*
- B. le court adducteur
- C. le grand adducteur
- D. le pectiné

Le long adducteur est adducteur, fléchisseur ET rotateur médial de la cuisse. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs. Le pectiné est cité dans ce groupe mais le cours ne détaille pas ses actions.

PLAN FRONTAL

slide 314

**L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?**

- A. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale** — *bonne réponse*
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. la fosse iliaque et la tête fémorale
- D. le foramen obturé et la tête fémorale

L'os coxal s'articule latéralement avec le fémur au niveau de l'acétabulum, qui reçoit la tête fémorale.

slide 277

### Table musculaire

| Muscle                                        | Origine                                                 | Terminaison                                                        | Action                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilio-psoas <span>slide 299</span>             | face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque)           | petit trochanter du fémur                                          | fléchisseur de la cuisse                                                                                    |
| Petit glutéal <span>slide 300</span>          | face externe de l'ilium                                 | grand trochanter du fémur                                          | abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse                                                       |
| Moyen glutéal <span>slide 301</span>          | face externe de l'ilium                                 | grand trochanter du fémur                                          | abducteur de la cuisse ; stabilisateur du bassin                                                            |
| Grand glutéal <span>slide 302</span>          | face externe de l'ilium ; crête iliaque ; crête sacrale | face postérieure du fémur                                          | extenseur de la cuisse ; rotateur latéral de la cuisse ; stabilisateur du bassin                            |
| Tenseur du fascia lata <span>slide 303</span> | épine iliaque antéro-supérieure                         | tractus ilio-tibial (qui se termine sur le plateau tibial latéral) | abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe    |
| Sartorius <span>slide 309</span>              | épine iliaque antéro-supérieure                         | patte d'oie                                                        | fléchisseur de la cuisse ; fléchisseur de la jambe ; rotateur latéral de la cuisse ; abducteur de la cuisse |

| Muscle                                             | Origine                                                                                                                                                                        | Terminaison                                                                | Action                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quadriceps fémoral</b> <small>slide 311</small> | droit fémoral : épine iliaque antéro-inférieure ; vaste médial : bord médial du fémur ; vaste latéral : bord latéral du fémur ; vaste intermédiaire : face antérieure du fémur | tendon commun de la patella, puis tubérosité tibiale (ligament patellaire) | extenseur du genou (les 4 chefs) ; droit fémoral : fléchisseur de la cuisse      |
| <b>Court adducteur</b> <small>slide 313</small>    | pubis                                                                                                                                                                          | ligne âpre du fémur                                                        | adducteur de la cuisse                                                           |
| <b>Long adducteur</b> <small>slide 314</small>     | pubis                                                                                                                                                                          | ligne âpre du fémur                                                        | adducteur de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse |
| <b>Grand adducteur</b> <small>slide 315</small>    | pubis ; tubérosité ischiatique                                                                                                                                                 | ligne âpre du fémur ; épicondyle médial du fémur                           | adducteur de la cuisse                                                           |
| <b>Gracile</b> <small>slide 316</small>            | pubis                                                                                                                                                                          | patte d'oie                                                                | fléchisseur de la jambe ; rotateur médial de la jambe ; adducteur de la cuisse   |
| <b>Biceps fémoral</b> <small>slide 319</small>     | chef long : tubérosité ischiatique ; chef court : ligne âpre du fémur                                                                                                          | tête de la fibula                                                          | fléchisseur de la jambe ; chef long : extenseur de la cuisse                     |
| <b>Semi-tendineux</b> <small>slide 320</small>     | tubérosité ischiatique                                                                                                                                                         | patte d'oie                                                                | fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse                                 |
| <b>Semi-membraneux</b> <small>slide 320</small>    | tubérosité ischiatique                                                                                                                                                         | plateau tibial                                                             | fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse                                 |
| <b>Tibial antérieur</b> <small>slide 325</small>   | bord latéral du tibia                                                                                                                                                          | bord médial du gros orteil                                                 | fléchisseur dorsal du pied                                                       |
| <b>Gastrocnémien</b> <small>slide 328</small>      | condyles médial et latéral du fémur                                                                                                                                            | calcanéus (par le tendon calcanéen)                                        | fléchisseur de la jambe ; fléchisseur plantaire du pied                          |
| <b>Soléaire</b> <small>slide 328</small>           | épiphyses proximales du tibia et de la fibula                                                                                                                                  | calcanéus (par le tendon calcanéen)                                        | fléchisseur plantaire du pied                                                    |