

Planches (mode muet)

**Le squelette
du membre
inférieur :
bassin,
hanche et
genou**


slide 271



1. (où le sacrum rejoint l'ilium, en haut de la ceinture pelvienne)
2. (hanche ; acétabulum + tête fémorale)
3. (la patella, en avant du genou)
4. (genou ; entre les 2 os longs)

**Le squelette du membre inférieur :
jambe et cheville**


slide 271



1. (juste sous le genou, côté fibula)
2. (cheville ; tibia + fibula + talus)

L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties


slide 277



1. (partie supérieure, la plus large)
2. (anneau central ; reçoit la tête fémorale (coxo-fémorale))
3. (partie postéro-inférieure)
4. (partie antéro-inférieure)

Le quadriceps fémoral : ses 4 chefs, une terminaison commune


slide 311



1. (seul chef dont l'origine est détachée du fémur, plus haut (os coxal))
2. (origine sur le bord latéral du fémur, côté gauche du schéma)
3. (seul chef dont l'origine arrive du côté droit du schéma)
4. (trait pointillé, tout contre le fémur : profond, caché sous le droit fémoral)
5. (terminaison commune des 4 chefs, sous la patella)

Les ischio-jambiers : une origine commune, 3 terminaisons

slide 320



1. (origine commune des 3 muscles, en haut)
2. (le trajet le plus latéral (vers la droite))
3. (trajet médial, le plus long (le plus bas))
4. (trajet médial, le plus court (s'arrête au niveau du genou))
5. (terminaison latérale, du biceps fémoral)
6. (terminaison médiale superficielle, du semi-tendineux)
7. (terminaison médiale profonde, du semi-membraneux, au niveau du genou)

Questions

Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?

slide 270

Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt) et quelles articulations apparaissent ?

slide 271

Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?

slide 273

L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?

slide 277

Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?

slide 278

Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?

slide 279

Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?

slide 282

Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?

slide 288

Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?

slide 290

Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?

slide 291

Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?

slide 294

Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?

slide 298

L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?

slide 299

Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?

slide 300

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?

slide 302

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?

slide 303

Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?

slide 306

Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?

PLAN SAGITTAL

slide 310

Pourquoi le droit fémoral est-il le seul chef du quadriceps à être aussi fléchisseur de la cuisse ?

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?

PLAN FRONTAL

slide 312

Les 3 ischio-jambiers partagent origine et actions : quelle est la terminaison propre à chacun, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?

slide 320

Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?

slide 320

Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?

slide 324

Le triceps sural est composé de quels muscles, et pourquoi seul l'un d'eux est aussi fléchisseur de la jambe ?

slide 327

Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?

- A. le vaste médial
- B. le droit fémoral
- C. le vaste intermédiaire
- D. le vaste latéral

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?

- A. le calcanéus
- B. la tête de la fibula
- C. le plateau tibial
- D. la patte d'oie

slide 320

Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?

- A. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula
- B. le biceps fémoral
- C. le semi-tendineux
- D. le semi-membraneux

slide 320

La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux
- B. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- C. sartorius, gracile, semi-membraneux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

slide 320

Pourquoi le gastrocnémien est-il fléchisseur de la jambe, alors que le soléaire ne l'est pas ?

- A. il s'origine sur le fémur et franchit donc le genou
- B. il se termine plus haut que le soléaire
- C. il a 2 chefs alors que le soléaire n'en a qu'un
- D. il s'origine sur le tibia et la fibula

slide 328

La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne
- B. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- C. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

slide 275

Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?

- A. ilium, ischium, sacrum
- B. ilium, ischium, pubis
- C. ilion, ischion, pubis
- D. ilium, ischion, pubis

slide 278

Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- B. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

slide 294

Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?

- A. l'articulation sacro-iliaque
- B. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- C. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- D. l'articulation talo-crurale (la cheville)

slide 295

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?

- A. la tête de la fibula
- B. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral)
- C. le grand trochanter du fémur
- D. la patte d'oie

slide 303

Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?

- A. le long adducteur
- B. le pectiné
- C. le grand adducteur
- D. le court adducteur

PLAN FRONTAL

slide 314

L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?

- A. le foramen obturé et la tête fémorale
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale
- D. la fosse iliaque et la tête fémorale

slide 277

Table musculaire à compléter

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Ilio-psoas slide 299			
Petit glutéal slide 300			

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Moyen glutéal slide 301			
Grand glutéal slide 302			
Tenseur du fascia lata slide 303			
Sartorius slide 309			
Quadriceps fémoral slide 311			
Court adducteur slide 313			
Long adducteur slide 314			
Grand adducteur slide 315			
Gracile slide 316			
Biceps fémoral slide 319			
Semi-tendineux slide 320			
Semi-membraneux slide 320			
Tibial antérieur slide 325			
Gastrocnémien slide 328			
Soléaire slide 328			

Pièges

PIÈGE

Le quadriceps : seul le droit fémoral franchit la hanche

Les 4 chefs du quadriceps se terminent ensemble par le tendon commun de la patella puis le ligament patellaire, et sont TOUS extenseurs du genou. Mais un seul, le DROIT FÉMORAL, est aussi fléchisseur de la cuisse : son origine (épine iliaque antéro-inférieure) est sur l'os coxal, donc il franchit l'articulation coxo-fémorale (la hanche). Les 3 vastes (médial, latéral, intermédiaire) s'originent directement sur le fémur : ils ne franchissent que le genou, jamais la hanche, et ne peuvent donc agir que sur la jambe.

slide 311

PIÈGE

Les ischio-jambiers ont 3 terminaisons différentes, pas une

Biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux partagent la même origine (tubérosité ischiatique) et les mêmes actions (fléchisseurs de la jambe, extenseurs de la cuisse), mais PAS la même terminaison : le biceps fémoral se termine sur la tête de la FIBULA (côté latéral), le semi-tendineux à la PATTE D'OIE (médial, superficiel), le semi-membraneux sur le PLATEAU TIBIAL (médial, profond). Confondre leurs terminaisons est le piège le plus fréquent sur ce groupe.

slide 320

PIÈGE

La patte d'oie réunit 3 muscles de 3 groupes différents

Sartorius (groupe antérieur de la cuisse), gracile (groupe médial, les adducteurs) et semi-tendineux (groupe postérieur, les ischio-jambiers) se terminent TOUS les 3 à la patte d'oie, sur le bord médial du tibia. Trois muscles d'origine et de fonction différentes, un seul point d'arrivée : ne pas confondre avec le semi-membraneux (voisin du semi-tendineux) qui, lui, se termine plus profondément sur le plateau tibial et n'appartient PAS à la patte d'oie.

slide 320

PIÈGE

Triceps sural : seul le gastrocnémien franchit le genou

Gastrocnémien et soléaire se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen (d'Achille), et sont tous les deux fléchisseurs plantaires du pied. Mais seul le GASTROCNÉMIEN est aussi fléchisseur de la JAMBE : son origine (condyles médial et latéral du fémur) est sur le fémur, donc il franchit le genou. Le SOLÉAIRE s'origine sur le tibia et la fibula (épiphyses proximales) : il ne franchit que la cheville, jamais le genou.


slide 328

Corrigé

Planches


Le squelette du membre inférieur : bassin, hanche et genou

slide 271




Le squelette du membre inférieur : jambe et cheville


slide 271




L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties slide 277



Le quadriceps fémoral : ses 4 chefs, une terminaison commune slide 311



Les ischio-jambiers : une origine commune, 3 terminaisons slide 320



Cartes

Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?

La ceinture pelvienne, la cuisse, la jambe et le pied.

slide 270

Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt) et quelles articulations apparaissent ?

Ceinture pelvienne : sacrum + os coxal ; articulations sacro-iliaque et coxo-fémorale (hanche). Cuisse : fémur ; articulations fémoro-patellaire et tibio-fémorale (genou). Jambe : tibia + fibula ; articulation talo-crurale (cheville). Pied : partie distale, en aval de la cheville.

slide 271

Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?

Elle est constituée de 2 os coxaux + le sacrum + le coccyx (autres noms : bassin, pelvis). Ses 4 articulations : la symphyse pubienne, les 2 sacro-iliaques (une par côté), et la sacro-coccygienne.

slide 273

L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?

Ilium (partie supérieure), ischium (partie postéro-inférieure), pubis (partie antéro-inférieure). Il s'articule médialement avec le sacrum (articulation sacro-iliaque) et latéralement avec le fémur, au niveau de la tête fémorale (articulation coxo-fémorale).

slide 277

Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle) correspondent à ilion, ischion et pubis dans l'ancienne nomenclature — seul le nom du pubis n'a pas changé.

slide 278

Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?

La crête iliaque borde le sommet de l'ilium, la fosse iliaque en occupe la face interne. L'acétabulum et le foramen obturé sont à la jonction des 3 parties (l'acétabulum reçoit la tête fémorale).

slide 279

Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?

Il s'articule en haut avec l'os coxal (acétabulum → coxo-fémorale), en bas avec le tibia (plateau tibial → tibio-fémorale) et avec la patella (→ fémoro-patellaire). Extrémité proximale : tête fémorale, grand trochanter, petit trochanter. Extrémité distale : épicondyle médial, condyle médial, condyle latéral, surface patellaire.

slide 282

Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?

Le tibia est MÉDIAL (plateau tibial, tubérosité du tibia, malléole médiale) ; il s'articule avec le fémur (tibio-fémorale), le talus (talo-crurale médiale) et la fibula (tibio-fibulaire proximale et distale). La fibula est LATÉRALE (tête de la fibula, malléole latérale) ; elle s'articule avec le tibia (tibio-fibulaire proximale et distale) et le talus (talo-crurale latérale).

slide 288

Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?

Os court, situé en avant de la base du fémur, sur le trajet du tendon du quadriceps. Elle s'articule avec le fémur pour former l'articulation fémoro-patellaire.

slide 290

Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?

Ligament croisé antérieur (LCA) et ligament croisé postérieur (LCP) ; ménisque médial et ménisque latéral, sur le plateau tibial. Le ligament patellaire y arrive côté antérieur.

slide 291

Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?

26 os en 3 groupes : le tarse (7 os, dont le talus et le calcanéus), le métatarse (5 métatarsiens), les phalanges (3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2). La cheville (articulation talo-crurale) unit le tibia et la fibula au talus : c'est l'articulation la plus sujette aux entorses.

slide 294

Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?

Principaux : ilio-psoas, petit/moyen/grand glutéal, tenseur du fascia lata. Profonds, rotateurs latéraux de la cuisse : piriforme, obturateur interne et externe, jumeau supérieur et inférieur, carré fémoral.

slide 298

L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?

Le grand psoas (muscle latéral du tronc) et l'iliaque (muscle de la hanche). Origine : face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque). Terminaison : petit trochanter du fémur. Il est fléchisseur de la cuisse.

slide 299

Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?

Les 2 s'originent sur la face externe de l'ilium et se terminent sur le grand trochanter du fémur. Le petit glutéal est abducteur ET rotateur médial de la cuisse ; le moyen glutéal est abducteur de la cuisse et stabilisateur du bassin (pas rotateur).

slide 300

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?

Origine : face externe de l'ilium, crête iliaque, crête sacrale. Terminaison : face postérieure du fémur. Actions : extenseur et rotateur latéral de la cuisse, stabilisateur du bassin.

slide 302

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?

Il se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral. Actions : abducteur, rotateur médial et fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe.

slide 303

Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?

Groupe antérieur : extenseur du genou. Groupe médial : adducteur de la cuisse. Groupe postérieur : fléchisseur du genou.

slide 306

Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?

Origine : épine iliaque antéro-supérieure. Terminaison : patte d'oie. Actions : fléchisseur de la cuisse et de la jambe, rotateur latéral et abducteur de la cuisse.

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?

Droit fémoral, vaste latéral, vaste intermédiaire, vaste médial. Le tendon du droit fémoral passe par-dessus la patella pour rejoindre le ligament patellaire : c'est la terminaison commune des 4 chefs.

PLAN SAGITTAL

slide 310

Pourquoi le droit fémoral est-il le seul chef du quadriceps à être aussi fléchisseur de la cuisse ?

Parce qu'il est le seul des 4 chefs à s'originer au-delà du fémur, sur l'épine iliaque antéro-inférieure (os coxal) : il franchit donc l'articulation coxo-fémorale (la hanche). Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur (bord médial, bord latéral, face antérieure) : ils ne franchissent que le genou, et ne sont donc extenseurs du genou que.

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?

Pectiné, court adducteur, long adducteur, grand adducteur, gracile. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs de la cuisse ; le long adducteur est en plus fléchisseur et rotateur médial de la cuisse.

PLAN FRONTAL

slide 312

Les 3 ischio-jambiers partagent origine et actions : quelle est la terminaison propre à chacun, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?

Tous les 3 s'originent (au moins en partie) sur la tubérosité ischiatique et sont fléchisseurs de la jambe, extenseurs de la cuisse. Terminaisons différentes : biceps fémoral → tête de la fibula ; semi-tendineux → patte d'oie ; semi-membraneux → plateau tibial. Nuance : seul le chef long du biceps fémoral (origine tubérosité ischiatique) est extenseur de la cuisse — son chef court s'origine sur la ligne âpre du fémur et ne franchit donc pas la hanche.

slide 320

Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?

Le sartorius (groupe antérieur), le gracile (groupe médial, adducteurs) et le semi-tendineux (groupe postérieur, ischio-jambiers) : 3 muscles de 3 groupes différents, d'origines et de fonctions différentes, qui se terminent tous au même endroit, sur le bord médial du tibia.

slide 320

Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?

Tibial antérieur, long extenseur de l'hallux, court/long/troisième fibulaire, long extenseur des orteils. Le tibial antérieur : origine bord latéral du tibia, terminaison bord médial du gros orteil, action fléchisseur dorsal du pied.

slide 324

Le triceps sural est composé de quels muscles, et pourquoi seul l'un d'eux est aussi fléchisseur de la jambe ?

Du gastrocnémien et du soléaire (et du plantaire). Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du FÉMUR : il franchit le genou, donc il est fléchisseur de la jambe ET fléchisseur plantaire du pied. Le soléaire s'origine sur le tibia et la fibula : il ne franchit que la cheville, donc seulement fléchisseur plantaire du pied. Les deux se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen.

slide 327

Quiz

Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?

- A. le vaste médial
- B. le droit fémoral — bonne réponse**
- C. le vaste intermédiaire
- D. le vaste latéral

Seul le droit fémoral s'origine sur l'os coxal (épine iliaque antéro-inférieure) : il franchit la hanche, donc il la fléchit aussi. Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur et n'agissent que sur le genou.

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?

- A. le calcanéus
- B. la tête de la fibula — bonne réponse**
- C. le plateau tibial
- D. la patte d'oie

Le biceps fémoral se termine sur la tête de la fibula (côté latéral) ; le semi-tendineux à la patte d'oie, le semi-membraneux sur le plateau tibial (tous deux médiaux).

slide 320

Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?

- A. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula
- B. le biceps fémoral
- C. le semi-tendineux — bonne réponse**
- D. le semi-membraneux

Semi-tendineux → patte d'oie. Semi-membraneux → plateau tibial. Biceps fémoral → tête de la fibula. Trois terminaisons différentes pour une même origine et les mêmes actions.

slide 320

La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux — bonne réponse**
- B. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- C. sartorius, gracile, semi-membraneux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

Sartorius (groupe antérieur), gracile (groupe médial) et semi-tendineux (groupe postérieur) convergent tous à la patte d'oie — trois groupes différents, un seul point d'arrivée. Le semi-membraneux (souvent confondu) se termine plus profondément sur le plateau tibial.

slide 320

Pourquoi le gastrocnémien est-il fléchisseur de la jambe, alors que le soléaire ne l'est pas ?

- A. il s'origine sur le fémur et franchit donc le genou — bonne réponse**
- B. il se termine plus haut que le soléaire
- C. il a 2 chefs alors que le soléaire n'en a qu'un
- D. il s'origine sur le tibia et la fibula

Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du fémur : il franchit le genou, donc il le fléchit. Le soléaire s'origine sur le tibia et la fibula, sous le genou : il ne peut agir que sur la cheville.

slide 328

La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne — bonne réponse**
- B. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- C. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

La symphyse pubienne (1), les 2 articulations sacro-iliaques (2), et la sacro-coccygienne (1) = 4. La coxo-fémorale (hanche) n'appartient PAS à la ceinture pelvienne : c'est l'articulation qui unit le membre inférieur libre à cette ceinture.

slide 275

Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?

- A. ilium, ischium, sacrum
- B. ilium, ischium, pubis — bonne réponse**
- C. ilion, ischion, pubis
- D. ilium, ischion, pubis

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle). Ilion et ischion sont les anciens noms d'ilium et ischium — seul pubis n'a pas changé. Le sacrum n'est pas une partie de l'os coxal.

slide 278

Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- B. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges — bonne réponse**
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

7 (tarse) + 5 (métatarse) + 14 (phalanges : 3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2, soit $3 \times 4 + 2 = 14$) = 26.

slide 294

Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?

- A. l'articulation sacro-iliaque
- B. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- C. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- D. l'articulation talo-crurale (la cheville) — bonne réponse**

L'articulation de la cheville (talo-crurale), qui unit le tibia et la fibula au talus, est la plus sujette aux entorses du membre inférieur.

slide 295

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?

- A. la tête de la fibula
- B. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral) — bonne réponse**
- C. le grand trochanter du fémur
- D. la patte d'oie

Le tenseur du fascia lata se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral — à ne pas confondre avec la patte d'oie (sartorius, gracile, semi-tendineux), un point de terminaison différent et médial.

slide 303

Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?

- A. le long adducteur** — *bonne réponse*
- B. le pectiné
- C. le grand adducteur
- D. le court adducteur

Le long adducteur est adducteur, fléchisseur ET rotateur médial de la cuisse. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs. Le pectiné est cité dans ce groupe mais le cours ne détaille pas ses actions.

PLAN FRONTAL

slide 314

L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?

- A. le foramen obturé et la tête fémorale
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale** — *bonne réponse*
- D. la fosse iliaque et la tête fémorale

L'os coxal s'articule latéralement avec le fémur au niveau de l'acétabulum, qui reçoit la tête fémorale.

slide 277

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Ilio-psoas slide 299	face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque)	petit trochanter du fémur	fléchisseur de la cuisse
Petit glutéal slide 300	face externe de l'ilium	grand trochanter du fémur	abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse
Moyen glutéal slide 301	face externe de l'ilium	grand trochanter du fémur	abducteur de la cuisse ; stabilisateur du bassin
Grand glutéal slide 302	face externe de l'ilium ; crête iliaque ; crête sacrale	face postérieure du fémur	extenseur de la cuisse ; rotateur latéral de la cuisse ; stabilisateur du bassin
Tenseur du fascia lata slide 303	épine iliaque antéro-supérieure	tractus ilio-tibial (qui se termine sur le plateau tibial latéral)	abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe
Sartorius slide 309	épine iliaque antéro-supérieure	patte d'oie	fléchisseur de la cuisse ; fléchisseur de la jambe ; rotateur latéral de la cuisse ; abducteur de la cuisse

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Quadriceps fémoral slide 311	droit fémoral : épine iliaque antéro-inférieure ; vaste médial : bord médial du fémur ; vaste latéral : bord latéral du fémur ; vaste intermédiaire : face antérieure du fémur	tendon commun de la patella, puis tubérosité tibiale (ligament patellaire)	extenseur du genou (les 4 chefs) ; droit fémoral : fléchisseur de la cuisse
Court adducteur slide 313	pubis	ligne âpre du fémur	adducteur de la cuisse
Long adducteur slide 314	pubis	ligne âpre du fémur	adducteur de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse
Grand adducteur slide 315	pubis ; tubérosité ischiatique	ligne âpre du fémur ; épicondyle médial du fémur	adducteur de la cuisse
Gracile slide 316	pubis	patte d'oie	fléchisseur de la jambe ; rotateur médial de la jambe ; adducteur de la cuisse
Biceps fémoral slide 319	chef long : tubérosité ischiatique ; chef court : ligne âpre du fémur	tête de la fibula	fléchisseur de la jambe ; chef long : extenseur de la cuisse
Semi-tendineux slide 320	tubérosité ischiatique	patte d'oie	fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse
Semi-membraneux slide 320	tubérosité ischiatique	plateau tibial	fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse
Tibial antérieur slide 325	bord latéral du tibia	bord médial du gros orteil	fléchisseur dorsal du pied
Gastrocnémien slide 328	condyles médial et latéral du fémur	calcanéus (par le tendon calcanéen)	fléchisseur de la jambe ; fléchisseur plantaire du pied
Soléaire slide 328	épiphyses proximales du tibia et de la fibula	calcanéus (par le tendon calcanéen)	fléchisseur plantaire du pied