

Planches (mode muet)

**Le squelette
du membre
inférieur :
bassin,
hanche et
genou**

slide 271



1. (où le sacrum rejoint l'ilium, en haut de la ceinture pelvienne)


2. (hanche ; acétabulum + tête fémorale)

3. (la patella, en avant du genou)

4. (genou ; entre les 2 os longs)

**Le squelette du membre inférieur :
jambe et cheville**

slide 289




1. (juste sous le genou, côté fibula)

2. (cheville ; tibia + fibula + talus)

L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties


slides 277 et 279



1. (partie supérieure, la plus large)
2. (anneau central ; reçoit la tête fémorale (coxo-fémorale))
3. (partie postéro-inférieure)
4. (partie antéro-inférieure)

Le quadriceps fémoral : ses 4 chefs, une terminaison commune


slide 311



1. (seul chef dont l'origine est détachée du fémur, plus haut (os coxal))
2. (origine sur le bord latéral du fémur, côté gauche du schéma)
3. (seul chef dont l'origine arrive du côté droit du schéma)
4. (trait pointillé, tout contre le fémur ; origine : face antérieure du fémur)
5. (terminaison commune des 4 chefs, sous la patella)

Les ischio-jambiers : 3 terminaisons différentes

slides 319 et 320



1. (origine du semi-tendineux, du semi-membraneux et du chef long du biceps, en haut)
2. (le trajet le plus latéral (vers la droite) ; tracé du chef long)
3. (trajet médial, le plus long (le plus bas))
4. (trajet médial, le plus court (s'arrête au niveau du genou))
5. (terminaison latérale, du biceps fémoral)
6. (terminaison médiale, du semi-tendineux)
7. (terminaison médiale, du semi-membraneux, au niveau du genou)

Questions

Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?

slide 270

.....

Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt), et quelles articulations le schéma légende-t-il ?

slides 271, 275 et 294

.....

Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?

slides 273 et 275

.....

L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?

slide 277

.....

Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?

slide 278

.....

Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?

slides 278 et 279

.....

Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?

slides 282 et 284

.....

Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?

slides 288 et 289

.....

Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?

slide 290

Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?

slide 291

Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?

slides 294 et 295

Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?

slide 298

L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?

slide 299

Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?

slides 300 et 301

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?

slide 302

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?

slide 303

Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?

slide 306

Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?

PLAN SAGITTAL

slides 310 et 311

Quel chef du quadriceps est aussi fléchisseur de la cuisse, et en quoi son origine diffère-t-elle de celle des 3 vastes ?

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?

PLAN FRONTAL

slides 312, 313, 314 et 315

Quelle est la terminaison propre à chacun des 3 ischio-jambiers, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?

slides 319 et 320

Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?

slides 309, 316 et 320

Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?

slides 324 et 325

Le triceps sural est composé de quels muscles, et lequel d'entre eux est aussi fléchisseur de la jambe ?

slides 327 et 328

Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?

- A. le vaste médial
- B. le droit fémoral
- C. le vaste intermédiaire
- D. le vaste latéral

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?

- A. le calcanéus
- B. la tête de la fibula
- C. le plateau tibial
- D. la patte d'oie

slides 319 et 320

Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?

- A. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula
- B. le biceps fémoral
- C. le semi-tendineux
- D. le semi-membraneux

slides 319 et 320

La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux
- B. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- C. sartorius, gracile, semi-membraneux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

slides 309, 316 et 320

Le cours donne au gastrocnémien la flexion de la jambe, et au soléaire seulement la flexion plantaire du pied. Qu'est-ce qui les distingue par l'origine ?

- A. le gastrocnémien s'origine sur le fémur, le soléaire sur le tibia et la fibula
- B. les deux s'originent sur le fémur
- C. les deux s'originent sur le tibia et la fibula
- D. le gastrocnémien s'origine sur le tibia et la fibula, le soléaire sur le fémur

slide 328

La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne
- B. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- C. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

slide 275

Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?

- A. ilium, ischium, sacrum
- B. ilium, ischium, pubis
- C. ilion, ischion, pubis
- D. ilium, ischion, pubis

slide 278

Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- B. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

slide 294

Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?

- A. l'articulation sacro-iliaque
- B. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- C. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- D. l'articulation talo-crurale (la cheville)

slide 295

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?

- A. la tête de la fibula
- B. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral)
- C. le grand trochanter du fémur
- D. la patte d'oie

slide 303

Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?

- A. le long adducteur
- B. le pectiné
- C. le grand adducteur
- D. le court adducteur

PLAN FRONTAL

slide 314

L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?

- A. le foramen obturé et la tête fémorale
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale
- D. la fosse iliaque et la tête fémorale

slides 277 et 282

Table musculaire à compléter

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Ilio-psoas slide 299			
Petit glutéal slide 300			
Moyen glutéal slide 301			
Grand glutéal slide 302			
Tenseur du fascia lata slide 303			
Sartorius slide 309			

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Quadriceps fémoral slide 311			
Court adducteur slide 313			
Long adducteur slide 314			
Grand adducteur slide 315			
Gracile slide 316			
Biceps fémoral slide 319			
Semi-tendineux slide 320			
Semi-membraneux slide 320			
Tibial antérieur slide 325			
Gastrocnémien slide 328			
Soléaire slide 328			

Pièges

PIÈGE

Le quadriceps : seul le droit fémoral est aussi fléchisseur de la cuisse

Les 4 chefs du quadriceps se terminent ensemble par le tendon commun de la patella puis le ligament patellaire, et sont TOUS extenseurs du genou. Mais un seul, le DROIT FÉMORAL, est en plus fléchisseur de la cuisse : son origine (épine iliaque antéro-inférieure) est sur l'os coxal. Les 3 vastes (médial, latéral, intermédiaire) s'originent directement sur le fémur, et le cours ne leur donne que l'extension du genou.

slide 311

PIÈGE**Les ischio-jambiers ont 3 terminaisons différentes, pas une**

Biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux ont chacun SA terminaison : le biceps fémoral se termine sur la tête de la FIBULA (côté latéral), le semi-tendineux à la PATTE D'OIE (médial), le semi-membraneux sur le PLATEAU TIBIAL (médial). Ne pas les confondre. Leurs origines ne sont pas identiques non plus : le semi-tendineux et le semi-membraneux naissent de la tubérosité ischiatique (slide 320) ; le biceps a deux chefs, dont un seul y naît, le chef long, alors que son chef court naît de la ligne âpre du fémur (slide 319). Les 3 sont fléchisseurs de la jambe ; le semi-tendineux et le semi-membraneux sont extenseurs de la cuisse, et le cours réserve cette action au chef long du biceps.

slides 319 et 320

PIÈGE**La patte d'oie réunit 3 muscles de 3 groupes différents**

Sartorius (groupe antérieur de la cuisse), gracile (groupe médial, les adducteurs) et semi-tendineux (groupe postérieur, les ischio-jambiers) se terminent TOUS les 3 à la patte d'oie, sur le bord médial du tibia. Trois muscles d'origine et de fonction différentes, un seul point d'arrivée : ne pas confondre avec le semi-membraneux, qui se termine sur le plateau tibial et n'appartient PAS à la patte d'oie. Le cours ne réunit jamais ces muscles sur une même slide : sartorius à la slide 309, gracile à la 316, semi-tendineux à la 320.

slides 309, 316 et 320

PIÈGE**Triceps sural : seul le gastrocnémien est aussi fléchisseur de la jambe**


Gastrocnémien et soléaire se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen (d'Achille), et sont tous les deux fléchisseurs plantaires du pied. Mais seul le GASTROCNÉMIEN est aussi fléchisseur de la JAMBE : son origine (condyles médial et latéral du fémur) est sur le fémur. Le SOLÉAIRE s'origine sur le tibia et la fibula (épiphyses proximales), et le cours ne lui donne que la flexion plantaire du pied.

slide 328

Corrigé


Planches

Le squelette du membre inférieur : bassin, hanche et genou slide 271




Le squelette du membre inférieur : jambe et cheville


slide 289



L'os coxal, vue latérale : ses 3 parties slides 277 et 279




Le quadriceps fémoral : ses 4 chefs, une terminaison commune slide 311



Les ischio-jambiers : 3 terminaisons différentes

slides 319 et 320



Cartes

Quels sont les 4 segments du squelette du membre inférieur ?

La ceinture pelvienne, la cuisse, la jambe et le pied.

slide 270

Pour chaque segment du membre inférieur, quel(s) os le compose(nt), et quelles articulations le schéma légende-t-il ?

Ceinture pelvienne : sacrum + os coxal. Cuisse : fémur. Jambe : tibia + fibula. Pied : aucun os nommé sur ce schéma (26 os détaillés à la slide 294). Articulations légendées : sacro-iliaque, coxo-fémorale (hanche), fémoro-patellaire et tibio-fémorale (genou), talo-crurale (cheville). La hanche est légendée, mais elle n'est pas comptée parmi les 4 articulations de la ceinture pelvienne (slide 275).

slides 271, 275 et 294

Comment est constituée la ceinture pelvienne, et quelles sont ses 4 articulations ?

Elle est constituée de 2 os coxaux + le sacrum + le coccyx (autres noms : bassin, pelvis). Ses 4 articulations : la symphyse pubienne, les 2 sacro-iliaques (une par côté), et la sacro-coccygienne.

slides 273 et 275

L'os coxal est composé de 3 parties : lesquelles, et avec quels 2 os s'articule-t-il ?

Ilium (partie supérieure), ischium (partie postéro-inférieure), pubis (partie antéro-inférieure). Il s'articule médialement avec le sacrum (articulation sacro-iliaque) et latéralement avec le fémur, au niveau de la tête fémorale (articulation coxo-fémorale).

slide 277

Quels sont les noms actuels des 3 parties de l'os coxal, et quels étaient leurs noms dans l'ancienne nomenclature ?

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle) correspondent à ilion, ischion et pubis dans l'ancienne nomenclature — seul le nom du pubis n'a pas changé.

slide 278

Sur l'os coxal, où se trouvent la crête iliaque, la fosse iliaque, l'acétabulum et le foramen obturé ?

La crête iliaque borde le sommet de l'ilium, la fosse iliaque en occupe la face interne. L'acétabulum, qui reçoit la tête fémorale, est à la jonction des 3 parties (schéma de la slide 278) ; le foramen obturé n'est bordé que par l'ischium et le pubis.

slides 278 et 279

Avec quels os le fémur s'articule-t-il, et quels repères porte-t-il à ses 2 extrémités ?

Il s'articule en haut avec l'os coxal (acétabulum → coxo-fémorale), en bas avec le tibia (plateau tibial → tibio-fémorale) et avec la patella (→ fémoro-patellaire). Extrémité proximale : tête fémorale, grand trochanter, petit trochanter. Extrémité distale : épicondyle médial, condyle médial, condyle latéral, surface patellaire.

slides 282 et 284

Le tibia et la fibula : lequel est médial, lequel est latéral, avec quels os s'articulent-ils, et quels repères portent-ils ?

Le tibia est MÉDIAL (plateau tibial, tubérosité du tibia, malléole médiale) ; il s'articule avec le fémur (tibio-fémorale), le talus (talo-crurale médiale) et la fibula (tibio-fibulaire proximale et distale). La fibula est LATÉRALE (tête de la fibula, malléole latérale) ; elle s'articule avec le tibia (tibio-fibulaire proximale et distale) et le talus (talo-crurale latérale).

slides 288 et 289

Où est située la patella, et quelle articulation forme-t-elle ?

Os court, situé en avant de la base du fémur, sur le trajet du tendon du quadriceps. Elle s'articule avec le fémur pour former l'articulation fémoro-patellaire.

slide 290

Le genou (articulation tibio-fémorale) comporte quels ligaments et quels ménisques ?

Ligament croisé antérieur (LCA) et ligament croisé postérieur (LCP) ; ménisque médial et ménisque latéral, sur le plateau tibial. Le ligament patellaire y arrive côté antérieur.

slide 291

Combien d'os compte le pied, comment se répartissent-ils, et quelle particularité présente l'articulation de la cheville ?

26 os en 3 groupes : le tarse (7 os, dont le talus et le calcanéus), le métatarse (5 métatarsiens), les phalanges (3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2). La cheville (articulation talo-crurale) unit le tibia et la fibula au talus : c'est l'articulation la plus sujette aux entorses.

slides 294 et 295

Quels sont les muscles principaux et les muscles profonds de la ceinture pelvienne ?

Principaux : ilio-psoas, petit/moyen/grand glutéal, tenseur du fascia lata. Profonds, rotateurs latéraux de la cuisse : piriforme, obturateur interne et externe, jumeau supérieur et inférieur, carré fémoral.

slide 298

L'ilio-psoas est composé de 2 muscles : lesquels, et quelle est son action ?

Le grand psoas (muscle latéral du tronc) et l'iliaque (muscle de la hanche). Origine : face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque). Terminaison : petit trochanter du fémur. Il est fléchisseur de la cuisse.

slide 299

Petit glutéal et moyen glutéal partagent origine et terminaison : quelle est la différence de leurs actions ?

Les 2 s'originent sur la face externe de l'ilium et se terminent sur le grand trochanter du fémur. Le petit glutéal est abducteur ET rotateur médial de la cuisse ; le moyen glutéal est abducteur de la cuisse et stabilisateur du bassin.

slides 300 et 301

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand glutéal ?

Origine : face externe de l'ilium, crête iliaque, crête sacrale. Terminaison : face postérieure du fémur. Actions : extenseur et rotateur latéral de la cuisse, stabilisateur du bassin.

slide 302

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata, et quelles sont ses actions ?

Il se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral. Actions : abducteur, rotateur médial et fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe.

slide 303

Quels sont les 3 groupes de muscles de la cuisse, et l'action caractéristique de chacun ?

Groupe antérieur : extenseur du genou. Groupe médial : adducteur de la cuisse. Groupe postérieur : fléchisseur du genou.

slide 306

Quelles sont l'origine, la terminaison et les actions du sartorius ?

Origine : épine iliaque antéro-supérieure. Terminaison : patte d'oie. Actions : fléchisseur de la cuisse et de la jambe, rotateur latéral et abducteur de la cuisse.

PLAN TRANSVERSAL

slide 309

Le quadriceps fémoral a 4 chefs : lesquels, et par quelle structure se termine-t-il ?

Droit fémoral, vaste latéral, vaste intermédiaire, vaste médial. Le tendon du droit fémoral passe par-dessus la patella pour rejoindre le ligament patellaire : c'est la terminaison commune des 4 chefs.

PLAN SAGITTAL

slides 310 et 311

Quel chef du quadriceps est aussi fléchisseur de la cuisse, et en quoi son origine diffère-t-elle de celle des 3 vastes ?

Le droit fémoral : le cours lui donne, en plus de l'extension du genou (commune aux 4 chefs), la flexion de la cuisse. Il s'origine sur l'épine iliaque antéro-inférieure (os coxal). Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur (bord médial, bord latéral, face antérieure) ; le cours ne leur donne que l'extension du genou.

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quels sont les 5 muscles du groupe médial (adducteurs) de la cuisse, et qu'est-ce qui distingue le long adducteur des 2 autres adducteurs ?

Pectiné, court adducteur, long adducteur, grand adducteur, gracile. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs de la cuisse ; le long adducteur est en plus fléchisseur et rotateur médial de la cuisse.

PLAN FRONTAL

slides 312, 313, 314 et 315

Quelle est la terminaison propre à chacun des 3 ischio-jambiers, et quelle nuance porte le biceps fémoral ?

Biceps fémoral → tête de la fibula ; semi-tendineux → patte d'oie ; semi-membraneux → plateau tibial.

Origines : le semi-tendineux et le semi-membraneux naissent de la tubérosité ischiatique ; le biceps a deux chefs, dont un seul y naît (le chef long), le chef court naissant de la ligne âpre du fémur. Actions : les 3 sont fléchisseurs de la jambe ; le semi-tendineux et le semi-membraneux sont extenseurs de la cuisse, et pour le biceps le cours réserve cette action au chef long.

slides 319 et 320

Quels 3 muscles convergent à la patte d'oie, et en quoi cette convergence est-elle remarquable ?

Le sartorius (groupe antérieur), le gracile (groupe médial, adducteurs) et le semi-tendineux (groupe postérieur, ischio-jambiers) : 3 muscles de 3 groupes différents, d'origines et de fonctions différentes, qui se terminent tous au même endroit, sur le bord médial du tibia.

slides 309, 316 et 320

Quels muscles composent le groupe antérieur de la jambe, et quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du tibial antérieur ?

Tibial antérieur, long extenseur de l'hallux, court/long/troisième fibulaire, long extenseur des orteils. Le tibial antérieur : origine bord latéral du tibia, terminaison bord médial du gros orteil, action fléchisseur dorsal du pied.

slides 324 et 325

Le triceps sural est composé de quels muscles, et lequel d'entre eux est aussi fléchisseur de la jambe ?

Du gastrocnémien et du soléaire (et du plantaire). Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du FÉMUR : il agit donc aussi sur le genou, et le cours lui donne la flexion de la jambe en plus de la flexion plantaire du pied. Le soléaire s'origine sur les épiphyses proximales du tibia et de la fibula : le cours ne lui donne que la flexion plantaire du pied. Les deux se terminent ensemble sur le calcaneus par le tendon calcaneen.

slides 327 et 328

Quiz

Parmi les 4 chefs du quadriceps, lequel est aussi fléchisseur de la cuisse, en plus d'être extenseur du genou ?

- A. le vaste médial
- B. le droit fémoral — bonne réponse**
- C. le vaste intermédiaire
- D. le vaste latéral

Seul le droit fémoral s'origine sur l'os coxal (épine iliaque antéro-inférieure) : il agit donc aussi sur la cuisse, et le cours lui donne la flexion de la cuisse en plus de l'extension du genou. Les 3 vastes s'originent directement sur le fémur : le cours ne leur donne que l'extension du genou.

PLAN SAGITTAL

slide 311

Quelle est la terminaison du biceps fémoral, différente de celle du semi-tendineux et du semi-membraneux ?

- A. le calcanéus
- B. la tête de la fibula — bonne réponse**
- C. le plateau tibial
- D. la patte d'oie

Le biceps fémoral se termine sur la tête de la fibula (côté latéral) ; le semi-tendineux à la patte d'oie, le semi-membraneux sur le plateau tibial (tous deux médiaux).

slides 319 et 320

Parmi les ischio-jambiers, quel est le seul qui se termine à la patte d'oie ?

- A. aucun : ils se terminent tous à la tête de la fibula
- B. le biceps fémoral
- C. le semi-tendineux — bonne réponse**
- D. le semi-membraneux

Semi-tendineux → patte d'oie. Semi-membraneux → plateau tibial. Biceps fémoral → tête de la fibula. Trois terminaisons différentes. Côté origine : le semi-tendineux et le semi-membraneux naissent de la tubérosité ischiatique ; le biceps a deux chefs, dont un seul (le chef long) y naît.

slides 319 et 320

La patte d'oie est le point de terminaison commun de 3 muscles. Lesquels ?

- A. sartorius, gracile, semi-tendineux — bonne réponse**
- B. sartorius, long adducteur, semi-tendineux
- C. sartorius, gracile, semi-membraneux
- D. gracile, semi-tendineux, biceps fémoral

Sartorius (groupe antérieur), gracile (groupe médial) et semi-tendineux (groupe postérieur) convergent tous à la patte d'oie — trois groupes différents, un seul point d'arrivée. Le semi-membraneux, lui, se termine sur le plateau tibial.

slides 309, 316 et 320

Le cours donne au gastrocnémien la flexion de la jambe, et au soléaire seulement la flexion plantaire du pied. Qu'est-ce qui les distingue par l'origine ?

- A. le gastrocnémien s'origine sur le fémur, le soléaire sur le tibia et la fibula — bonne réponse**
- B. les deux s'originent sur le fémur
- C. les deux s'originent sur le tibia et la fibula
- D. le gastrocnémien s'origine sur le tibia et la fibula, le soléaire sur le fémur

Le gastrocnémien s'origine sur les condyles médial et latéral du fémur : il agit donc aussi sur le genou, et le cours lui donne la flexion de la jambe (en plus de la flexion plantaire du pied). Le soléaire s'origine sur les épiphyses proximales du tibia et de la fibula : le cours ne lui donne que la flexion plantaire du pied.

slide 328

La ceinture pelvienne compte 4 articulations. Lesquelles ?

- A. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + sacro-coccygienne — bonne réponse**
- B. 2 sacro-iliaques + 2 coxo-fémorales
- C. symphyse pubienne + 2 sacro-iliaques + coxo-fémorale
- D. symphyse pubienne + sacro-coccygienne + coxo-fémorale

La symphyse pubienne (1), les 2 articulations sacro-iliaques (2), et la sacro-coccygienne (1) = 4. La coxo-fémorale (hanche) n'appartient PAS à la ceinture pelvienne : c'est l'articulation qui unit le membre inférieur libre à cette ceinture.

slide 275

Quelles sont les 3 parties de l'os coxal, dans la nomenclature actuelle ?

- A. ilium, ischium, sacrum
- B. ilium, ischium, pubis — bonne réponse**
- C. ilion, ischion, pubis
- D. ilium, ischion, pubis

Ilium, ischium et pubis (nomenclature actuelle). Ilion et ischion sont les anciens noms d'ilium et ischium — seul pubis n'a pas changé. Le sacrum n'est pas une partie de l'os coxal.

slide 278

Le pied compte 26 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 8 tarsiens, 5 métatarsiens, 13 phalanges
- B. 7 tarsiens, 6 métatarsiens, 13 phalanges
- C. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 14 phalanges — bonne réponse**
- D. 7 tarsiens, 5 métatarsiens, 15 phalanges

7 (tarse) + 5 (métatarse) + 14 (phalanges : 3 par orteil sauf le gros orteil qui n'en a que 2, soit $3 \times 4 + 2 = 14$) = 26.

slide 294

Quelle articulation du membre inférieur est la plus sujette aux entorses ?

- A. l'articulation sacro-iliaque
- B. l'articulation coxo-fémorale (la hanche)
- C. l'articulation tibio-fémorale (le genou)
- D. l'articulation talo-crurale (la cheville) — bonne réponse**

L'articulation de la cheville (talo-crurale), qui unit le tibia et la fibula au talus, est la plus sujette aux entorses du membre inférieur.

slide 295

Sur quelle structure se termine le tenseur du fascia lata ?

- A. la tête de la fibula
- B. le tractus ilio-tibial (jusqu'au plateau tibial latéral) — bonne réponse**
- C. le grand trochanter du fémur
- D. la patte d'oie

Le tenseur du fascia lata se termine sur le tractus ilio-tibial, qui rejoint le plateau tibial latéral — à ne pas confondre avec la patte d'oie (sartorius, gracile, semi-tendineux), un point de terminaison différent et médial.

slide 303

Parmi les adducteurs de la cuisse, lequel est aussi fléchisseur et rotateur médial de la cuisse, en plus d'être adducteur ?

- A. le long adducteur — bonne réponse**
- B. le pectiné
- C. le grand adducteur
- D. le court adducteur

Le long adducteur est adducteur, fléchisseur ET rotateur médial de la cuisse. Le court et le grand adducteur ne sont qu'adducteurs. Le pectiné est cité dans ce groupe mais le cours ne détaille pas ses actions.

PLAN FRONTAL

slide 314

L'articulation coxo-fémorale (la hanche) est formée par quels 2 éléments ?

- A. le foramen obturé et la tête fémorale
- B. l'acétabulum de l'os coxal et le grand trochanter
- C. l'acétabulum de l'os coxal et la tête fémorale — bonne réponse**
- D. la fosse iliaque et la tête fémorale

L'os coxal s'articule latéralement avec le fémur au niveau de l'acétabulum, qui reçoit la tête fémorale.

slides 277 et 282

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Ilio-psoas slide 299	face antérieure de l'os coxal (fosse iliaque)	petit trochanter du fémur	fléchisseur de la cuisse
Petit glutéal slide 300	face externe de l'ilium	grand trochanter du fémur	abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse
Moyen glutéal slide 301	face externe de l'ilium	grand trochanter du fémur	abducteur de la cuisse ; stabilisateur du bassin
Grand glutéal slide 302	face externe de l'ilium ; crête iliaque ; crête sacrale	face postérieure du fémur	extenseur de la cuisse ; rotateur latéral de la cuisse ; stabilisateur du bassin
Tenseur du fascia lata slide 303	épine iliaque antéro-supérieure	tractus ilio-tibial (qui se termine sur le plateau tibial latéral)	abducteur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; extenseur de la jambe
Sartorius slide 309	épine iliaque antéro-supérieure	patte d'oie	fléchisseur de la cuisse ; fléchisseur de la jambe ; rotateur latéral de la cuisse ; abducteur de la cuisse
Quadriceps fémoral slide 311	droit fémoral : épine iliaque antéro-inférieure ; vaste médial : bord médial du fémur ; vaste latéral : bord latéral du fémur ; vaste intermédiaire : face antérieure du fémur	tendon commun de la patella, puis tubérosité tibiale (ligament patellaire)	extenseur du genou (les 4 chefs) ; droit fémoral : fléchisseur de la cuisse
Court adducteur slide 313	pubis	ligne âpre du fémur	adducteur de la cuisse
Long adducteur slide 314	pubis	ligne âpre du fémur	adducteur de la cuisse ; fléchisseur de la cuisse ; rotateur médial de la cuisse
Grand adducteur slide 315	pubis ; tubérosité ischiatique	ligne âpre du fémur ; épicondyle médial du fémur	adducteur de la cuisse

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Gracile slide 316	pubis	patte d'oie	fléchisseur de la jambe ; rotateur médial de la jambe ; adducteur de la cuisse
Biceps fémoral slide 319	chef long : tubérosité ischiatique ; chef court : ligne âpre du fémur	tête de la fibula	fléchisseur de la jambe ; chef long : extenseur de la cuisse
Semi-tendineux slide 320	tubérosité ischiatique	patte d'oie	fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse
Semi-membraneux slide 320	tubérosité ischiatique	plateau tibial	fléchisseur de la jambe ; extenseur de la cuisse
Tibial antérieur slide 325	bord latéral du tibia	bord médial du gros orteil	fléchisseur dorsal du pied
Gastrocnémien slide 328	condyles médial et latéral du fémur	calcanéus (par le tendon calcanéen)	fléchisseur de la jambe ; fléchisseur plantaire du pied
Soléaire slide 328	épiphyses proximales du tibia et de la fibula	calcanéus (par le tendon calcanéen)	fléchisseur plantaire du pied